



浙江华图

专注医考 精于辅导

2019 年医疗卫生事业单位招聘考试 模拟试卷 2 《临床专业》



一、单项选择题，共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个选项符合题意。

1. 急性炎症时组织变红的主要原因是

- A. 组织间隙水肿
- B. 血管扩张，血流加快
- C. 炎症灶内血栓形成
- D. 肉芽组织增生

2. 下列乙肝病毒标志物中反映 HBV 有活动性复制和传染性的是

- A. 表面抗原 (HBsAg)
- B. 表面抗体 (抗-HBs)
- C. e 抗原 (HBeAg)
- D. e 抗体 (抗-HBe)

3. 区别癌与肉瘤的主要依据是

- A. 浸润性生长、无包膜
- B. 异型性明显，有核分裂象
- C. 通过血道转移
- D. 组织来源

4. 甲状腺功能亢进症患者的手术禁忌证是

- A. 中度 Graves
- B. 胸骨后甲状腺肿伴甲亢
- C. 青少年患者
- D. 妊娠早期重度甲亢

5. 不属于阻塞性肺气肿的体征是

- A. 桶状胸
- B. 触觉语颤增强



- C. 肺下界和肝浊音界下降
- D. 叩诊呈过清音、心浊音界缩小或不易叩出
6. 能诱发流感综合征的药物是
- A. 利福平
- B. 多黏菌素
- C. 链霉素
- D. 哌拉西林
7. 用药的间隔时间主要取决于
- A. 药物与血浆蛋白的结合率
- B. 药物的吸收速度
- C. 药物的排泄速度
- D. 药物的消除速度
8. 老年患者突然发生寒战、高热、咳嗽、咳痰，痰黏稠，砖红色，胶冻状，引起感染最可能的病原菌是
- A. 葡萄球菌
- B. 克雷伯菌
- C. 铜绿假单胞菌
- D. 流感嗜血杆菌
9. 下列指标中用于鉴别原发性与继发性甲状腺功能减退症的是
- A. TSH
- B. TT_3
- C. TT_4
- D. FT_3

10. 典型麻疹的出疹时间与发热的关系是
- A. 发热 2~3 天出疹，出疹时伴低热
 - B. 发热 3~4 天出疹，出疹时热退
 - C. 发热 1~2 天出疹，出疹时热退
 - D. 发热 3~4 天出疹，出疹时热更高
11. 开放性骨折处理正确的是
- A. 用毛刷洗刷创口内污染的骨质
 - B. 失去活力的大块肌肉组织可以部分保留
 - C. 已污染的骨膜应完全切除
 - D. 游离污染的小骨片应该去除
12. 以滑膜炎为基本病理改变的风湿病是
- A. 强直性脊柱炎
 - B. 类风湿关节炎
 - C. 风湿性关节炎
 - D. 骨性关节炎
13. 类风湿关节炎关节表现正确的是
- A. 对称性近端指间、掌指和腕关节持续性肿痛
 - B. 膝、髌和踝关节非对称，持续肿痛
 - C. 膝关节单侧或双侧肿痛，休息后好转
 - D. 单侧第一跖趾关节剧烈肿痛
14. 类风湿关节炎（RA）病人中可以查到类风湿因子（RF），因此 RF
- A. 是诊断 RA 的必备条件
 - B. 一旦出现，将不会发生改变



- C. 可随疾病的变化而变化
- D. 正常人木会出现
15. 小儿生理性免疫功能低下的时期最主要是
- A. 新生儿期
- B. 婴幼儿期
- C. 学龄期
- D. 青春期
16. 抑制结核菌 DNA 与细胞壁合成的抗结核药物是
- A. 异烟肼
- B. 利福平
- C. 吡嗪酰胺
- D. 乙胺丁醇
17. 肝硬化最常见的并发症是
- A. 门静脉血栓形成
- B. 原发性肝癌
- C. 肝性脑病
- D. 上消化道大出血
18. 渗出性结核性腹膜炎的最佳的强化治疗方案是
- A. 异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、链霉素
- B. 异烟肼、链霉素、对氨基水杨酸
- C. 异烟肼、链霉素、对氨基水杨酸、糖皮质激素
- D. 异烟肼、链霉素、对氨基水杨酸加手术腹腔引流
19. 上消化道出血表现为呕血或黑便，主要取决于
- A. 出血的速度和量



- B. 出血部位的高低
- C. 病变的性质
- D. 凝血机制
20. 诊断幽门梗阻最有价值的体征是
- A. 振水音阳性
- B. 肠鸣音亢进
- C. 上腹部膨隆
- D. 明显脱水
21. 肝性脑病前驱期的主要表现是
- A. 性格改变
- B. 计算能力减退
- C. 定向力减退
- D. 巴宾斯基 (Babinski) 征阳性
22. 发作时心电图 ST 段抬高的是
- A. 恶性型劳力性心绞痛
- B. 变异型心绞痛
- C. 初发型心绞痛
- D. 梗死后心绞痛
23. 按心力衰竭发展阶段分级, 临床心力衰竭阶段至少相当于
- A. NYHA 分级 II 级
- B. NYHA 分级 IV 级
- C. NYHA 分级 I 级
- D. NYHA 分级 III 级



24. 最有助于感染性心内膜炎诊断的实验室检查是
- A. 血培养
 - B. 尿常规
 - C. 血常规
 - D. 金黄色葡萄球菌检测
25. 以下心血管疾病中最易引起咯血的是
- A. 二尖瓣狭窄
 - B. 肺动脉瓣狭窄
 - C. 急性心包炎
 - D. 三尖瓣狭窄
26. 心力衰竭合并肾衰竭患者利尿药物首选
- A. 阿米洛利
 - B. 氨苯蝶啶
 - C. 呋塞米
 - D. 螺内酯
27. 以下情况最常于听诊时发现心律不齐的是
- A. 室性心动过速
 - B. 室上性心动过速
 - C. 室性期前收缩
 - D. 三度房室传导阻滞
28. 周围血管疾病用测定双侧肢体皮肤温差的方法判断动脉血流减少情况，温度相差至少应大于
- A. 0.5℃
 - B. 1.5℃



C. 2.5℃

D. 2.0℃

29. 休克指数的计算方法是

A. 心率与收缩压之比

B. 脉率与舒张压之比

C. 脉率与脉压之比

D. 脉率与收缩压之比

30. 门静脉高压症主要临床表现是

A. 肝掌

B. 肝病面容

C. 腹腔积液

D. 蜘蛛痣

31. 引起左室后负荷增高的主要因素是

A. 肺循环高压

B. 体循环高压

C. 回心血量增加

D. 主动脉瓣关闭不全

32. 肾小球滤过膜中，阻挡大分子物质滤过的主要屏障是

A. 肾小囊脏层足细胞足突

B. 肾小囊脏层足细胞胞体

C. 肾小囊脏层足细胞足突裂隙膜

D. 肾小球毛细血管内皮下基膜

33. 小脑绒球小结叶受损后的表现是

A. 运动编程功能受损



- B. 运动启动功能障碍
- C. 肌肉精细运动受损
- D. 身体平衡功能障碍

34. 神经垂体储存的激素是

- A. 抗利尿激素
- B. 生长激素
- C. 促肾上腺皮质激素
- D. 促甲状腺激素

35. Na^+ 通过离子通道的跨膜转运过程属于

- A. 单纯扩散
- B. 易化扩散
- C. 主动转运
- D. 出胞作用

36. 按照甲类传染病管理的乙类传染病是

- A. 脊髓灰质炎
- B. 艾滋病
- C. 登革热
- D. 肺炭疽

37. 医疗机构应对无正当理由开具抗菌药物超常处方达到一定次数的医师提出警告。应当予以警告的最低次数是

- A. 2次
- B. 6次
- C. 3次
- D. 4次



38. 医务人员就医疗行为进行说明的首选对象是

- A. 患者朋友
- B. 患者同事
- C. 患者所在单位领导
- D. 患者本人

39. 能够诱导 UDP-葡萄糖醛酸基转移酶合成从而减轻黄疸的药物是

- A. 苯巴比妥
- B. 磺胺嘧啶
- C. 氢氯噻嗪
- D. 青霉素

40. 大多数脱氢酶的辅酶是

- A. $FADH_2$
- B. NAD^+
- C. Cyt c
- D. CoA

41. 重症肌无力胆碱能危象是由于

- A. 抗胆碱酯酶药物过敏
- B. 抗胆碱酯酶药物用量不足
- C. 抗胆碱酯酶药物作用突然消失
- D. 抗胆碱酯酶药物过量

42. 目前颅内动脉瘤主要的确诊检查是

- A. 脑血管造影
- B. 头颅 CT



- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 头痛反复发作史
43. 慢性肾小球肾炎患者血压控制的理想水平是
- A. 120/80mmHg 以下
- B. 125/75mmHg 以下
- C. 130/80mmHg 以下
- D. 140/90mmHg 以下
44. 最常见的肾盂肾炎病原菌是
- A. 葡萄球菌
- B. 粪链球菌
- C. 大肠杆菌
- D. 变形杆菌
45. 早期慢性肾衰竭最主要的治疗目的是
- A. 减少蛋白尿
- B. 减轻水肿
- C. 降低血压
- D. 延缓肾功能减退
46. 急性肾小球肾炎与急进性肾小球肾炎临床相似之处为
- A. 中度贫血
- B. 预后不佳
- C. 以急性肾炎综合征起病
- D. 肾功能急剧恶化
47. 在原发性肾病综合征中，关于微小病变型肾病的特点，叙述不正确的是
- A. 光镜下肾小球基本正常，可见近曲小管上皮细胞脂肪变性



- B. 免疫荧光检查阴性
- C. 电镜下于系膜区可见电子致密物
- D. 镜下血尿发生率低，一般不出现肉眼血尿
48. 肾病综合征患者发生血栓并发症，最常见于
- A. 肾静脉
- B. 冠状血管
- C. 下肢静脉
- D. 下腔静脉
49. 急性肾衰竭少尿期最常见的血镁、磷、钙代谢异常是
- A. 高镁、高磷、低钙
- B. 低镁、高磷、低钙
- C. 高镁、低磷、高钙
- D. 低镁、高磷、高钙
50. 引起我国慢性肾衰的首要病因是
- A. 急性肾小球肾炎
- B. 慢性肾小球肾炎
- C. 糖尿病肾病
- D. 高血压肾病
51. 急性风湿热治疗时，早期使用糖皮质激素的指征是
- A. 环形红斑
- B. 多发性关节炎
- C. 心肌炎
- D. 皮下小结



52. 系统性红斑狼疮的标记性抗体是
- A. ANA
 - B. ANCA (中性粒细胞胞质抗体)
 - C. 抗 dsDNA 抗体
 - D. AKA (抗角蛋白抗体)
53. 下列不属于弥漫性结缔组织病的是
- A. 系统性红斑狼疮
 - B. 类风湿关节炎
 - C. 硬皮病
 - D. Reiter 综合征
54. 孕早期患下列何种疾病, 应终止妊娠
- A. 细菌性阴道炎
 - B. 巨细胞病毒感染
 - C. 沙眼衣原体感染
 - D. 外阴阴道念珠菌感染
55. 卵巢性激素以胆固醇为原料的合成途径, 正确的是
- A. 雄激素—雌激素—孕激素
 - B. 雌激素—孕激素—雄激素
 - C. 孕激素—雄激素—雌激素
 - D. 雌激素—雄激素—孕激素
56. 黄体萎缩不全患者月经 5~6 天刮宫的病理表现是
- A. 增生期与分泌期并存
 - B. 复杂型增
 - C. 分泌期内膜



D. 单纯型内膜

57. 前置胎盘的常见致病因素不包括

- A. 初孕妇
- B. 子宫内膜炎
- C. 双胎妊娠
- D. 多次刮宫史

58. 缺铁性贫血的实验室检查结果应是

- A. 血清铁降低、总铁结合力降低、转铁蛋白饱和度降低
- B. 血清铁降低、总铁结合力升高、转铁蛋白饱和度降低
- C. 血清铁降低、总铁结合力正常、转铁蛋白饱和度降低
- D. 血清铁降低、总铁结合力升高、转铁蛋白饱和度正常

59. 引起继发性再生障碍性贫血较常见的病因是

- A. 药物及化学物质
- B. 物理因素
- C. 病毒感染
- D. 细菌感染

60. 下列临床表现最有利于有机磷农药中毒诊断的是

- A. 紫绀（发绀）
- B. 昏迷
- C. 气急
- D. 蒜臭

61. 洋地黄中毒所致的室性心动过速禁用

- A. 利多卡因



B. 直流电复律

C. 苯妥英钠

D. 氯化钾

62. 有机磷农药中毒的发病机制主要是有机磷抑制了

A. 胆碱酯酶

B. 6-磷酸葡萄糖脱氢酶

C. 细胞色素氧化酶

D. 糜蛋白酶

63. 脓毒症早期典型的临床表现是

A. 呼吸困难

B. 休克

C. 少尿

D. 寒战、高热

64. 氰化物中毒时，病人的呼吸气味可呈

A. 烂苹果味

B. 蒜臭味

C. 腥臭味

D. 苦杏仁味

65. 机体处于应激如创伤、手术、感染等情况下，能量代谢的变化中，错误的是

A. 机体处于分解代谢状态

B. 脂肪动员加速

C. 蛋白质分解加速

D. 处理葡萄糖能力增强



66. 对心力衰竭病人进行择期手术, 至少待心衰控制以后
- A. <1 周
 - B. 1~2 周
 - C. 3~4 周
 - D. 5~6 周
67. 全胃肠外营养治疗时, 补充氮(g)和热量(kcal)的比例一般为
- A. 1: 10
 - B. 1: 50
 - C. 1: 100
 - D. 1: 150
68. 与金黄色葡萄球菌毒力有关的因素
- A. 形成血浆凝固酶的能力
 - B. 特异性细胞糖类的存在
 - C. 耐药性
 - D. 透明质酸酶
69. 气性坏疽最关键的治疗措施是
- A. 大剂量青霉素
 - B. 高压氧疗法
 - C. 输血、输液
 - D. 紧急手术处理
70. 良性肿瘤与恶性肿瘤的主要鉴别是
- A. 有无包膜



- B. 生长速度
- C. 分化程度
- D. 疼痛程度

二、多项选择题，共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中，至少有 2 个选项符合题意。

71. 关于慢性肉芽肿性炎描述中正确的是

- A. 指肉芽组织增生形成的结节状病灶
- B. 病灶呈结节状，境界清楚
- C. 结核病为肉芽肿性炎
- D. 肉芽肿性炎由巨噬细胞构成

72. 有关血栓的论述，正确的是

- A. 静脉血栓多于动脉血栓
- B. 下肢血栓多于上肢
- C. 动脉瘤内血栓多为混合血栓
- D. 毛细血管内血栓多为白色血栓

73. 肝硬化的病理组织学变化是

- A. 假小叶形成
- B. 纤维组织增生
- C. 肝细胞弥漫性大片坏死
- D. 淋巴细胞浸润

74. 下列疾病中，可以进行切脾治疗的是

- A. 遗传性球形细胞增多症
- B. 自身免疫性溶血性贫血
- C. 丙酮酸激酶缺乏致贫血
- D. 海洋性贫血

75. 下列何种疝属嵌顿性疝

- A. Richter 疝
- B. Litter 疝
- C. 滑疝
- D. 逆行性嵌顿疝

76. 动脉粥样斑块可发生

- A. 出血
- B. 溃疡
- C. 血栓形成
- D. 动脉瘤

77. 导尿术的禁忌症包括

- A. 膀胱破裂
- B. 急性附睾炎
- C. 急性前列腺炎
- D. 尿道狭窄

78. 血浆白蛋白的功能有

- A. 维持胶体渗透压
- B. 维持血浆的正常 PH 值
- C. 运输某些物质，尤其是脂溶性物质
- D. 营养作用

79. 神经根型颈椎病的临床表现有

- A 颈肩部向上肢放射
- B. 前臂及手指麻木



C. 上肢牵拉试验阳性

D. 上肢肌力下降

80. 乳腺癌可转移到

A. 腋窝淋巴结

B. 锁骨下淋巴结

C. 胸骨旁淋巴结

D. 纵隔淋巴结

81. 下列哪些疾病易发生绞窄性肠梗阻

A. 肠扭转

B. 蛔虫性肠梗阻

C. 肠套叠

D. 肠系膜血管阻塞

82. 诱发甲状腺危象的因素主要为

A. 甲状腺亢进治疗不当

B. 感染

C. 手术

D. 劳累、精神创伤

83. 下列不属于等张溶液的是

A. 0.85%NaCl

B. 0.85%葡萄糖

C. 1.9%尿素

D. 5%NaCl

84. 下列有关睾酮功能的叙述，正确的是

A. 促进精子生长发育



- B. 抑制蛋白质合成
- C. 促进骨骼生长
- D. 促进副性征的出现

85. 下列关于血管紧张素 II 生理作用的描述, 正确的是

- A. 收缩全身阻力血管
- B. 收缩容量血管
- C. 促进交感神经末梢释放去甲肾上腺素
- D. 促进下丘脑释放血管升压素

86. 关于细胞静息电位的论述, 正确的是

- A. 细胞膜处于极化状态
- B. 静息电位主要是由 K^+ 内流形成的
- C. 静息状态下, 细胞膜对 K^+ 通透性增高
- D. 细胞在静息状态时处于外正内负的状态

87. 关于肾小管泌 H^+ 的描述, 不正确的是

- A. 仅发生于远端小管
- B. 通过质子泵和 Na^+-H^+ 交换而实现
- C. 肾小管泌 NH_3 有碍于泌 H^+
- D. 分泌 1 个 H^+ 可有多个 HCO_3^- 重吸收

88. 男, 66 岁。上腹胀痛 10 余年。胃镜检查: 胃体黏膜变薄, 血管透见, 皱襞稀疏。病理检查: 胃体腺体萎缩。该患者出现的生理变化是

- A. 胃蛋白酶分泌减少
- B. 铁吸收减少
- C. 维生素 B_{12} 吸收减少
- D. 血清促胃液素降低

89. 各型高脂蛋白血症中增高的脂蛋白是

- A. CM
- B. VLDL
- C. HDL
- D. IDL

90. 参与三羧酸循环的化合物是

- A. 柠檬酸
- B. 草酰乙酸
- C. 丙二酸
- D. α -酮戊二酸

三、是非题，共 10 题，每题 1 分，判断每题的陈述是否正确，正确的为 A，错误的为 B。

91. 氨基糖苷类抗生素的主要不良反应是耳毒性。

92. 丁卡因可用于浸润麻醉。

93. 妊娠早期羊水的主要来源是胎儿尿液。

94. 孕妇血清绒毛膜促性腺激素（HCG）浓度达高峰是在妊娠 8~10 周。

95. 我国现阶段采用的围生期规定为从妊娠满 28 周至产后 1 周。

96. 在我国最多见的淋巴瘤类型是 NK/T 细胞淋巴瘤。

97. COPD 气道炎症最主要的效应细胞是中性粒细胞。



98. 再生能力较强的细胞是骨细胞。

99. 急性炎症时组织变红的主要原因是炎症灶内炎性细胞浸润。

100. 原发性高血压最严重的病变是脑出血。

