2019年执业药师考试试题答案及解析（考生回忆版）

中药学综合知识与技能

一、最佳选择题

【A】1.某女,38岁。自觉咽中不适如有物梗塞胸闷,经前乳房胀痛：舌苔白腻脉弦滑。辨证为痰气互结证。所谓”证”是指

A.症状表现

B.病理概括

C.诊断方法

D.疾病名称

E.疾病过程

1.【答案】 B

【解析】所谓”证”，是机体在疾病发展过程中某一阶段的病理概括，包括病变的部位、原因、性质以及邪正关系，能够反映出疾病发展过程中某一阶段的病理变化的本质。

【A】2.某女，50岁。月经淋沥不断，色淡质稀，食少便溏,畏寒肢冷,少气懒言，头晕乏力;舌淡,脉细弱。基于气的生理功能分析该病证属于

A.推动作用失常

B.温煦作用失常

C.防御作用失常

D固摄作用失常

E.气化作用失常

2.【答案】 D

【解析】固摄作用，气的固摄作用，主要是对于精、血、津液 等物质具有防止其无故流失，以及维护脏腑器官各自位置的相对恒定等作用。具体表现在:固摄血液，即维持血液在脉管内循行，防止逸出脉外；固摄汗液、尿液、唾液、胃液、肠液等正常物质分泌和排泄，防止其无故外泄和流失，从而维持体内水液代谢的相对平衡;维持脏腑器官位置的稳定，使之保持正常的生理活动和脏腑之间功能的相互协调，维持胎儿在胞宫内的安定和正常发育等。

【A】3.某男,30 岁。发热喜凉,面红目赤,伴有口臭,牙龈肿痛,大便干燥,小便短赤。舌红,苔黄脉数。中医辨证是

A.实热

B.虚热

C.虚实错杂

D.实寒

E.里寒表热

3.【答案】A

【解析】热证的临床表现多见发热喜凉，口渴饮冷，面红目赤，烦躁不宁，小便短赤，大便燥结，舌红苔黄而干燥，脉数等症状。以热为主，功能活动亢进为辨证要点。实证以症状表现有余、亢盛为辨证要点。故根据八纲辨证，该证属于实热证。

【A】4.某男，49 岁。虚烦失眠，心悸健忘，手足心热，头晕耳鸣，腰酸梦遗;舌红，无苔，脉细数。中医辨证是

A.心阴虚

B.心火亢盛

C.心肾不交

D.心脾两虚

E.肝肾阴虚

4.【答案】 C

【解析】心肾不交证临床常见虚烦失眠，心悸健忘，头晕耳鸣，咽干，腰膝酸软，多梦遗精，潮热盗汗，小便短赤，舌红无苔，脉细数。一般以失眠、伴见心火亢而肾水虚的症状为辨证要点。

【A】5.某男,28 岁。突然发热,高热不退,周身酸痛,咽喉疼痛，舌红苔黄,脉浮数。自诉有多位同事出现类似症状。中医诊断是( )

A.风寒感冒

B.风热感冒

C.暑湿感冒

D.体虚感冒

E.时行感冒

5.【答案】 E

【解析】感冒:时行感冒[症状]突然发热，高热不退，甚则寒战，周身酸痛，无汗，咳嗽，口干，咽喉疼痛，伴明显全身症状，呈现流行性发作。舌红，苔黄，脉浮数。[治法]清热解毒。[方剂应用]清瘟解毒丸。[中成药选用]清开灵颗粒(口服液)、羚羊感冒片、连花清瘟胶囊。

【A】6.某男,68 岁。长期吸烟,干咳 3 个月,近日咳嗽加重午后咳甚,少痰,痰中带血,颧红潮热,五心烦热,耳鸣；舌红，少苔脉细数。中医辨证是()

A.风寒犯肺

B.风热犯肺

C.燥邪伤肺

D.肺肾阴虚

E.痰热壅肺

6.【答案】 D

【解析】咳嗽:肺肾阴虚[症状]干咳少痰，或痰中带血，午后咳甚，或伴五心烦热，颧红，耳鸣。舌红少苔，脉细数。[治法]滋阴润肺，止咳化痰。[方剂应用]百合固金汤。[中成药选用]二冬膏、养阴清肺丸、百合固金丸。

【A】7.中药雷公藤制剂广泛用于类风湿关节炎、肾病综合征等疾病的治疗。国家药品不良反应监测中心病例报告显示雷公藤制剂可引起肝、肾、血液系统和生殖系统等损害。执业药师在进行雷公藤制剂用药指导时用药建议错误的是

A.患者服用该类药物时应从最小剂量开始

B.严格控制用药剂量和疗程,一般连续用药不宜超过 3 个月

C.心肝、肾功能不全者禁用老年有严重心血管病者慎用

D.育龄期有孕育要求者用药时应严格控制剂量和疗程并密切监测不良反应

E.用药期间应定期随诊并注意检查血、尿常规,加强心电图和肝肾功能的监测

7.【答案】 D

【解析】雷公藤制剂的用药指导:(1) 患者服用该类药物时，必须在医师的指导下使用，用药初期从最小剂量开始。(2)严格控制用药剂量和疗程，一般连续用药不宜超过 3 个月。(3)用药期间应定期随诊并注意检查血、尿常规，加强心电图和肝肾功能监测。(4)儿童、育龄期有孕育要求者、孕妇和哺乳期妇女禁用；心、肝、肾功能不全者禁用;严重贫血、白细胞和血小板降低者禁用;胃、十二指肠溃疡活动期及严重心律失常者禁用。老年有严重心血管病者慎用。

【A】8.含有毒成分的中成药联合应用时应注意有毒成分的”叠加”，以免引起不良反应。因药物组成含附子不宜与大活络丸联用的中成药是

A.天麻丸

B.苏合香丸

C.天王补心丸

D.牛黄清心丸

E.牛黄醒消丸

8.【答案】A

【解析】本题考查的是中成药联用的配伍禁忌，含有毒药物中成药的联用的知识点。大活络丸与天麻丸合用，两者均含有附子，均会增加有毒药味的服用量，加大患者产生不良反应的危险性。

【A】9.某女,23 岁。风热感冒,服用银翘解毒丸。为增强药物疗效服用时可使用药引。正确的药引和服用方法是

A.焦三仙煎汤送服

B.鲜芦根煎汤送服

C.清茶送服

D.米汤送服

E.姜汤送服

9.【答案】 B

【解析】治疗风热感冒的银翘解毒丸用鲜芦根煎汤送服，取其清热透表生津的协同作用。

【A】10.某男 38 岁。因口腔溃疡、疼痛明显来医院就诊兼见口渴心烦，小便短赤，大便干结。查体:口腔黏膜多处溃疡，基底覆以黄苔,周围黏膜色红；舌红，苔黄腻,脉数有力。宜选用的中成药是

A.加味逍遥丸

B.当归龙荟丸

C.清胃黄连丸

D.连蒲双清片

E.口炎清颗粒

10.【答案】 C

【解析】口疮:心脾积热[症状]口腔黏膜溃疡，灼痛明显，常因过食煎炒辛辣或寐少而发，伴口渴心烦，失眠溲短黄，大便秘结;检查见黏膜表面有 黄白色假膜，周边红肿。舌红，苔黄或腻，脉数有力。[治法]清心泻脾，消肿止痛。[方剂应用]凉膈散。[中成药选用]内服清胃黄连片,利咽解毒颗粒，清咽丸;外用. 口腔溃疡散，珠黄散，锡类散，西瓜霜粉剂。

【A】11.国家药品不良反应监测中心病例报告显示,莲必治注射液不 良反应表现为急性肾功能损害、皮疹、头晕、胃肠道反应、过敏样反应等，并在药品不良反应信息通报中进行了相关报告。 关于莲必治注射液相关用药指导的说法错误的是

A.老年人、儿童、哺乳期妇女禁用

B.有肾脏疾患的患者应避免使用该药

C.应避免与氨基糖苷类等有肾毒性药物联合使用

D.严格掌握适应症,加强对用药患者肾功能的监测

E.如患者用药后出现腰痛、腰酸等,应立即到医院就诊,检查肾功能情况

11.【答案】 A

【解析】莲必治注射液[用药指导](1)临床医生严格掌握适应证，加强对用药患者肾功能的监测。(2)避免与氨基糖苷类等有肾毒性药物联合使用。(3) 对于老年人、儿童、孕妇、哺乳期妇女以及有肾脏疾患的患者应避免使用。(4)患者用药后出现腰痛、腰酸等症状，应立即到医院就诊，检查肾功能情况。

【A】12.某女，57 岁。因上呼吸道感染，给予 10%葡萄糖注射液 250ml,加入注射用双黄连 3.6g 静脉滴注。约输入 150ml 时，患者出现皮肤瘙痒，继之全身出现红色皮疹、呼吸困难、大汗、血压为 75/50mmHg，立即停用注射用双黄连，给予生命体征监护，并经静脉推注地塞米松，皮下注射肾上腺素，3 小时后症状逐渐消失。根据《药品不良反应报告和监测管理办法》要求，报告该病例不良反应最迟应不超过

A.5 个工作日

B.15 个工作日

C.10 个工作日

D.20 个工作日

E.30 个工作日

12.【答案】B

【解析】我国《药品不良反应报告和监测管理办法》中要求对新的或严重的药品不良反应病例需用有效方式快速报告，必要时可以越级报告，最迟不超过 15 个

工作日。

【A】13.某男,40 岁。3 年前头部曾受外伤，经住院治疗症状改善。近 6 个月反复头痛,部位固定在左颞部,痛如锥刺;舌紫暗,苔薄白,脉涩。宜选用的方剂是

A.羚角钩藤汤加减

B.通窍活血汤加减

C.川芎茶调散加减

D.补阳还五汤加减

E.桃仁承气汤加减

13.【答案】 B

【解析】头痛:瘀血阻络[症状]头痛经久不愈，痛处固定不移，痛如锥刺，或有头部外伤史。舌紫，苔薄白，脉细或细涩。[治法]祛瘀通络。[方剂应用]通窍活血汤(赤芍、川芎、桃仁、红花、磨香、 老葱、鲜姜、大枣、酒)加减。[中成药选用]通天口服液

【A】14.某男 56 岁。喘促日久，动则喘甚，舌淡，苔薄，辨证为肾不纳气，给予金匮肾气丸治疗，但久治不愈，且见咽干烦躁, 医师决定加用其他中成药。宜与金匮肾气丸联用的中成药是

A.四君子丸

B.通宣理肺丸

C.生脉胶囊

D.小青龙合剂

E.清肺化痰丸

14.【答案】 C

【解析】用金匮肾气丸治疗肾虚作喘，但若久治不愈，阳损及阴，兼见咽干烦躁者，又当配麦味地黄丸、生脉散或参蛤散同用，以平调阴阳、纳气平喘，且防止金匮肾气丸燥烈伤阴，降低副作用。

【A】15.某女,25 岁。妊娠 7 周,近日脘腹胀满，嗳腐吞酸,不欲饮食;舌苔薄白,脉滑。宜选用的中成药是

A.清宁丸

B.开胸顺气丸

C.保和丸

D.槟榔四消丸

E.山楂化滞丸

14.【答案】 C

【解析】胃痛:饮食停滞[症状]胃痛胀满，嗳腐恶食，或吐不消化食物，吐食或矢气 后痛减，或大便不爽。舌苔厚腻，脉滑。[治法]导滞和胃。[方剂应用]保和丸。[中成药选用]保和丸、加味保和丸、六味安消散、沉香化滞丸、开胃山楂丸。

【A】16.某男,35 岁。形体肥胖嗜食肥甘,口中黏腻，来院进行血糖、血脂等相关检查。检查结

果:FBG5.6mmoL,TC56mo/L,TG2.45mmoL,HDLC1.4mmoL,LDL02. 其中,指标异常的是

A. TG

B. FBG

C. TC

D. HDL-C

E. LDL-C

16.【答案】 A

【解析】三酰甘油(TG)的参考值为:①成人:合适范围<1.70mmol/L (150mg/dl) ;②边缘升高: 1.70~2.25mmol/L (150~199mg/dl) ;③升高 22.26mmol/L (200mg/dl)

【A】17.某男,75 岁。患消渴病 20 余年，尿频量多,饮一溲一,口干舌燥,耳鸣,腰膝酸软,畏寒肢冷。诊察患者见面容憔悴，耳轮干枯: 舌淡,苔白少津，脉沉细无力。中医辨证是

A.肾阴亏虚

B.阴阳两虚

C.脾胃气虚

D.阴虚燥热

E.肾阳虚衰

17.【答案】 B

【解析】消渴:阴阳两虚[症状]小便频数，甚则饮-溲一，咽干舌燥，面容憔悴，耳轮干枯，腰膝酸软，畏寒肢冷。舌淡苔白乏津，脉沉细无力。[治法]温阳滋肾。

[方剂选用]金匮肾气丸。[中成药选用]生力胶囊、强肾片。

【A】18.某女,31 岁。每年春天皮肤起风团，色鲜红，灼热剧痒,症状加重时伴有发热恶寒咽喉疼痛不适:舌红苔薄黄，脉浮数。宜选用的方剂是

A.香薷饮加减

B.防风汤加减

C.杏苏散加减

D.消风散加减

E.银翘散加减

18.【答案】 D

【解析】瘾疹:风热犯表[症状]风团鲜红，灼热剧痒，遇热则剧，得冷则减;伴有发热，恶寒，咽喉肿痛。舌质红，苔薄白或薄黄，脉浮数。[治法]疏风清热，解表止痒。[方剂应用]消风散加减。[中成药选用]消风止痒颗粒。

【A】19.鞣质可分为缩合鞣质和可水解鞣质。研究表明，缩合鞣质的毒性较低，对肝脏无毒或只有轻度损害，可水解鞣质的毒性较高，长期大量应用可引起肝小叶中央坏死、脂肪肝、肝硬化。因含有大量可水解鞣质，进入机体后几等全部被分解成倍酸与焦酸，极大量时可引起灶性肝细胞坏死的中药是

A.川楝子

B.五倍子

C.苍耳子

D.黄药子

E.蓖麻子

19.【答案】 B

【解析】五倍子中含有大量可水解鞣质，进入机体后几乎全部被分解成倍酸与焦酸,极大量时可引起灶性肝细胞坏死。

【A】20.《神农本草经》是现存最早的本草学专著，载药 365 种,包括

A.上品 120 种,中品 120 种,下品 125 种

B.上品 120 种，中品 125 种,下品 120 种

C.上品 125 种,中品 120 种,下品 120 种

D.上品 120 种，中品 115 种,下品 130 种

E.上品 115 种，中品 130 种,下品 120 种

20.【答案】 A

【解析】《神农本草经》 载药 365 种。其分类原则是:上品 120 种，无毒，欲轻身益气，不老延年者;中品 120 种，无毒有毒。斟酌其宜，欲遏病补虚羸者;下品 125 种，多毒，欲除寒热邪气，破积聚愈疾者。

【A】21.某女,44 岁。与同事争吵后出现胃脘胀痛,连及胁肋,嗳气时作,食欲不振，嘈杂吞酸;舌淡红,苔薄白,脉弦。宜选用的方剂是

A.柴胡疏肝散加减

B.丹栀逍遥散加减

C.二陈汤加减

D.保和丸加减

E.良附丸加减

21.【答案】A

【解析】胃痛:肝胃不和。[症状]胃脘胀痛，连及胁肋，嗳气后疼痛减轻,生气时胃痛 加重，食欲不振，或见嘈杂吞酸。舌红，苔薄白，脉弦。[治法]疏肝理气，和胃止痛。[方剂应用]柴胡疏肝散。[中成药选用]气滞胃痛颗粒、柴胡舒肝丸、舒肝和胃丸、沉香化气丸。

【A】22.中西药联用得当、合理，相互为用，可取长补短，使效增强，病程缩短，药物的毒副作用减少。具有协同增效作用的中西药联用药组是

A.四逆汤与地高辛

B.磁朱丸与诺氟沙星

C.急支糖浆与地高辛

D.参茸片与格列本脲

E.健胃消食片与红霉素

22.【答案】 A

【解析】木防己汤、茯苓杏仁甘草汤、四逆汤等与强心药地高辛等联用，可以提高疗效和改善心功能不全患者的自觉症状。

【A】23.中成药有很多剂型,不同剂采用的贮存养护方法不同。除另有规定外,应置于阴凉、干燥处。并密闭、防止受潮的剂型是

A.软剂

B.酒剂

C.颗粒剂

D.胶剂

E.腔剂

23.【答案】 D

【解析】胶剂在温度过高或受潮时，会发软发黏，甚者会粘连成团，或发霉变质。若发现胶剂受潮发软，不能曝晒或火烘，可置于石灰缸内保存数日，使之除潮，防止发霉。置于室内阴凉干燥处。胶剂应密闭贮存，防止受潮。

【A】24.某男,6 岁。不思饮食,腹满喜按,神疲肢倦,大便稀溏腥臭，夹 有不消化食物,面色萎黄;舌淡,苔白,脉濡细。宜选用的方剂是

A.保和丸加减

B.理中丸加减

C.枳术丸加减

D.健脾丸加减

E.良附丸加减

24.【答案】 D

积滞:脾虚夹积[症状]面色萎黄，形体消瘦，神疲肢倦，不思乳食，腹满喜按，大便溏稀腥臭，夹乳片或不消化食物残渣。舌质淡，苔白腻，脉满细而滑，或指纹淡滞。[治法]健脾助运，消食化滞。[方剂应用]健脾丸加减。[中成药选用]健胃消食片、健脾丸、开胃健脾丸。

【A】25.某男,69 岁,因肛门有脱出物且大便带血到医院就诊。患者常年肛门]松弛,时有痔核脱出,需手法还纳,便血色淡,面白，乏力, 纳呆:舌淡,边有齿痕,脉弱。宜选用的方剂是

A.槐花散加减

B.脏连丸加减

C.止痛如神汤加减

D.补中益气汤加减

E 凉血地黄汤加减

25.【答案】D

【解析】痔疮:脾虚下陷[症状]肛门松弛，痔核脱出须手法复位，便血色鲜或淡，面白少华，少气懒言，纳少便溏。舌淡，边有齿痕，苔薄白,脉弱。[治法]补气

升阳举陷。[方剂应用]补中益气汤。[中成药选用]补中益气丸(合剂、颗粒)、补气升提片。

【A】26.某男,68岁,因感冒、发热、头痛、鼻塞流涕、四肢乏力等 不适症状就诊,测体温39°C,医师开具吲哚美辛栓退热。不宜与该药联用的中成药是

A.新癀片

B.清开灵胶囊

C.感冒软胶囊

D.连花清瘟颗粒

E.疏风解毒胶囊

26.【答案】A

【解析】新癀片中含有吲哚美辛。

【A】27.某女,5岁,母亲诉患儿饭量比同龄孩子少,但饮水较多,且常说口干,平时容易发脾气手足心热,大便偏干,小便黄。诊察见患儿毛发皮肤失于润泽,舌红,舌苔花剥,脉细数。中医辨证是

A.胃阴不足

B.脾失健运

C.脾胃气虚

D.脾胃湿热

E.肝胃不和

27.【答案】 A

【解析】厌食:胃阴不足。[症状]口干多饮，纳呆食少，皮失润泽，大便偏干，小便短黄，甚或烦躁少寐，手足心热。 舌偏红少津，苔少或花剥，脉细数。[治法]养胃育阴,佐以助运。[方剂应用]养胃增液汤加减。[中成药选用]儿宝颗粒(主治脾气虚弱、胃阴不足证).

【A】28.大黄蛰虫丸处方组成为大黄、土鳖虫、水蛭、虻虫、蛴螬、干漆、桃仁、地黄、白芍、黄芩、苦杏仁、甘草。方中大黄宜选用的炮制品是

A.生大黄

B.酒大黄

C.熟大黄

D.醋大黄

E.大黄炭

28.【答案】 C

【解析】大黄功用泻下攻积、清热泻火、凉血解毒、逐瘀通络,大承气汤泻下用生大黄;大黄蛰虫丸或加减方破瘀消癥则宜用熟大黄。

【A】29.某男,32 岁。因银屑病来医院就诊，证为血虚风燥,开具的处方为:土茯苓、半枝莲、龙葵、生地黄、当归、白芍、徐长卿、牡丹皮、紫草、水牛角、炒槐花、北豆根、生侧柏、白鲜皮、地肤子、鬼箭羽。煎煮时需要后下的饮片是

A.牡丹皮

B.徐长卿

C.土茯苓

D.炒槐花

E.白鲜皮

29.【答案】B

【解析】本题考查中药汤剂的煎煮注意事项的特殊煎煮方法的知识点。需要后下的中药饮片如降香、沉香、薄荷、苦杏仁、徐 长卿、生大黄等。

【A】30.含有砷、汞等矿物类成分的中成药,长期服用可造成血尿、蛋白尿等肾功能损害,肾功能不全患者慎用。同时含有砷、汞等矿物类成分的中成药是

A.人参再造丸

B.苏合香丸

C.安宫牛黄丸

D.天王补心丸

E.牛黄解毒丸

30.【答案】 C

【解析】安宫牛黄丸既含有朱砂又含有雄黄。

中药学综合知识与技能-中药不良反应-医疗用毒性中药的中毒反应和基本救治原则-含朱砂、轻粉、红粉的中成药-含朱砂、轻粉、红粉的常见中成药

【A】31.属于配伍禁忌，斗谱排列时不能装于一斗及上下斗的饮片是

A.当归与独活

B.甘草与芫花

C.天葵子与冬葵子

D.藜芦与漏芦

E.法半夏与川贝母

31.【答案】 B

【解析】本题考查斗谱编排基本原则。属于配伍禁忌不宜排列在-斗及.上下斗的如甘草与京大戟、甘遂、芫花;藜芦与丹参、 南沙参、玄参、苦参、白芍、赤芍、细辛;乌头类(附子、川乌及草乌)与半夏的各种炮制品、瓜蒌(瓜蒌皮、 瓜蒌子、瓜蒌仁及天花粉) ;丁香(包括母丁香)与郁金(黄郁金、黑郁金) ;芒硝(包括玄明粉)与京三梭:肉桂(官桂)与石脂(赤石脂)

【A】32.某男,52 岁。胃脘隐痛 10 余年嗳气,无烧心反酸,时便秘:舌淡红，苔白脉沉缓。胃镜检查结果为萎缩性胃炎。宜选用的藏药方剂是

A.仁青芒觉胶囊

B.六味安消散

C.二十五味松看丸

D.坐珠达西丸

E.三十五味沉香丸

32.【答案】 A

【解析】仁青芒觉胶囊的功能为清热解毒，益肝养胃，明目醒神，愈疮，滋补强身。用于自然毒、食物毒、配制毒等各种中毒症;“培根木布”，消化道溃疡，急、慢性胃肠炎，萎缩性胃炎，腹水，麻风病等。

【A】33.某男，75 岁。患中风 3 年。现左侧肢体僵硬拘挛，活动不遂，头痛头晕，面赤耳鸣:舌红，苔薄黄，脉弦。宜选用的中成药是

A.消栓颗粒

B.天麻钩藤颗粒

C.脑心通胶囊

D.醒脑再造胶囊

E.通天口服液

33.【答案】 B

【解析】半身不遂:气虚血瘀[症状]半身不遂，患侧僵硬拘挛，兼见头痛头晕，面赤耳鸣，舌红，苔薄黄，脉弦或弦涩。[治法]平肝潜阳。[方剂应用]天麻钩藤

饮。[中成药选用]心脑静片、天麻钩藤颗粒、脑血栓片(主治瘀血阳亢证)

【A】34.某男,55岁。患痹证20余年肢体关节疼痛,屈伸不利,关节肿大、僵硬、变形,筋脉拘急,腰膝酸软,骨蒸潮热;舌红，少苔,脉细数。中医辨证是

A.旭痹

B.行痹

C.痛痹

D.热痹

E.着痹

34.【答案】A

【解析】痹证:旭痹[症状]痹证日久不愈，肢体、关节疼痛，屈伸不利，关节肿大僵硬、变形，甚则肌肉萎缩，筋脉拘急，肘膝不伸，或以尻 代踵，以背代头，伴腰膝酸软，骨蒸潮热、自汗、盗汗。舌红 或漆，脉细数。[治法]化痰祛瘀，滋养肝肾[方剂应用]桃红饮合独活寄生汤[中成药选用]独活寄生丸(合剂)、旭痹颗粒，益肾蠲痹丸

【A】35.某女,48岁。经血量多,非时而下淋沥不净,血色紫暗有块,小腹疼痛:舌紫暗脉弦涩有力。中医辨证是

A.气血两虚

B.脾不统血

C.瘀血阻络

D.肝肾不足

E.冲任不固

35.【答案】 C

【解析】崩漏:瘀血阻络[症状]经血非时而下，量多或少，淋沥不净，血色紫暗有 块，小腹疼痛拒按，舌紫暗或有瘀点，脉涩或弦涩有力。[治法]活血祛瘀，温经止血[方剂应用]逐瘀止崩汤[中成药选用]坤灵丸，少腹逐瘀丸(颗粒)

【A】36.某男,52岁。平素脾胃虚弱。近3日因目赤肿痛,自行服用黄连上清丸,出现胃脘不适,大便稀溏等。针对该患者体征其适宜的服药时间是

A.饭后

B.空腹

C.饭前

D.睡前

E.餐中

36.【答案】 A

【解析】本题考查饮片处方的服用。对肠胃刺激性较大的药物宜饭后服用。

【A】37.某女，29 岁。小便频数短涩，灼热刺痛，尿色黄赤，少腹拘急胀痛，发热，口苦，大便秘结:舌红，苔黄腻，脉滑数。 宜采用的治法是

A.清热利湿通淋

B.清热养阴生津

C.清热排石通淋

D.滋补肝肾利尿

E.补肾健脾利湿

37.【答案】A

【解析】热淋主证为小便频数短涩，灼热刺痛，溺色黄赤，少腹拘急胀痛，或寒热，口苦，呕恶，或腰痛拒按，或大便秘结。 舌红苔黄腻，脉滑数。治宜清热利湿通淋。

【A】38.中药在贮藏过程中,由于受到诸多因素的影响,其质量也会不断发生变化，对中药质呈变异有影响的自身因素是

A.水分、虫害、油脂

B.日光、淀粉、色素

C.油脂、淀粉、色素

D.虫害、霉菌、容器

E.空气、水分、包装

38.【答案】 C

【解析】本题考查中药质量变异不利因素。自身因素对中药质量变异的影响有:水分、淀粉、黏液质、油脂、挥发油、色素。

【A】39.毒性中药药性峻烈,治疗剂量与中毒剂量相近使用不当会 致人中毒甚则死亡,因此掌握毒性中药饮片的正确用法尤为重要。下列毒性中药不可内服

A.雄黄

B.生藤黄

C.砒石

D.白降丹

E.蟾酥

39.【答案】D

【解析】白降丹:外用适量，研末调敷或作药捻。不可内服，具腐蚀性。

【A】40.某男,36 岁。因感冒初起咽喉肿痛就诊。医师处方金银 花、蒲公英、连翘、薄荷、甘草,代茶饮。代茶饮的服用方法

A.1 次顿服

B.每日服 2 次

C 不拘时频服

D.每日服 3 次

E.4 小时服 1 次

40.【答案】 C

【解析】代茶饮不拘时频服。

二、配伍选择题

（41～43 题共用题干）

A.血府逐淤汤加减

B.附子汤加减

C.补阳还五汤加减

D.乌头赤石脂丸加减

E.生脉散加减

【B】41.某男，65 岁，胸闷胸痛，胸胁胀满，心悸；唇舌紫暗，脉涩。宜选用的方剂是

【B】42.某男，50 岁。胸痛隐隐，遇劳则发，神疲乏力，气短懒言，心悸自汗；舌淡暗，脉弱而涩。宜选用的方剂是

【B】43.某女，53 岁。胸痛彻背，感寒痛甚，胸闷气短。心悸，形寒肢冷；舌淡，苔薄白，脉沉迟。宜选用的方剂是

41.【答案】A

【解析】胸痹:气滞血瘀证[症状]胸痛胸闷，胸胁胀满，心悸。唇舌紫暗，脉涩。[治法]行气活血。[方剂应用]血府逐瘀汤。[中成药选用]血府逐瘀口服液，复方丹参滴丸，速效救心丸，心可舒片。

42.【答案】C

【解析】胸痹:气虚血瘀[症状]胸痛隐隐，遇劳则发，神疲乏力，气短懒言，心悸自汗。舌胖有齿痕，色淡暗，苔薄白，脉弱而涩，或结、代。[治法]益气活血。[方剂应用]补阳还五汤。[中成药选用]通心络胶囊、舒心口服液、芪参胶囊、芪参益气滴丸、参芍片。

43.【答案】D

【解析】胸痹:寒凝心脉[症状]胸痛彻背，感寒痛甚，胸闷气短，心悸，形寒肢冷，面白。舌苔白，脉沉迟或沉紧。[治法]温阳散寒。[方剂应用]乌头赤石脂丸。[中成药选用]冠心苏合丸、宽胸气雾剂。

（44～45 题共用题干）

A.面黄如橘

B.面色萎黄

C.面黄晦暗

D.面黄红润

E.面黄虚胖

【B】44.肝胆湿热、内蕴脾胃，常见的面色特征是

【B】45.脾气虚衰、湿邪内阻，常见的面色特征是

44.【答案】A

【解析】黄色的临床意义主虚证、湿证。面色淡黄，枯槁无泽，称为萎黄，多属脾胃气虚、营血不能上荣之故。若面色黄而虚浮，称为黄胖，多是脾气虚衰、湿邪内阻所致。如面、目、身俱黄，称为黄疸，其中黄而鲜明如橘子色者，为阳黄，多属湿热。黄而晦暗如烟熏者，为阴黄，多属寒湿。故本题选 A。

45.【答案】E

【解析】黄色的临床意义主虚证、湿证。面色淡黄，枯槁无泽，称为萎黄，多属脾胃气虚、营血不能上荣之故。若面色黄而虚浮，称为黄胖，多是脾气虚衰、湿邪内阻所致。如面、目、身俱黄，称为黄疸，其中黄而鲜明如橘子色者，为阳黄，多属湿热。黄而晦暗如烟熏者，为阴黄，多属寒湿。故本题选 E。

（46～47 题共用题干）

A 肝主疏泄失常

B.心主血脉失常

C.脾主运化失常

D.肾主藏精失常

E.肺司呼吸失常

【B】46.某男，50 岁，胸痛连背，背痛彻胸，气短，劳则尤甚；舌紫暗，脉沉涩。基于五脏的生理功能分析，其病变属于

【B】47.某女，35 岁，胸胁胀痛，咽中异物感，时咳，痰少黏稠；舌淡红，脉沉弦。基于五脏的生理功能分析，其病变属于

46.【答案】B

【解析】心有推动血液在脉管内运行的作用。心、脉和血液循行在体内构成一个相对的独立系统。心主血脉的关键是心脏正常搏动。心脏的正常搏动，有赖于心气、心阳的推动和温煦作用，以及心血、心阴的营养和滋润作用，从而维持正常的心力、心率、心律，维持血液在脉内正常运行。如果心的气、血、阴、阳不足或失调，皆可影响心脏的正常搏动而出现异常现象。

47.【答案】A

【解析】肝主疏泄，调节气津液运行，促进脾胃运化、胆汁分泌排泄，调节生殖功能。肝主疏泄失常，则可出现胸胁胀痛、腹胀腹痛等症状。气机郁结，痰湿水饮，舌淡红，脉沉弦等。

（48～50 题共用题干）

A.包煎

B.对服

C.先煎

D.后下

E.冲服

某男，75 岁。近日入睡困难，心烦，口干，舌燥，小便短赤，大便干燥；舌尖红，脉数。医师诊断为不寐，证属心火炽盛，治以清心泻火。开具的处方为:黄连、生地黄、当归、生大黄、甘草、珍珠母、羚羊角粉，执业药师对患者进行煎药、服用方法的指导。

【B】48.珍珠母应采用的方法是

【B】49.生大黄应采用的方法是

【B】50.羚羊角粉应采用的方法是

48.【答案】C

【解析】先煎:(1)矿物、动物骨甲类饮片。因其质地坚硬，有效成分不易煎出，故应打碎先煎 20 分钟，方可与其他药物同煎。如生蛤壳、生龙骨、生龙齿、生紫石英、生寒水石、生石决明、生珍珠母、生瓦楞子、鳖甲、龟甲、鹿角霜、生磁石、生牡蛎、生石膏、生赭石、自然铜等。(2)某些有毒饮片，如附子等。

49.【答案】D

【解析】需要后下的药物有:(1)气味芳香类饮片。因其含挥发性成分故不宜煎煮时间过久，以免其有效成分散失，一般在其他群药煎好前 5～10 分钟入煎即可。如降香、沉香、薄荷、砂仁、白豆蔻、鱼腥草等(2)久煎后有效成分易被破坏的饮片。一般在其他群药煎好前 10～15 分钟入煎即可。如钩藤、苦杏仁、徐长卿、生大黄、番泻叶等。

50.【答案】E

【解析】冲服:一些用量少，贵细中药宜先研成粉末再用群药的煎液冲服，避免因与他药同煎而导致其成分被药渣吸附而影响药效。如雷丸、蕲蛇、羚羊角、三七、琥珀、鹿茸、紫河车、沉香、金钱白花蛇等。

（51～53 题共用题干）

A.小青龙合剂

B.养阴清肺丸

C.清气化痰丸

D.七味都气丸

E.百合固金丸

【B】51.某男，78 岁。喘促日久，呼多吸少，气不得续动则喘甚，形瘦神疲，汗出肢冷；舌淡，苔薄，脉沉。宜选用的中成药是

【B】52.某男，43 岁。有慢性支气管炎病史，7 日前因患感冒，现症状加重，咳嗽气粗，胸部胀痛，痰黏稠色黄，胸中烦闷，身热，有汗，口渴喜冷饮。咽干，面红，尿赤，便秘，舌红，苔黄腻，脉滑数。宜选用的中成药是

【B】53.某女，35 岁。受凉后出现喘咳气逆，呼吸急促，胸部胀闷，痰多色白稀薄而带泡沫，兼头痛鼻塞无汗，恶寒，发热；舌苔薄白而滑，脉浮紧。宜选用的中成药是

51.【答案】D

【解析】喘证:肾不纳气[症状]喘促日久，呼多吸少，气不得续，动则喘甚，小便常因咳甚而失禁，或尿后余沥，形瘦神疲，汗出肢冷，面唇青紫，或有跗肿，舌淡苔薄，脉沉弱；或见喘咳，面红烦躁，口咽干燥，足冷，汗出如油。舌红少津，脉细。[治法]补肾纳气。

[方剂应用]金匮肾气丸(桂枝、附子、熟地、山萸肉、山药、茯苓、丹皮、泽泻)合参蛤散(蛤蚧、人参)加减。[中成药选用]七味都气丸。

52.【答案】C

【解析】咳嗽:痰热壅肺[症状]咳嗽气粗，痰多黄稠，烦热口干。舌红，苔黄腻，脉滑数。[治法]清热化痰肃肺。[方剂应用]清金化痰汤(黄芩、栀子、枯梗、麦冬，桑白皮、贝母、知母、瓜蒌仁、橘红、茯苓、甘草)加减。[中成药选用]清气化痰丸、复方鲜竹沥液，蛇胆川贝散、橘红丸、孝贝胶囊、止咳橘红丸。

53【答案】A

【解析】喘证:风寒闭肺[症状]喘咳气逆，呼吸急促，胸部胀闷，痰多色白稀薄而带泡沫，兼头痛鼻塞、无汗、恶寒、发热。舌苔薄白而滑，脉浮紧。[治法]宣肺散寒。[方剂应用]麻黄汤合华盖散加减。[中成药选用]小青龙合剂、桂龙咳喘宁胶囊。

（54～56 题共用题干）

A.罂粟壳

B.麻黄

C.大黄

D.斑蝥

E.艾叶

【B】54.属于医疗用毒性药品的中药是

【B】55.须按麻醉药品管理的中药是

【B】56.根据 2015 年版《中国药典》，有小毒的中药是

54.【答案】D

【解析】毒性中药系指毒性剧烈，治疗剂量与中毒剂量相近，使用不当会致人中毒或死亡的中药。毒性中药品种有 28 种：砒石（红砒，白砒）、砒霜、水银、雄黄、轻粉、红粉、红升丹、白降丹、生川乌、生草乌、生白附子、生附子、生半夏、生南星、生狼毒、生甘遂、生藤黄、洋金花、闹羊花、雪上一枝蒿、斑蝥、青娘虫、红娘虫、蟾酥、生马钱子、生巴豆、生千金子、生天仙子。

55.【答案】A

【解析】按麻醉药管理的饮片只有一味罂粟壳，其炮制规格有生罂粟壳和蜜罂粟壳，处方用名罂粟壳时给付蜜罂粟壳。

56.【答案】E

【解析】2015 年版《中国药典》载有毒性药材和饮片共计 83 中，其中有小毒的有 31 种，如艾叶，丁公藤、九里香等。

（57～58 题共用题干）

A.醋知母

B.蜜知母

G.生知母

D.盐知母

E.姜知母

【B】57.白虎汤用于外感热病，调配时知母应给付的是

【B】58.大补阴丸用于阴虚火旺，调配时知母应给付的是

57.【答案】C

【解析】知母功用清热，白虎汤用于外感热病，方中用生知母；大补阴丸、知柏地黄丸等用于阴虚火旺，则宜用盐炙知母。

58.【答案】D

【解析】知母功用清热，白虎汤用于外感热病，方中用生知母；大补阴丸、知柏地黄丸等用于阴虚火旺，则宜用盐炙知母。

（59～60 题共用题干）

A.真武汤

B.小青龙汤

C.桂枝汤

D.四物汤

E.芍药甘草汤

【B】59.中西药联用时，可与皮质激素类药联用而减轻其副作用的是

【B】60.中西药联用时，可与利尿药联用而减轻其口渴及副作用的是

59.【答案】C

【解析】本题考查中西药联用的知识点。桂枝汤类、人参类方剂与皮质激素类药物联用，可减少激素的用量与副作用。

60.【答案】A

【解析】本题考查中西药联用的知识点。木防己汤、真武汤、越婢加术汤、分消汤等与西药利尿药联用，可减轻因应用西药利尿药而导致的口渴等副作用。

（61～63 题共用题干）

A.肝损害、剥脱性皮炎

B 过敏性休克、急性喉头水肿、过敏性哮喘、过敏性间质性肾炎

C.肝肾功能异常、粒细胞、白细胞和血小板减少、精子数量减少

D.胰腺炎、低钾血症、低氯血症、低钠血症

E.急性肾功能损害、皮疹、头晕、胃肠道反应，过敏样反应

【B】61.服用克银丸发生严重不良反应时可见

【B】62.使用清开灵注射液发生严重不良反应时可见

【B】63.服用珍菊降压片发生严重不良反应时可见

61.【答案】A

【解析】克银丸不良反应表现:肝损害、剥脱性皮炎。

62.【答案】B

【解析】清开灵注射液不良反应表现:以各种类型过敏反应为主，严重过敏反应包括过敏性休克、急性喉头水肿、过敏性哮喘，过敏性间质性肾炎。

63.【答案】D

【解析】珍菊降压片不良反应表现:消化系统表现为肝功能异常、黄疸、胰腺炎等；神经系统表现为头晕、视物模糊、运动障碍、麻木；皮肤及附件损害表现为剥脱性皮炎、全身水疱疹伴瘙痒等；代谢和营养障碍表现为低钾血症、低氯血症、低钠血症；有肾功能异常、心前区疼痛、心律失常、白细胞减少等个例报告。

（64～66 题共用题干）

A.龟龄集

B.生脉饮

C.薯蓣丸

D 龟鹿二仙膏

E 六味地黄丸

老年人因脏腑生理功能衰退，常感体力不济，记忆力不如以前，想服用滋补药增强体质，但需辨证选药，合理使用

【B】64.阴阳两虚者宜用

【B】65.肾阴虚者宜用

【B】66.肾阳虚者宜用

64.【答案】D

【解析】老年人的体虚，也有阴虚、阳虚、气虚、血虚和心、肝、脾、肺、肾等不同脏器虚衰之区别。阴虚者选用清补型滋补剂，如大补阴丸；偏于阳虚者应服

用温补型滋补剂，如龟龄集；肾阴虚老人宜服用六味地黄丸；阴阳两虚者应服用龟鹿二仙膏；心脾两虚老人宜服人参归脾丸。故本题选 D。

65.【答案】E

【解析】老年人的体虚，也有阴虚、阳虚、气虚、血虚和心、肝、脾、肺、肾等不同脏器虚衰之区别。阴虚者选用清补型滋补剂，如大补阴丸；偏于阳虚者应服用温补型滋补剂，如龟龄集；肾阴虚老人宜服用六味地黄丸；心脾两虚老人宜服人参归脾丸。故本题选 E。

66.【答案】A

【解析】老年人的体虚，也有阴虚、阳虚、气虚、血虚和心、肝、脾、肺、肾等不同脏器虚衰之区别。阴虚者选用清补型滋补剂，如大补阴丸；偏于阳虚者应服用温补型滋补剂，如龟龄集；肾阴虚老人宜服用六味地黄丸；心脾两虚老人宜服人参归脾丸。故本题选 A。

（67～69 题共用题干）

A.虚脉

B.细脉

C.弱脉

D.缓脉

E.微脉

【B】67.某男，70 岁。患消渴病多年，饮食减少，神疲乏力，四肢倦怠:舌淡，苔白，脉来三部举力隐隐蠕动指下，此脉象是

【B】68.某男，80 岁。久病，不耐寒热，头晕，神疲乏力，自汗盗汗；脉来沉细，应指无力，此脉象是

【B】69.某男，74 岁。久病泄泻，气短汗出，神情淡漠，面色苍白，手足逆冷:舌淡，苔白，脉来若有若无，按之欲绝，此脉象是

67.【答案】A

【解析】虚脉:三部脉举按皆无力，隐隐蠕动于指下，令人有一种软而空豁的感觉，是无力脉的总称。主气血两虚，尤多见于气虚。

68.【答案】C

【解析】弱脉:沉细而应指无力。主气血两虚诸证。

69.【答案】E

【解析】微脉:“极细而软，按之欲绝，若有若无”。常见于心肾阳衰及暴脱的患者。

（70～72 题共用题干）

A.清茶送服

B.生姜煎汤送服

C.黄酒送服

D.米汤送服

E.淡盐水送服

【B】70.某女，75 岁。大便干结难下 2 月余，脘腹胀满，口干口苦，心烦不宁；舌苔黄腻，脉弦。诊断为便秘给予更衣丸。为增强疗效，执业药师建议可使用的药引和服用方法是

【B】71.某女，65 岁。恶寒重，发热轻，头身疼痛，鼻塞流清涕；舌淡，苔白，脉浮紧。给予正柴胡饮颗粒。为增强疗效，执业药师建议可使用的药引和服用方法是

【B】72.某男 25 岁。踝关节扭伤，活动受限:舌暗苔白，脉弦。给予活血止痛胶囊。为增强疗效，执业药师建议可使用的药引和服用方法是

70.【答案】D

【解析】四神丸、更衣丸用米汤送服，取其保护胃气。

71.【答案】B

【解析】生姜具有散寒、温胃止呕作用，可用生姜切片煎汤作为“药引”，如正柴胡饮颗粒、藿香正气丸、附子理中丸等可用姜汤送服，以增强疗效。

72.【答案】C

【解析】黄酒因其味辛性温，具有温通经络、活血散瘀的作用，故常被作为“药引”，如大活络丸、牛黄醒消丸、跌打丸、七厘散等可用黄酒送服，一般用量为 15～20g。

（73～75 题共用题干）

A.湿热内蕴

B 脾肾阳虚

C 肝气乘脾

D 食伤肠胃

E.脾胃气虚

【B】73.某男，46 岁。常年泄泻，大便时溏时泻，水谷不化，迁延反复，食少，食后脘闷不适稍进油腻之物，则便次明显增多，面色萎黄，肢倦乏力，舌淡，苔薄白，脉细弱。中医辨证是

【B】74.某男，32 岁。泄泻腹痛泻下急迫，粪色黄褐，气味臭秽，肛门灼热，小便短黄烦热口渴；舌红苔黄腻脉滑数。中医辨证是

【B】75.某男，29 岁。3 天前饱食后出现腹痛肠鸣，泻下粪便臭如败卵夹有不消化食物，泻后痛减，脘腹胀满，嗳腐吞酸:舌苔厚腻，脉滑。中医辨证是

73.【答案】E

【解析】泄泻:脾胃气虚[症状]大便时溏时泻，水谷不化，迁延反复，食少，食后脘闷不适，稍进油腻之物则便次明显增多，面色萎黄，肢倦乏力。舌质淡，苔薄白，脉细弱。[治法]健脾益气，化湿止泻。[方剂应用]参苓白术散。[中成药选用]开胃健脾丸、参苓白术散、健脾丸、涩肠止泻散。

74.【答案】A

【解析】湿热内蕴[症状]泄泻腹痛，泻下急迫，或泻而不爽，粪色黄褐，气味臭秽，肛门灼热，小便短黄，烦热口渴。舌质红，苔黄腻，脉滑数。[治法]清热利湿。[方剂应用]葛根芩连汤(葛根、黄芩、黄连、炙甘草)加减。[中成药选用]复方黄连素片、葛根芩连丸(片)、香连丸。

75.【答案】D

【解析】泄泻:食伤肠胃

[症状]腹痛肠鸣，泻下粪便臭如败卵，泻后痛减，泻下伴有不消化食物，脘腹胀满，嗳腐吞酸，不思饮食。舌苔垢浊或厚腻，脉滑。[治法]消食导滞。[方剂应用]保和丸。[中成药选用]保和丸、加味保和丸。

（76～77 题共用题干）

A 金银花、首乌藤

B 金银花、金银藤

C 金银花、海风藤

D.款冬花、金银藤

E.款冬花、首乌藤

【B】76.处方中的并开药“忍冬花藤’执业药师在调配时应付

【B】77.处方中的并开药“金银花藤’’执业药师在调配时应付

76.【答案】B

【解析】本题考查饮片的处方应付的知识点。处方中并开"忍冬花藤”，处方应付金银花和金银藤。

77.【答案】B

【解析】本题考查饮片的处方应付的知识点。处方中并开“金银花藤”，处方应付金银花和金银藤。

（78～79 题共用题干）

A.乌鸡白凤丸

B.加味逍遥丸

C.益母丸

D.妇科调经片

E.艾附暖宫丸

【B】78.某女，35 岁。因月经不调就诊，诊断为月经先期，辨证属肝经郁热证，宜选用的中成药是

【B】79.某女，42 岁。因月经不调就诊，诊断为月经后期，辨证属气滞血瘀证，，宜选用的中成药是

78.【答案】B

【解析】月经不调:月经先期:肝经郁热[症状]月经提前，量多或少，经色紫红，质稠有块，经前乳房、胸胁、少腹胀痛，烦躁易怒，口苦咽干，喜叹息，舌红苔黄，脉弦数。[治法]疏肝解郁，清热调经。[方剂应用]丹栀逍遥散加减。[中成药选用]加味逍遥丸(口服液)。

79.【答案】C

【解析】月经不调:月经后期:气滞血瘀[症状]经期延后，经量偏少，经色暗红，或有血块，小腹胀痛，精神抑部，胸闷不舒。舌苔正常，脉弦。[治法]活血行气，化瘀止痛。[方剂应用]膈下逐瘀汤加减。[中成药选用]调经丸、益母丸、调经活血片。

（80～81 题共用备选答案）

A.阳盛

B.阳虚

C.亡阳

D.阴盛

E.阴虚

【B】80.某男。27 岁。壮热口渴，烦躁不安，面红目赤，舌红，苔黄脉洪大。分析该病机是

【B】81.某男，84 岁，久病，近患感冒，因发汗过多，出现精神疲惫，肌肤手足逆冷，冷汗淋漓，脉微欲绝。分析该病机是

80.【答案】A

【解析】由于阳是以热、动、燥为其特点，阳偏胜，即出现热象，所以说“阳胜则热”。如壮热、面红、目赤等，即是阳偏盛的具体表现。

81.【答案】C

【解析】亡阳是指机体的阳气发生突然性脱失，而致全身功能突然严重衰竭的一种病理状态。多由于外邪过盛，正不敌邪，阳气突然大量耗伤而脱失；或因素体阳虚，正气不足，又因疲劳过度等多种因素而诱发；或过用汗法，汗出过多，阳随津泄，阳气骤虚而外脱等所致；而慢性消耗性疾病之亡阳，则多由阳气严重耗散而衰竭，虚阳外越所致。临床表现多见冷汗淋漓、肌肤手足逆冷、精神疲惫、神情淡漠，甚则见昏迷、脉微欲绝等症状。

（82～83 题共用备选答案）

A.归脾丸

B.小金丸

C.八珍颗粒

D.双黄连口服液

E.枣仁安神丸

妊娠期妇女使用中成药时要慎重选择，以免损伤胎儿及母体。

【B】82.根据 2015 年版《中国药典》，孕妇应禁用的是

【B】83 .根据 2015 年版《中国药典》，孕妇应慎用的是

82.【答案】B

【解析】小金丸属于妊娠禁用药.

83.【答案】E

【解析】枣仁安神丸属于妊娠慎用药。

（84～85 题共用备选答案）

A.泽泻

B.吴茱萸

C.牡丹皮

D.灯心草

E.细辛

【B】84.按照对抗贮存法、宜与冰片同贮的中药

【B】85.按照对抗贮存法、宜与蛤蚧同贮的中药

84.【答案】D

【解析】对抗贮存法也称异性对抗驱虫养护，是采用两种或两种以上药物同贮，相互克制起到防止虫蛀、霉变的养护方法。一般适用于数量不多的药物，如牡丹皮与泽泻、山药同贮，蛤蚧与花椒、吴茱萸或荜澄茄同贮，蕲蛇或白花蛇与花椒或大蒜瓣同贮，土鳖虫与大蒜同贮，人参与细辛同贮，冰片与灯心草同贮，硼砂与绿豆同贮，藏红花与冬虫夏草同贮等。

85.【答案】B

【解析】对抗贮存法也称异性对抗驱虫养护，是采用两种或两种以上药物同贮，相互克制起到防止虫蛀、霉变的养护方法。一般适用于数量不多的药物，如牡丹皮与泽泻、山药同贮，蛤蚧与花椒、吴茱萸或荜澄茄同贮，蕲蛇或白花蛇与花椒或大蒜瓣同贮，土鳖虫与大蒜同贮，人参与细辛同贮，冰片与灯心草同贮，硼砂与绿豆同贮，藏红花与冬虫夏草同贮等。

（86～87 题共用备选答案）

A.2~10℃

B.10~25℃

C.2~ 5℃

D.不超过 20℃

E.10~30℃

根据 2015 年版《中国药典》“凡例”[贮藏]项下对药品贮藏与保管基本要求的规定

【B】86.阴凉处的温度应控制在

【B】87.冷处的温度应控制在

86.【答案】D

【解析】阴凉处系指不超过 20℃的环境。

87.【答案】A

【解析】冷处系指 2℃～10℃ 的环境。

（88～90 题共用备选答案）

A.气血两虚

B.气虚血瘀

C.气不摄血

D.气随血脱

E.气滞血淤

【B】88.某女,57 岁。胸胁胀满，走窜疼痛，性情急躁:舌紫暗，有淤斑,脉涩，中医辨证是

【B】89.某女 48 数。月经出血量多,大汗淋漓，四肢厥冷；唇舌色淡,脉微细。中医辨证是

【B】90.某女，51 岁。少气懒言，自汗，面色苍白；舌淡而嫩，脉细弱，中医辨证

88.【答案】E

【解析】气滞血瘀证临床常见胸胁胀满走窜疼痛,性情急躁,并兼见痞块刺痛拒按,舌紫确或

有瘀斑等。妇女还可见月经闭止,或缩经、经色紫暗有块,乳房胀痛等症状。一般以病程较

长和肝经循行部位的疼痛病块为辨证要点。

89.【答案】D

【解析】气随血脱证临床常见大量出血的同时，见面色㿠白，四肢厥冷,大汗淋漓,甚至晕厥

,脉微细或弱等症。多以大量出血时,随即出现气脱的症状为辩证要点。

90.【答案】A

【解析】气血两虚证临床常见少气懒言，乏力自汗，面色苍白或萎黄，心悸失眠，舌淡而嫩，脉细弱等。多以气虚与血虚的症状同见为辩证要点。

三、综合分析选择题

（91～93 共用备选题干）

【C】某女，67 岁。大便秘结，二三日一行，量少，排出不畅，面色无华，头晕目眩，心悸，口干；舌淡，苔少，脉细涩。

91.四诊合参，中医辨证是

A.热结肠胃

B.气滞郁结

C.津亏肠燥

D.胃肠积滞

E.阳虚寒凝

91.【答案】C

【解析】便秘:津亏肠燥[症状]大便秘结，面色无华，头晕目眩，心悸，口干。舌淡，苔少，脉细涩。[治法]养血润燥。[方剂应用]润肠丸。[中成药选用]麻仁润肠丸、麻仁丸、麻仁滋脾丸、通乐颗粒

92.宜采用的治法是

A.清热润肠

B.养血润燥

C.顺气行滞

D.温通开秘

E.泻下导滞

92.【答案】B

【解析】便秘:津亏肠燥[症状]大便秘结，面色无华，头晕目眩，心悸，口干。舌淡，苔少，脉细涩。[治法]养血润燥。[方剂应用]润肠丸。[中成药选用]麻仁润肠丸、麻仁丸、麻仁滋脾丸、通乐颗粒

93.宜选用的中成药是

A.清宁丸

B.当归芦荟丸

C.补中益气丸

D.麻仁丸

E.槟榔四消丸

93.【答案】D

【解析】便秘:津亏肠燥[症状]大便秘结，面色无华，头晕目眩，心悸，口干。舌淡，苔少，脉细涩。[治法]养血润燥。[方剂应用]润肠丸。[中成药选用]麻仁润肠丸、麻仁丸、麻仁滋脾九、通乐颗粒

（94～95 共用备选题干）

【C】某女，35 岁，因银屑病口服复方青黛丸，每日 3 次，每次 6g，服药 23 天后，出现乏力、恶心、纳差，检查结果显示患者功能异常，临床诊断为药物性肝损伤。排除了其他因素后，停用复方青黛丸，肝功能逐步恢复正常，查阅患者病历，患者 2 年前服用该药 20 天，也曾出现相同症状。

94.该患者肝功能异常的不良反应与复方青黛丸之间的因果关系应评价为

A.很可能

B.可能

C.可能无关

D.肯定

E.无法评价

94.【答案】D

【解析】解析:复方青黛丸的不良反应表现为腹泻、腹痛、肝炎、肝功能异常、头晕等;严重临床表现为药物性肝损害和胃肠出血。肝功能异常的不良反应与复方青黛丸之间的因果关系评价为肯定。

95.复方青黛丸常见的不良反应不包括

A.头晕

B.腹痛腹泻

C.肾功能损伤

D.胃肠道出血

E.肝功能异常

95.【答案】C

【解析】复方青黛丸的不良反应表现为腹泻、腹痛、肝炎、肝功能异常、头晕等:严重临床表现为药物性肝损害和胃肠出血。

（96～97 共用备选题干）

【C】某女，25 岁。月经延迟，小腹胀痛拒按，经血量少，血色紫暗有块，经行不畅，经前胸胁、乳房胀痛，饮食可，二便调；舌暗，苔白，脉弦。

96.根据中医诊法理论与实践，本病例所见小腹胀痛，经前胸胁、乳房胀痛的病机分析是

A.气虚

B.气滞

C.血虚

D.血瘀

E.气逆

96.【答案】B

【解析】胀痛：指疼痛伴有胀满或胀闷。多为气滞所致，在很多部位都可以出现，以胸脘、腹部为最多。如胃脘胀痛，则为中焦寒凝气滞，胸胁胀痛，则为肝郁气滞等。头部胀痛，则多见于肝阳上亢或肝火上炎的病证。

97.四诊合参，本病例的中医辨证是

A.气滞血瘀

B.阳虚内寒

C.瘀血阻络

D.寒滞肝脉

E.寒凝气滞

97.【答案】A

【解析】月经不调:月经后期:气滞血瘀[症状]经期延后，经量偏少，经色暗红，有血块，小腹胀痛，精神抑郁，胸闷不舒，舌苔正常，脉弦。[治法]活血行气，化瘀止痛。[方剂应用] 膈下逐瘀汤（当归、川芎、赤芍、桃仁、红花、枳壳、延胡索、五灵脂、丹皮、乌药、香附、甘草）加减。[中成药选用]调经丸、益母丸、调经活血片。

（98～100 共用备选题干）

【C】某男，48 岁。因口渴多饮、多食、多尿、腰膝酸软、四肢乏力等不适症状就诊，近 2 月来体重下降 5kg，相关检查显示随机血糖 15mmol/L，HbAlc8.5%，临床诊断为 2 型糖尿病。

98.HbAlc 是目前临诊断糖尿病常用检测指标之一，其水平反映近 2~3 月的平均血糖水平，正常参考值应为

A.3.5%~6%

B.4%~6%

C.5%~7.1%

D.5%~7.8%

E.5%~8%

98.【答案】B

【解析】糖化血红蛋白(HbAlc)参考值: 4%~6%。

99.医师开具格列本脲，执业药师进行用药指导时，建议不要自行同服含有相同西药成分的中成药。下列药物中含有格列本脲的是

A.十味玉泉胶囊

B.金芪降糖片

C.消糖灵胶囊

D.糖脉康胶囊

E.渴乐宁胶囊

99.【答案】C

【解析】消糖灵胶囊所含西药成分为格列本脲。

100.该患者近期偶患感冒，发热，头痛，咳嗽，咽痛，不宜选用的中成药是

A.桑菊感冒丸

B.感冒清热颗粒

C.银翘解毒胶囊

D.双黄连胶囊

E.复方金黄连颗粒

100.【答案】B

【解析】该患者上述感冒症状属于风热感冒，感冒清热颗粒适用于风寒感冒，不对症。

（101～104 共用备选题干）

【C】某男，57 岁。自诉眩晕，动则加剧，常因劳累而加重，心悸少寐，入睡困难，神疲懒言，食欲不振，面色无华；舌淡，脉细弱

101.中医辨证是

A.痰浊上蒙

B.气阴两虚

C.气血亏虚

D.肝肾阴虚

E.脾胃气虚

101.【答案】C

【解析】气血亏虚[症状]眩晕动则加剧，劳累即发，面色㿠白，唇甲无华，心悸少寐，神疲懒言，饮食减少。舌淡，脉细弱。[治法]益气养血。[方剂应用]八珍汤（人参、白术、茯苓、甘草、当归、川芎、白芍、地黄、生姜、大枣）加减。[中成药选用]归脾丸、八珍颗粒、十全大补丸。

102.宜采用的治法是

A.滋肾柔肝

B.益气养血

C.涤痰宣窍

D.益气养阴

E.益气健脾

102.【答案】B

【解析】气血亏虚[症状]眩晕动则加剧，劳累即发，面色㿠白，唇甲无华，心悸少寐，神疲懒言，饮食减少。舌淡，脉细弱。[治法]益气养血。[方剂应用]八珍汤（人参、白术、茯苓、甘草、当归、川芎、白芍、地黄、生姜、大枣）加减。[中成药选用]归脾丸、八珍颗粒、十全大补丸。

103.宜选用的方剂是

A.朱砂安神丸加减

B.涤痰汤加减

C.八珍汤加减

D.杞菊地黄丸加减

E.生脉散加减

103.【答案】C

【解析】气血亏虚[症状]眩晕动则加剧，劳累即发，面色㿠白，唇甲无华，心悸少寐，神疲懒言，饮食减少。舌淡，脉细弱。[治法]益气养血。[方剂应用]八珍汤（人参、白术、茯苓、甘草、当归、川芎、白芍、地黄、生姜、大枣）加减。[中成药选用]归脾丸、八珍颗粒、十全大补丸。

104.选用的中成药

A.半夏天麻丸

B.左归丸

C.养血安神丸

D.归脾丸

E.补中益气丸

104.【答案】D

【解析】气血亏虚[症状]眩晕动则加剧，劳累即发，面色㿠白，唇甲无华，心悸少寐，神疲懒言，饮食减少。舌淡，脉细弱。[治法]益气养血。[方剂应用]八珍汤（人参、白术、茯苓、甘草、当归、川芎、白芍、地黄、生姜、大枣）加减。[中成药选用]归脾丸、八珍颗粒、十全大补丸。

（105～106 共用备选题干）

【C】某女，36 岁。平素汗出较多，易患感冒；因近日鼻塞不通、常流脓涕、前额头痛等不适症状就诊，医师诊断为鼻渊，辨证为风热蕴肺兼表虚不固，开具饮片处方如下

就诊卡号：××××

就诊科室：中医科门诊

姓名：××

性别：女

年龄：36

费别：医保

××医院处方笺

临床诊断：鼻渊

黄芪 15g 炒苍耳子 15g 青蒿 10g

炒白术 15g 防风 10g 白芷 12g

辛夷 10g 黄芩 10g 薄荷 5g

菊花 10g 龙胆草 10g 甘草 6g

7 剂，水煎服

医师签名(签章)：××

×××年×月×日

金额：××× 审核/调配 签名(签章)：××核对/发药签名(签章):××

105.该患者服用 7 剂后，出现恶心、呕吐、食少等症状，相关检查显示血 ALT 显著升高，处方中最可能引起该不良反应的中药是

A.黄芩

B.苍耳子

C.龙胆草

D.白芷

E.青蒿

105.【答案】B

【解析】引起肝损伤的中药主要含毒蛋白的，主要存在于一些中药的种子中，如苍耳子、蓝麻子、望江南子、相思豆等。

106.该中药中引起肝损伤的主要化学物质属于

A.毒蛋白类

B.多肽类

C.黄酮类

D.生物碱类

E.菇类

106.【答案】A

【解析】该中药中引起肝损伤，对这个中药是苍耳子，苍耳子的主要引起肝损伤的化学物质属于毒蛋白，故选 A

（107～110 共用备选题干）

【C】某男，45 岁，平素喜饮浓茶，嗜好烟酒，经常熬夜，现入睡困难，且多梦易醒，心悸健忘，虚烦不安，时有盗汗：舌淡，苔薄，脉细，医师诊断为不寐

107.中医辨证是

A 心火炽盛

B 肝气郁结

C.心脾两虚

D 阴血亏虚

E.心肾不交

107.【答案】D

【解析】不寐:阴血亏虚[症状]不寐，健忘，心悸怔仲，虚烦不安，则盗汗、梦遗等。舌偏淡，苔薄少，脉细或细数。[治法]滋阴养血[方剂应用]天王补心丹(人参、玄参、丹参、伏苓、五味子、远志、桔梗、当归、天冬、柏子仁、酸枣仁、生地、朱砂)加减[中成药选用]天王补心丸，养血安神丸。

108.宜采用的治法是

A.交通心肾

B.滋阴养血

C 清心泻火

D 疏肝解郁

E.健脾养心

108.【答案】B

【解析】不寐:阴血亏虚[症状]不寐，健忘，心悸怔仲，虚烦不安，则盗汗、梦遗等。舌偏淡，苔薄少，脉细或细数。[治法]滋阴养血[方剂应用]天王补心丹(人参、玄参、丹参、伏苓、五味子、远志、桔梗、当归、天冬、柏子仁、酸枣仁、生地、朱砂)加减[中成药选用]天王补心丸，养血安神丸。

109.宜选用的方剂是

A 道遥散加减

B 温胆汤加减

C.朱砂安神丸加减

D.天王补心丹加减

E.交泰丸加减

109.【答案】D

【解析】不寐:阴血亏虚[症状]不寐，健忘，心悸怔仲，虚烦不安，则盗汗、梦遗等。舌偏淡，苔薄少，脉细或细数。[治法]滋阴养血[方剂应用]天王补心丹(人参、玄参、丹参、伏苓、五味子、远志、桔梗、当归、天冬、柏子仁、酸枣仁、生地、朱砂)加减[中成药选用]天王补心丸，养血安神丸。

110.对该患者的健康指导，正确的是

A.晚餐不宜过饱，不饮浓茶，睡前推荐阅读，11 点前入睡

B.晚餐尽量饱食，不饮浓茶，睡前避免阅读，11 点后入睡

C.晚餐不宜过饱，不饮浓茶，睡前推荐阅读，11 点后入睡

D.晚餐不宜过饱，不饮浓茶，睡前避免阅读，11 点前入睡

E.晚餐尽量饱食，不饮浓茶，睡前避免阅读，11 点前入睡

110.【答案】D

【解析】1．饮食易消化、富维生素食物；晚餐不宜过饱、过晚；不建议宵夜；不寐患者应尽量避免浓茶、咖啡类饮品，午后起更不宜饮用该类饮品。2．不寐患者应有规律的作息时间，尽量不熬夜，要重视“子夜眠”（即 23：00～1：00 的深睡眠），不宜超过 24：00 后入睡；更要避免睡前观看或阅读可引起紧张或兴奋的作品。应坚持锻炼，参加体育活动或经常规律走步训练，保持全身气血流畅，改善大脑血供，有助改善睡眠。3．如严重不寐或伴幻觉等，应及时就医。

四、多项选择题

【X】111.盐酸麻黄碱有较强的兴奋中枢神经作用，大剂量使用可引起失眠、头痛、心悸，心动过速等不良反应，故高血压、动脉硬化、心绞痛患者应禁用。含盐酸麻黄碱成分的中成药有

A.安嗽糖浆

B.舒肺糖浆

C 川贝枇杷糖浆

D.苏菲咳糖浆

E 镇咳宁糖浆

111.【答案】ABDE

【解析】安嗽糖浆含有盐酸麻黄碱、氯化铵；舒肺糖浆含盐酸麻黄碱、氯化铵；苏菲咳糖浆含有盐酸麻黄碱、氯化铵；镇咳宁糖浆含有盐酸麻黄碱、酒石酸锑钾。

【X】112.婴幼儿患者合理应用中药的原则有

A.用量宜轻

B.宜用轻清之品

C.宜用健脾和胃之品

D.宜用滋补之品

E.宜佐凉肝定惊之品

112.【答案】ABCE

【解析】婴幼儿患者合理应用中药的原则(1) 用药及时，用量宜轻。(2) 宜用轻清之品。

(3)宜佐凉肝定惊之品，蝉蜕、钩藤、僵蚕、地龙。(4) 宜佐健脾和胃之品，山药、白

术、山楂、陈皮、六神曲、麦芽、鸡内金。(5)不宜滥用滋补之品。

【X】113.根据未病先防的原则，培养正气，提高抗病能力的方法有

A.讲究卫生

B.注意起居

C.锻炼身体

D.人工免疫

E.避免病邪

113.【答案】BCD

【解析】杀灭病邪、讲究卫生、避免病邪侵害、防范各种外伤属于未病先防的原则中的消灭病邪，防止邪气侵害。

【X】114.某女，75 岁。形体较瘦，头晕耳鸣，眼目干涩，口燥咽干，潮热腮红，五心烦热，盗汗，小便短黄，大便干结：舌红，无苔，脉细数，可选用的中成药有

A.左归丸

B.六味地黄丸

C.杞菊地黄丸

D.右归丸

E.济生肾气丸

114.【答案】ABC

【解析】该患者的症状属于阴虚，应补阴。右归丸和济生肾气丸都为补阳剂。

【X】115.某女，45 岁。自觉畏寒，腰膝冷痛，面白：舌淡，脉沉迟。辨证为阳虚证，可采用的治法有

A.阳病治阴

B.阳中求阴

C.阴阳双补

D.阴病治阳

E.阴中求阳

115.【答案】DE

【解析】阳虚则寒，属虚寒证，阴病。治疗以“益火之源，以消阴翳”，又称”扶阳益火”“阴病治阳”。阴中求阳即在补阳时适当配用补阴药，使阳得阴助而生化无穷。二者都属于阳虚证的治法。

【X】116.中药饮片斗谱的编排是否科学、合理，直接影响配方效率和质量。处方中常以药对出现可放于同一斗中的饮片有

A.射干、北豆根

B.盐杜仲、盐续断

C.姜半夏、淡附片

D.羌活、独活

E.知母、浙贝母

116.【答案】ABDE

【解析】将同一处方中经常一起配伍应用的，如“相须”“相使”配伍的饮片、处方常用的“药对”药物可同放于一个斗中。如麻黄、桂枝；酸枣仁、远志；射干、北豆根；党参、黄芪；桃仁、红花；杜仲、续断；陈皮、青皮；泽泻、猪苓；山药、薏苡仁；板蓝根、大青叶；辛夷、苍耳子；火麻仁、郁李仁；羌活、独活；苍术、白术；麦冬、天冬；川乌、草乌；知母、浙贝母；蒲公英、紫花地丁；萹蓄、瞿麦；三棱、莪术；乳香、没药；小茴香、橘核。

姜半夏、淡附片属于配伍禁忌，不能放于同一药斗中。

【X】117.某男，35 岁。大便干结，面红身热，口臭口干，腹胀腹痛；舌红，苔黄，脉滑数。医师给予大承气汤，效果显著。该方剂体现的治法有

A.塞因塞用

B.热因热用

C.实则泻之

D.通因通用

E.热者寒之

117.【答案】CE

【解析】本证为阳明实证,属于实热证。热者寒之热性病证出现热象,用寒凉方药来治疗。实则泻之是指实性病证出现实象,用攻逐邪实的方药治疗。符合题意。

【X】118.药学咨询服务是执业药师应用所学专业知识面向患者、医护人员、公众等提供直接的、负责任的、与药品使用有关的服务，以期增强患者用药的依从性，减少药物不良反应，提高药物治疗的安全性、有效性与经济性。执业药师在用药咨询过程中的沟通技巧包括

A.认真倾听

B.注意语言表达

C.注意非语言的运用

D.咨询时间宜长不宜短

E.提供的信息不宜过多

118.【答案】ABCE

【解析】与患者的谈话时间不宜过长，提供的信息也不宜过多，过多的信息不利于患者的掌握，反而会成为沟通的障碍。解决的办法是，最好事先准备好一些宣传资料，咨询时发给患者，这样既可以节省谈话时间，也方便患者认真阅读、充分了解。

【X】119.某男，78 岁。患多种慢性病，因腰腿疼痛/头晕失眠等不适症状就诊。医师开具中成药处方如下：

XX医院处方笺

就诊卡号：XXXXX　　就诊科室：中医科门诊
姓名：XXX　　性别：男　　年龄：78　　费别：医保

临床诊断：痹症 眩晕 不寐	风湿骨痛胶囊	0.3gX32	3盒	3粒	口服	一日两次
	松龄血脉康胶囊	0.5gX24	2盒	3粒	口服	一日三次
	养血安神片	0.25gX100	2盒	5片	口服	一日三次
	乌灵胶囊	0.33gX36	5盒	3粒	口服	一日三次
	金匮肾气丸	0.2gX360	2盒	20粒	口服	一日两次
	医师签名（签章）：XXX XXXX年X月X日					

金额：XXX　审核/调配签名（签章）：XX　核对/发药签名（签章）：XX

执业药师审方时，发现该处方中多种中成药均含有乌头类药，可能加大患者发生不良反应的风险。该处方中含有乌头类药的中成药有

A.乌灵胶囊

B.金匮肾气丸

C.养血安神片

D.风湿骨痛胶囊

E.松龄血脉康胶囊

119.【答案】BD

【解析】含乌头类中成药有追风丸、追风透骨丸、三七伤药片、附子理中丸、金匮肾气丸、木瓜丸、小金丸、风湿骨痛胶囊、祛风止痛片、祛风舒筋丸、正天丸、右归丸等。

【X】120.含汞的药物服用过量或长期服用会出现腹痛腹泻，口中有金属味，流涎，牙龈肿胀溃烂，少尿，蛋白尿，严重者可发生急性肾功能衰竭。含汞的中药有

A.朱砂

B.雄黄

C.轻粉

D.银朱

E.红粉

120.【答案】ACDE

【解析】含汞矿物药 指以汞及其化合物为主要成分的一类矿物药，主要有朱砂、银朱、红粉、轻粉、白降丹等。