

一. 单选题（40 题）

1. 骨骼肌可以分为长肌、短肌、扁肌、轮匝肌，在收缩时肌肉长度显著缩短，常参与大幅度运动，多见于四肢的是哪种肌肉：

- A. 长肌
- B. 短肌
- C. 扁肌
- D. 平滑肌

2. 眼球纤维膜的外层有折光作用，无色透明，无血管，但有大量的神经末梢，感觉极为敏锐的结构是：

- A. 玻璃体
- B. 角膜
- C. 房水
- D. 虹膜

3. 椎间盘是两个相邻椎骨的椎体之间的软骨连结，在脊柱运动时，椎间盘产生楔形变，最常见的突出表现是：

- A. 颈椎间盘后外突出
- B. 腰椎间盘后外突出
- C. 胸椎间盘正中突出
- D. 腰椎间盘前突出

4. 低位脑干包括：

- A. 脑桥和延髓
- B. 小脑和脑桥
- C. 小脑和中脑
- D. 中脑和延髓

5. 中暑的病人会出现大量出汗，大量出汗导致的脱水是：

- A. 水中毒
  - B. 高渗性脱水
  - C. 低渗性脱水
  - D. 等渗性脱水
6. 高热病人，使用酒精擦浴降温的机理：
- A. 辐射
  - B. 传导
  - C. 对流
  - D. 蒸发
7. 血栓是血流在心血管系统血管内面剥落处或修补处的表面所形成的小块，血栓有利有害，下列属于有利影响的是：
- A. 血栓脱落，造成阻塞
  - B. 胃十二指肠溃疡血栓对破裂的血管起阻塞作用
  - C. 心瓣膜变形
  - D. DIC 过程中血液凝固形成血栓
8. 瘢痕是各种创伤后所引起的正常皮肤组织的外观形态和组织病理学改变的统称，它是人体创伤修复过程中必然的产物，瘢痕既有有利影响又有有害影响，下列不属于有害影响的是：
- A. 填补损伤伤口
  - B. 瘢痕收缩
  - C. 瘢痕粘连
  - D. 肥大性瘢痕
9. 下列哪种药物可广泛应用于治疗吗啡和海洛因成瘾：
- A. 芬太尼
  - B. 美沙酮
  - C. 曲马多

D. 左旋多巴

10. 患者，女性，40岁，感觉自己一直处于一种紧张不安、提心吊胆、恐惧、害怕、忧虑的内心体验中，头晕、胸闷、心慌、呼吸急促、口干、尿频、尿急、出汗、震颤，医生诊断为焦虑症，首选药：

A. 地尔硫草

B. 地西洋

C. 苯巴比妥

D. 硫喷妥钠

11. 毛果芸香碱可用于治疗青光眼，其对眼和腺体的药理作用不包括：

A. 降低眼内压

B. 调节麻痹

C. 汗腺分泌增加

D. 缩瞳

12. 走路时两腿分开的距离宽，左右摇摆，见于先天性双侧髋关节脱位，髋内翻和小儿麻痹症所致的双侧臀中、小肌麻痹，这种异常步态为：

A. 跛行

B. 鸭步

C. 呆步

D. 晃步

13. 发热是众多疾病常伴发的症状，临床诊断中热型可分为多种，若病人体温连续数天在  $40^{\circ}\text{C}$  以上，且 24 小时内波动不超过  $1^{\circ}\text{C}$ ，则其热型属于：

A. 间歇热

B. 稽留热

C. 弛张热

D. 回归热

14. 轮状病毒是一种双链核糖核酸病毒，容易导致：

- A. 流行性感
- B. 病毒性心肌炎
- C. 病毒性肺炎
- D. 急性胃肠炎

15. 下列关于微生物分布的说法，正确的是：

- A. 空气中的微生物数量多于土壤中的微生物数量
- B. 正常人体血液中有细菌存在
- C. 正常人体皮肤没有微生物存在
- D. 外耳道有正常菌群的分布

16. 糖在生命活动中的主要作用是提供碳源和能源，其消化吸收的主要场所是：

- A. 回肠
- B. 大肠
- C. 胃
- D. 小肠

17. 在问诊过程中，医师利用与患者交流的机会，对患者及患者家属讲解相关疾病知识及如何多方共同承担起维护健康、促进健康的责任，这就体现了问诊的医德要求是：

- A. 严肃认真
- B. 尊重患者隐私
- C. 对任何患者一视同仁
- D. 对患者进行健康教育和健康指导

18. 肺叶由于叶间裂的存在而被分割，一般是（）。

- A. 左二右三
- B. 左三右二

C. 左三右三

D. 左二右二

19. 心脏瓣膜的主要功能是（）。

A. 防止血液循环

B. 防止血液流过

C. 防止血液倒流

D. 防止血流过快

20. 胃壁组织由外而内可分为四层，则外面第二层应为（）。

A. 肌层

B. 黏膜下层

C. 浆膜层

D. 黏膜层

21. 神经细胞静息时，递质在胞体一般贮存于何处（）。

A. 线粒体

B. 突触小泡

C. 高尔基体

D. 溶酶体

22. 正常窦性心律速率为（）

A. 45~60 次/分

B. 100~160 次/分

C. 60~100 次/分

D. 45~100 次/分

23. 一般留置导尿管 3~4 天后，细菌尿的发生率达（）

A. 50%以上

B. 60%以上

C. 70%以上

D. 90%以上

24. 细胞膜内外正常钠和钾浓度差的形成和维持，是由于（）

A. 膜安静时钾通透性大

B. 膜兴奋时钠通透性增加

C. 钠易化扩散的结果

D. 膜上钠泵的作用

25. 硝酸甘油对下列哪个血管组织的作用最强（）

A. 毛细血管括约肌

B. 毛细血管后静脉

C. 冠状动脉阻力血管

D. 小动脉

26. 肿瘤的形状与哪个因素无关？（）

A. 组织来源

B. 生长方式

C. 肿瘤的性质

D. 生长时间

27. 结核杆菌侵入机体的途径，不可能的是（）

A. 呼吸道中

B. 破损的皮肤

C. 消化道

D. 节肢动物的叮咬

28. 门静脉血液回流受阻时，首先引起下列哪个脏器淤血（）

- A. 肾
- B. 膀胱
- C. 肠
- D. 子宫

29. 国家对传染病防治的方针是（）

- A. 预防为主
- B. 防治结合、分类管理
- C. 依靠科学、依靠群众
- D. 以上三项都是

30. 医疗机构必须按照核准登记的（）开展诊疗活动。

- A. 诊疗科目
- B. 注册资金
- C. 医务人员
- D. 诊疗时间

31. 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过（）天。

- A. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 2

32. 脑脊液主要由（）

- A. 脉络丛产生
- B. 蛛网膜产生
- C. 蛛网膜粒产生
- D. 软脑膜产生

33. 正常人尿中的主要色素是 ( )

- A. 胆色素
- B. 胆红素
- C. 胆绿素
- D. 胆汁酸

34. 关于吸气性呼吸困难的特点不正确的是 ( )

- A. 高调的吸气性哮鸣音
- B. 严重时出现“三凹症”
- C. 吸气时间长于呼气时间
- D. 呼吸频率增加

35. 下列不属于载体易化扩散特点的是 ( )

- A. 饱和性
- B. 高度特异性
- C. 具有电压依赖性
- D. 竞争性抑制

36. 发作性呼气性呼吸困难见于 ( )

- A. 支气管哮喘
- B. 胸膜粘连
- C. 支气管扩张
- D. 支气管异物

37. 患者气短。查体：气管向左偏移，右侧胸廓饱满，叩诊出现实音。应首先考虑的是 ( )

- A. 右侧胸腔积液
- B. 右侧气胸
- C. 肺气肿



D. 右侧胸膜增厚

38. 呼吸系统的功能是

- A. 进行气体交换
- B. 进行水液代谢
- C. 呼出氧气，吸入二氧化碳
- D. 进行血液循环

39. 调节呼吸最重要的生理化学因素是

- A.  $\text{CO}_2$
- B. CO
- C.  $\text{NO}_2$
- D. NO

40. 测血压之前必须休息片刻，坐位或卧位，伸直肘部，手掌向上，应使

- A. 肱动脉与心脏在同一水平面
- B. 肱动脉与主动脉在同一水平面上
- C. 桡动脉与心脏在同一水平面上
- D. 肱静脉与心脏在同一水平面上

## 二. 多选题（10 题）

41. 子宫位于小骨盆中央，在膀胱与直肠之间，下端接阴道，两侧有（），它们合称为子宫附件。

- A. 输卵管
- B. 卵巢
- C. 大肠
- D. 胆囊

42. 咀嚼是各咀嚼肌有顺序地收缩所组成的复杂的反射性动作，咀嚼的作用包括：

- A. 通过上、下牙以相当大的压力相互接触，将食物切割或磨碎
- B. 咀嚼可使唾液淀粉酶与食物充分接触而产生化学性消化
- C. 反射性地引起胃、胰、肝和胆囊的活动加强，为下一步消化和吸收做好准备
- D. 清洁保护口腔

43. 药物在体内分布的影响因素：

- A. 药物的脂溶度
- B. 毛细血管通透性
- C. 药物  $pK_a$
- D. 局部酸碱度

44. 患者满月脸，水牛背，皮肤红，头背有痤疮，胡须，可能是：

- A. 慢性肾病
- B. 库欣综合征
- C. 长期使用糖皮质激素
- D. 急性感染

45. 华医生，通过半个多世纪的呕心沥血，推动了中国医学的起步与发展，年近 90 岁，他依然坚守在一线，平时不但忙于院务，还要经常外出主持学术会议。即便如此，他仍坚持在每个星期二的上午看门诊，若是出差错过了，回来还得补上。从医多年，华医生始终认为医德比医术重要，“德”是他挑选弟子的首要标准。华医生临死之前要求学生把他的尸体无偿捐献给国家，用作解剖，华医生体现的医德有：

- A. 实行保护性医疗
- B. 奋发进取，专研医术
- C. 尊重病人的人格和权利
- D. 救死扶伤

46. 生理性蛋白尿见于（）

- A. 剧烈活动后

- B. 高温环境
- C. 精神紧张
- D. 直立较久

47. 医师是指依法取得执业医师、执业助理医师资格，经注册在医疗机构从事（）工作的人员。

- A. 医疗
- B. 康复
- C. 预防
- D. 保健

48. 医疗机构不得使用的医疗器械（）

- A. 未经注册
- B. 无合格证明
- C. 过期、失效
- D. 裁减的

49. 下列热型中，高热期与无热期交替出现的有哪些？（）

- A. 稽留热
- B. 间歇热
- C. 弛张热
- D. 回归热

50. 下列药物很难以单纯扩散的方式经胎盘进入胎儿体内的是（）

- A. 水溶性药物
- B. 脂溶性药物
- C. 高度解离性药物
- D. 青霉素类药物

### 三. 判断题（10 题）

51. 运动性失语指患者能理解他人的语言但不能用语言同别人对话，有的患者虽能发音但不能组成语言。
52. 血液循环分为体循环和肺循环，二者相互独立，互不相干。
53. 基础体温为基础状态下的体温，需在早晨起床前测量。
54. 严禁对胎儿进行非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学原因的大月份引产。
55. 无偿献血的血液必须用于临床，不得买卖。
56. 风湿性心瓣膜病致死的主要原因是心力衰竭
57. 高压蒸汽灭菌的纱布敷料棉球打开未用完，最长保存期为 24h。
58. 肝硬化大量放腹水时易诱发肝昏迷。
59. 各种理化因素刺激而引起的尿频、尿急、尿痛称为尿路刺激征。
60. 标准预防的具体措施有：视所有病人血液、体液均有传染性，而采取相应措施，强调病人与医务人员间的双向防护。接触隔离，空气隔离，飞沫隔离。