

临床考试试卷

以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 发生尿瘘的原因不正确的是

- A. 难产处理不当
- B. 妇科手术损伤
- C. 生殖道肿瘤放疗后
- D. 膀胱结石及先天性输尿管口异位畸形
- E. 子宫内膜异位症侵犯膀胱

2. 关于产褥感染子宫内膜炎，不正确的是

- A. 急性子宫内膜炎是常见的严重产褥感染
- B. 细菌由胎盘剥离面侵入，扩散至全内膜及肌层
- C. 可引起盆腔结缔组织炎、盆腔炎、血栓性静脉炎
- D. 炎症轻重主要取决于产妇抵抗力，而与细菌种类无关
- E. 多为厌氧菌、链球菌等混合感染

3. 臀位阴道分娩，产程处理正确的是

- A. 鼓励产妇离床活动，加速产程
- B. 宫口扩张 1-2cm 时，温肥皂水灌肠
- C. 胎膜破裂后立即听胎心
- D. 宫缩时阴道口见胎足，提示进入第二产程
- E. 为避免胎膜破裂时脐带脱垂，应在活跃期充分堵臀

4. 白内障的主要症状为

- A. 视物模糊
 - B. 屈光改变
 - C. 眼痒
 - D. 视物疲劳
 - E. 复视
- { }

5. 消化道传染病的传播途径是

- A. 空气、飞沫、尘埃
- B. 水、食物、食具
- C. 节肢动物密切接触、飞沫
- D. 接触吸血节肢动物
- E. 输血注射、尘埃

6. 溃疡性结肠炎病变多位于

- A. 回盲部
- B. 末端回肠

- C.升结肠
- D.直肠和乙状结肠
- E.肛门

7.常年性变应性鼻炎鼻腔的检查可见

- A.鼻粘膜呈苍白色，明显水肿
- B.鼻粘膜肥厚暗红色，表面不平
- C.鼻粘膜肿胀暗红色，表面光滑
- D.鼻和鼻道内多脓涕，有恶臭
- E.鼻腔肥大

8.患者女，45岁。G2P1，未绝经。腰骶部疼痛，行走时有块状物自阴道口脱出。

查体：阴道前壁及部分阴道后壁已膨出阴道外，宫颈和部分宫体已脱出于阴道口，诊断为

- A.子宫脱垂Ⅱ度重，伴有阴道前壁膨出重度，阴道后壁膨出中度
- B.子宫脱垂Ⅱ度，膀胱膨出重度
- C.子宫脱垂Ⅲ度，阴道后壁膨出轻度
- D.子宫脱垂Ⅰ度重，膀胱膨出中度，直肠膨出轻度
- E.子宫脱垂Ⅱ度轻，膀胱膨出重度，直肠膨出轻度

1.Ⅰ度

指宫颈外口水平低于坐骨棘水平，未达到处女膜缘，宫颈及宫体仍位于阴道内。该程度子宫脱垂无须治疗，注意休息即可恢复。

2.Ⅱ度

指子宫颈已脱出阴道口之外，而子宫体或部分子宫体仍在阴道内。但因包括范围过大，轻者仅宫颈脱出阴道口外，重者可因宫颈延长，以致延长的宫颈及阴道壁全部脱出阴道口外。

Ⅱ度子宫脱垂又分轻、重两型：①Ⅱ度轻型 子宫颈脱出阴道口外，宫体仍在阴道内。②Ⅱ度重型 宫颈与部分宫体以及阴道前壁大部或全部均脱出阴道口外。

3.Ⅲ度

指整个子宫体与宫颈以脱出阴道口外。

9.胃癌最多见的好发部位在

- A.胃贲门
- B.胃幽门
- C.胃窦部
- D.胃体
- E.全胃

10.用于肺栓塞排除性诊断的检查是

- A.心电图
- B.心脏超声
- C.血清D-二聚体
- D.肺CT

E.动脉血气分析

11.伴有反复晕厥的缓慢型心律失常的最佳治疗方法是

- A.阿托品
- B.氨茶碱
- C.肾上腺素
- D.异丙肾上腺素
- E.人工心脏起搏

12.骨细胞瘤 X 线片的表现特点是

- A.骨干中心透明影中有钙化
- B.骨端膨胀破坏，呈肥皂泡沫样改变
- C.骨膜被掀起形成三角
- D.骨端骨皮质呈葱皮样改变
- E.骨端突起，无明显骨破坏

13.典型的小细胞低色素性贫血见于

- A.再生障碍性贫血
- B.缺铁性贫血
- C.溶血性贫血
- D.急性失血性贫血
- E.骨髓病性贫血

14.新生儿胸外心脏按压的频率为

- A.110 次/分
- B.100 次/分
- C.90 次/分
- D.80 次/分
- E.70 次/分

15.有助于诊断单纯性脾破裂的临床表现不包括

- A.脉搏加快
- B.典型腹膜炎体征
- C.左侧肋骨骨折
- D.腹穿抽出不凝血
- E.血压下降

16.可能与胃癌有关的病原菌是

- A.空肠弯曲菌
- B.幽门螺杆菌
- C.胎儿弯曲菌

- D.鼠伤寒沙门菌
- E.副溶血性弧菌

17.手外伤后估计会发生关节强直的患者，手部应固定在

- A.休息位
- B.功能位
- C.保护位
- D.手指伸展位
- E.半握拳位

18.上腔静脉梗阻综合征最常见于

- A.支气管肺癌
- B.纵隔肿瘤
- C.甲状腺瘤
- D.胸主动脉瘤
- E.慢性缩窄性心包炎

19.对放射治疗最敏感的睾丸肿瘤是

- A.畸胎瘤
- B.畸胎癌
- C.绒毛膜上皮细胞癌
- D.精原细胞瘤
- E.胚胎癌

20.脑外伤患者查体时出现四肢伸直、角弓反张的意义是

- A.正常反射
- B.中脑损伤
- C.桥脑损伤
- D.延脑损伤
- E.间脑损伤

21.初产妇，30岁。足月自然分娩，胎儿娩出后，胎盘未娩出前出血。

下列处理措施错误的是

- A.胎盘未娩出，出血 $>300\text{ml}$ ，应立即手取胎盘
- B.植入性胎盘应先试行人工剥离胎盘术
- C.胎盘剥离不全或黏连伴出血，应行人工剥离胎盘
- D.胎盘嵌顿在子宫狭窄环以上者，可在全麻下带缩窄环松解后取出胎盘
- E.如系膀胱过度膨胀所引起胎盘滞留，应先导尿

22.用于促排卵治疗的首选药物是

- A.HMG
- B.hCG
- C.GnRH-a
- D.克罗米芬
- E.溴隐亭

23.Pavlik 吊带治疗发育性髋关节脱位适宜的年龄为

- A.3 月龄以下
- B.6-9 月龄以下
- C.12 月龄以下
- D.2 岁以下
- E.3 岁以下

24.影响摄氧量的主要因素不包括

- A.肺泡气体交换
- B.动脉弹性
- C.组织气体交换
- D.组织耗氧量
- E.心输出量

25.不符合室间隔缺损患者临床表现的检查结果是

- A.胸部 X 线示肺血流量减少
- B.肺动脉段凸起
- C.心电图呈双心室肥大
- D.肺动脉压增高
- E.右心室 $\text{SaO}_2 > \text{右心房 } \text{SaO}_2$

26.石棉可引起的肿瘤是

- A.肝血管肉瘤
- B.鼻咽癌
- C.白血病
- D.胸膜间皮瘤
- E.皮肤癌

27.腹痛患儿未明确诊断前，禁用的药物是

- A.阿托品
- B.西咪替丁
- C.颠茄合剂
- D.哌替啶
- E.胃复安

28. 出现黑便提示消化道出血量至少大于

- A. 1-2ml/d
- B. 5ml/d
- C. 50-70ml/d
- D. 100ml/d
- E. 250ml/d

29. 三凹征常见于

- A. 肺泡弹性减弱
- B. 小支气管痉挛
- C. 小支气管炎症
- D. 喉、气管狭窄
- E. 广泛支气管扩张

30. 为利于伤口愈合及美观，在设计切口时应

- A. 顺皮纹方向
- B. 垂直于皮纹方向
- C. 垂直于蓝格纹方向
- D. 呈梭形
- E. 随意设计

31. 对高度怀疑黑色素瘤的患者应

- A. 密切观察病灶变化
- B. 穿刺细胞学检查
- C. 病灶部分活检
- D. 完整切除病灶，送病理检查
- E. 激光冷冻切除病灶

32. 小儿最常见的先天性心脏病是

- A. 肺动脉瓣狭窄
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 完全性大动脉转位

33. 下列哪种肛瘘适于一期手术切除

- A. 高位单纯性
- B. 低位复杂性
- C. 高位复杂性
- D. 低位单纯性

E.低位复杂性并肛周脓肿

34.外阴鳞状上皮增生的病因是

- A.局部皮肤营养失调或代谢紊乱
- B.局部皮肤长期慢性损失
- C.过敏
- D.局部长期炎性刺激
- E.病因不明

35.绝经后不规则阴道出血患者，肥胖，有糖尿病和高血压家族史，妇科检查及B超显示子宫略大，余未见异常，下一步应进行的特殊检查是

- A.心电图检查
- B.血脂检查
- C.阴道超声检查
- D.血糖检查
- E.子宫分段诊刮

36.患者无明确客观原因而产生的内心紧张、恐惧、坐卧不安的体验是

- A.恐怖
- B.虚构
- C.感觉过敏
- D.焦虑
- E.情绪不稳

37.理论上，医学实验研究样本含量的估计取决于

- A.总体标准差、第Ⅰ类错误的概率、检验效能
- B.总体参数间的差值、总体标准差、第Ⅰ类错误的概率、检验效能
- C.总体参数间的差值、总体标准差、第Ⅰ类错误的概率
- D.总体参数间的差值、第Ⅰ类错误的概率、检验效能
- E.总体参数间的差值、总体标准差、检验效能

38.多发性周围神经病的感觉障碍的分布规律为

- A.交叉型
- B.偏身型
- C.条带型
- D.躯干横截面
- E.手套、袜套样

2.可有下运动神经元性瘫痪，表现肌无力、肌萎缩和肌束颤动等，远端重于近端；下肢肌萎缩，行走时有手足下垂和跨越步态。

- 3.四肢腱反射减弱及消失。
4.肢体远端皮肤发凉，多汗或无汗，指（趾）甲松脆，皮肤菲薄、干燥或脱屑，竖毛障碍。

39.慢性肺心病右心室肥大最可能出现的表现是

- A.心音低钝
- B.心界缩小
- C. $P_2 > A_2$
- D.剑突下有明显搏动
- E.双肺听诊有湿啰音

40.下列哪种情况不符合 ARDS 的表现

- A.双肺弥漫性浸润阴影
- B.呼吸窘迫，呼吸频率 > 28 次/分
- C. $PaO_2 < 60$ mmHg
- D. $PaO_2/FiO_2 < 200$ mmHg
- E.PCWP > 18 cmH₂O

41.新生儿肺透明膜病的主要症状是

- A.抽搐
- B.体温降低
- C.拒乳、呕吐
- D.肝脏增大、心率增快
- E.进行性呼吸困难、发绀

42.有关急性感染性多发性神经根炎的瘫痪症状，描述不正确的是

- A.多为对称性
- B.为弛缓性瘫痪
- C.可有呼吸肌麻痹
- D.为痉挛性瘫痪
- E.常有面瘫

43.干性支气管扩张是指

- A.干咳为主
- B.仅有早晨咳嗽及咳痰
- C.纤维支气管镜检见支气管粘膜干燥、萎缩
- D.仅有反复咯血，一般无咳嗽、咳痰
- E.病变局限于上叶

44.心脏病孕妇最容易发生心力衰竭的时期是

- A.妊娠 24-26 周
- B.妊娠 28-30 周

C.妊娠 32-34 周

D.妊娠 36-37 周

E.妊娠 38-40 周

45.在肿块触诊中，不属于癌性肿块特性的是

A.高低不平

B.坚硬如石

C.推之不能移动

D.表面与皮肤粘连

E.表面光滑

46.关于成人肾肿瘤的叙述，错误的是

A.多发于 40 岁以上男性

B.发生于肾实质的肾癌多见

C.早期出现腰部包块

D.反复发作间歇性无痛性肉眼血尿

E.X 线片显示：患侧肾影增大，不规则

47.心尖搏动向左下移位见于

A.左心房增大

B.左心室增大

C.右心房增大

D.右心室增大

E.双心房增大

48.系统性炎症反应综合征的临床表现不包括

A.体温 $>38^{\circ}\text{C}$ 或 $<36^{\circ}\text{C}$

B.心率 >90 次/分

C.呼吸急促，频率 >20 次/分

D.血白细胞计数 $<4 \times 10^9/\text{L}$

E.黄疸，总胆红素 $>34\text{mmol/L}$

49.关于结核菌素试验的叙述，不正确的是

A.皮下注射

B.注入左前臂掌侧面中下 1/3 处

C.使之形成 6-10mm 的皮丘

D.注射量为 0.1ml

E.48-72 小时后观察反应结果

50.中脑导水管

A.与脚间窝相通

B.后方为被盖

C.是第三脑室与侧脑室的通道

D.位于大脑脚底

E.有中央灰质环绕

51.关于溶血反应的原因，错误的是

A.输入有缺陷的红细胞

B.Rh 血型不合也可发生溶血反应

C.误输了 ABO 血型不合的血液引起

D.受血者患有自身免疫性贫血

E.病人体内存在 IgA 水平低下或检出 IgA 抗体

52.关于新生儿皮下坏疽的描述，不正确的是

A.病变多发生在背部及臀部

B.患儿表现为发热、哭闹

C.早期皮肤发红、质地稍变硬

D.病变部位可触到捻发音

E.晚期病变皮肤出现局部坏死，变为灰褐色

53.关于化疗药物应用的叙述，错误的是

A.可静滴、口服、肌注或肿瘤内注射、腔内注射等

B.大剂量冲击治疗毒性较显著

C.目前较常采用中剂量间断治疗

D.联合用两种相同类型的化疗药物，其疗效相加

E.联合用药可同时给药或序贯给药

54.烧伤严重程度分类，关于轻度烧伤正确的是

A.成人烧伤总面积 $<10\%$ 的Ⅱ度烧伤

B.成人Ⅲ度烧伤面积 $<5\%$

C.小儿烧伤总面积 $<10\%$

D.合并轻度吸入性损伤

E.成人烧伤总面积 $<15\%$ 的Ⅱ度烧伤

55.初产妇，临产后 7 小时。宫口扩张 6cm，2 小时无进展。考虑诊断是

A.正常产程

B.潜伏期延长

C.活跃期停滞

D.第二产程延长

E.活跃期延长

56.治疗肥厚型心肌病的药物

A.洋地黄

B. 氨氯地平

C. β -受体阻滞剂

D. 利尿剂

E. 硝酸酯

(1) β 受体阻滞剂 心得安、氨酰心安、美托洛尔、比索洛尔。

(2) 钙离子拮抗剂 异搏定、硫氮卓酮。

(3) 抗心衰治疗（终末期）可用利尿剂及扩血管药。

(4) 抗心律失常 乙胺碘呋酮、双异丙比胺，有抗心律失常及负性肌力作用。

57. 二尖瓣乳头肌断裂可以导致

A. 二尖瓣脱垂

B. 心肌坏死

C. 心肌缺血

D. 二尖瓣狭窄

E. 左心房容量减小

58. 检查腹股沟疝时，压迫内环的部位应在

A. 腹股沟韧带中点

B. 精索的前内方

C. 腹股沟韧带中点上方

D. 肿块隆起最明显处

E. 耻骨结节外缘

59. 肾盂癌最常见的症状是

A. 高血压

B. 腰部包块

C. 肾绞痛并有血尿

D. 间歇性无痛肉眼全程血尿

E. 精索静脉曲张

60. 临床分期为 T2 的肾癌患者，首选的治疗方法是

A. 肿瘤切除术

B. 根治性肾切除术

C. 放疗

D. 化疗

E. 中药治疗

61. 不属于基因工程抗体的是

A. 人-鼠嵌合抗体

B. Fab

- C. 抗体融合蛋白
- D. 双特异性抗体
- E. 酶标记抗体

62. 关于皮脂腺囊肿的临床特点，正确的是

- A. 质软、有波动感
- B. 与基底无黏连
- C. 不易并发感染
- D. 易癌变
- E. 挤压时，有带臭味的血皮脂溢出

63. 关于急性胰腺炎的叙述，不正确的是

- A. 突发腹痛
- B. 常伴有腹胀
- C. 严重者可以出现休克、呼吸和肾功能障碍
- D. 增强 CT 具有诊断价值，但难以判断有无胰腺坏死
- E. 血清脂肪酶升高可以作为诊断的参考

64. 新生儿的异常表现为

- A. 腹壁反射阴性
- B. 踝阵挛阳性
- C. 巴宾斯基征阳性
- D. 握持反射阴性
- E. ATNR 阳性

65. 婴幼儿最常见的贫血是

- A. 感染性贫血
- B. 失血性贫血
- C. 溶血性贫血
- D. 营养性缺铁性贫血
- E. 巨幼红细胞性贫血

66. 出现皮肤巩膜发黄时，首先应考虑的检查是

- A. 血清酶学
- B. 血清胆红素升高的类型与程度
- C. 尿胆红素
- D. 尿胆原
- E. 肝胆 B 型超声波

67. 小儿支气管肺炎中，引起细菌性肺炎的最常见病菌为

- A.肺炎克雷伯菌
- B.铜绿假单胞菌
- C.金黄色葡萄球菌
- D.流感嗜血杆菌
- E.肺炎链球菌

68.引起心衰加重的诱因不包括

- A.全身感染
- B.酸碱平衡失调
- C.胃粘膜损伤
- D.心律失常
- E.妊娠

69.患者男，64岁。因巨脾的脾亢行脾切除术，术后2周血小板 $1200 \times 10^9/L$ ，下一步最合适的措施为

- A.安慰
- B.华法林治疗
- C.静注肝素
- D.阿司匹林治疗
- E.放置下腔静脉滤器

70.对骨肿瘤的诊断、鉴别诊断，最有价值的检查是

- A.X线片
- B.核素骨扫描
- C.MRI
- D.组织活检
- E.查ALP

71.特异性免疫疗法有

- A.卡介苗
- B.转移因子
- C.接种肿瘤免疫核糖核酸
- D.左旋咪唑
- E.干扰素

72.影响神经系统发育的最重要的激素是

- A.肾上腺素
- B.甲状腺素
- C.生长激素
- D.胰岛素
- E.醛固酮

73. 青春期功血的治疗原则是

- A. 减少月经量
- B. 调整月经，减少月经量
- C. 调整垂体与性腺功能
- D. 止血，调整周期
- E. 促进子宫发育

74. 最能反映婴儿营养状况的体格发育指标是

- A. 胸围
- B. 头围
- C. 身长
- D. 体重
- E. 前囟大小

75. 乙肝的潜伏期为

- A. 1 周-1 个月
- B. 3 周-3 个月
- C. 5 周-5 个月
- D. 4 周-6 个月
- E. 7 周-7 个月

76. 下列属于类固醇激素的是

- A. 胰岛素
- B. 泌乳素
- C. 雄激素
- D. ACTH
- E. 肾上腺素

77. 关于结核性胸膜炎的叙述，正确的是

- A. 频繁抽液可以造成蛋白丢失，因此应尽量避免
- B. 因为胸液容易包裹，因此抽液时应常规注入激素
- C. 胸膜炎的发生机制主要是过敏因素参与，因此抗结核治疗的时间可以缩短
- D. 胸液中未找见结核菌并不能否定结核性胸膜炎的诊断
- E. 胸液 ADA 一般小于 20U/L

78. 患者以便血为主诉就诊，一般均应做肛查排除

- A. 内外痔
- B. 肛痿
- C. 肿瘤病变
- D. 肛裂

E. 直肠脱垂

79. 原发性肝癌肝内播散的最主要途径是

- A. 经淋巴管
- B. 经肝静脉
- C. 经肝动脉
- D. 经门静脉
- E. 直接侵犯

80. 对于泌乳素瘤的叙述，错误的是

- A. 泌乳素瘤是最常见的有分泌功能的垂体瘤
- B. 患者可有闭经和溢乳
- C. 泌乳素瘤患者血泌乳素水平一般大于 $200 \mu\text{g/L}$
- D. 妊娠可能促进泌乳素瘤的生长
- E. 多巴胺受体激动剂可促进泌乳素瘤泌乳素的分泌

81. 骨软骨瘤的常见表现为

- A. 局部肿痛明显，皮温增高
- B. 关节部位的肿块，质中等，压痛明显
- C. 靠近骨端的肿块，质硬，无压痛，不移动，边界清
- D. 肢体肿块，有囊性感，可移动，边界清
- E. 骨干可触及硬性肿块，明显红肿，多有压痛，边界不清

82. 2:1 等张含钠液是指

- A. 2 份 5% 葡萄糖，1 份 1.4% 碳酸氢钠
- B. 2 份 5% 葡萄糖，1 份生理盐水
- C. 2 份生理盐水，1 份 1.4% 碳酸氢钠
- D. 2 份生理盐水，1 份 5% 葡萄糖
- E. 1 份 1.4% 碳酸氢钠，1 份生理盐水

83. 关于肾的结构的叙述，正确的是

- A. 肾实质分为肾皮质、肾髓质和肾窦
- B. 肾髓质有肾锥体和肾柱构成
- C. 肾髓质富含血管，新鲜标本上呈红褐色
- D. 肾锥体尖端朝向皮质
- E. 肾窦内包含肾小盏、肾大盏、肾盂、神经、血管等

在肾窦内有肾小盏，为漏斗形的膜状小管，围绕肾乳头。肾锥体与肾小盏相连接。每肾有 7~8 个肾小盏，相邻 2~3 个肾小盏合成一个肾大盏。每肾有 2~3 个肾大盏，肾大盏汇合成扁漏斗状的肾盂。肾盂出肾门后逐渐缩窄变细，移行为输尿管。

84.关于系膜毛细血管性肾小球肾炎，不正确的是

- A.好发于青少年
- B.高血压、贫血及肾功能损害常见，常呈持续性进行性发展
- C.75%的患者有持续性低补体血症
- D.病理表现为肾小球基底膜呈分层状增厚，毛细血管襻呈双轨征
- E.女性发病率明显大于男性

85.下列药物不会引起急性胰腺炎的是

- A.糖皮质激素
- B.双氢克尿噻
- C.硫唑嘌呤
- D.钙片
- E.磺胺

86.为减少肝性脑病患者肠道有毒物质的产生，首选的抗菌药物是

- A.青霉素
- B.氯霉素
- C.新霉素
- D.磺胺嘧啶
- E.黄连素

87.混浊尿加热时尿液变为清亮，其混浊原因是

- A.脓尿
- B.磷酸盐沉淀
- C.尿酸盐沉淀
- D.碳酸盐沉淀
- E.乳糜尿

88.患者女，32岁。因急性坏疽性阑尾炎行急诊手术治疗，术后第4天体温升高至38.8℃，出现尿频尿急、大便次数增多和里急后重。应首先考虑的诊断是

- A.急性肾盂肾炎
- B.肺部感染
- C.细菌性痢疾
- D.过敏性结肠炎
- E.盆腔脓肿

89.患者女，28岁。妊娠早期有早孕反应，尿hCG阳性。于妊娠17周时感有胎动。B超示单胎，头位，见心脏搏动。现为妊娠26周，近2周来自自觉胎动停止，腹部不再增大，来门诊检查。宫底平脐，未闻及胎心，复查B超未见胎心搏动和胎动。临床诊断是

- A.过期流产
- B.习惯性流产

- C.死胎
- D.死产
- E.葡萄胎

90.患者男，65岁。咳嗽、咳痰、喘息、发热1周，痰为红色胶冻样。既往COPD病史10年。查体：双肺哮鸣音、湿啰音。外周血白细胞 $5 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞90%，胸部X线平片示右肺中上野大片状阴影，内有数个空洞。最可能的诊断是

- A.金黄色葡萄球菌肺炎
- B.铜绿假单胞菌肺炎
- C.克雷伯杆菌肺炎
- D.侵袭性肺真菌病
- E.COPD急性加重

91.患者男，38岁。右上腹不适，消瘦，乏力3周。既往患乙肝12年。最有助于诊断早期肝癌的临场表现是

- A.轻度黄疸，少量腹水
- B.右肋缘下触及肿大肝脏
- C.B超检查示右肝低回声团块影直径2.5cm
- D.贫血、黑便
- E.锁骨上淋巴结肿大

92.患者男，33岁。胃大部切除术后第7天，手术切口轻度红肿，无脓性渗出，触诊无波动感。该切口愈合水平属于

- A.Ⅰ类切口甲级愈合
- B.Ⅱ类切口甲级愈合
- C.Ⅱ类切口乙级愈合
- D.Ⅲ类切口甲级愈合
- E.Ⅲ类切口乙级愈合

93.患者男，28岁。汽车司机。吃河虾后，全身皮肤出现散在分布、大小不等的红色风团，剧痒难忍，诊断为“荨麻疹”。应选用的治疗药物是

- A.氯雷他定
- B.异丙嗪
- C.扑尔敏
- D.苯海拉明
- E.赛庚啶

94.患者男，69岁。去年曾经有3次痛风关节炎发作。此次发作始于2天前，且在使用NSAIDs后已经部分缓解。血尿酸 $460 \mu\text{mol/L}$ ，血肌酐 $180 \mu\text{mol/L}$ 。建议的治疗是

- A.加用秋水仙碱0.5mg，每4小时直到症状完全缓解
- B.立刻开始服用丙磺舒500mg，bid
- C.立刻开始服用别嘌醇100mg，bid

- D.先服用秋水仙碱 0.5mg, bid, 待发作完全缓解 2 周后再开始加用丙磺舒 500mg, bid
E.先继续服用 NSAIDs, 待发作完全缓解 2 周后再开始加用别嘌醇 100mg, bid

95.患者男, 60 岁。既往有慢性肝炎史。因昨天突然呕血 800ml 转来我院急诊。查体: 脉搏有力、不快, 血压 98/60mmHg。首选的检查方法是

- A.置三腔管压迫观察是否能止血
B.血常规、肝功能检查
C.急诊胃镜检查
D.急诊选择性肠系膜上动脉、腹腔动脉造影检查
E.急诊 B 超、CT 检查

96.患者男, 27 岁。近月来劳累后出现乏力、盗汗、纳差, 无发热、咳嗽等。今日突然大咯血。禁忌进行的检查是

- A.外周血常规
B.心电图
C.支气管碘油造影
D.胸部 X 线
E.血液生化检查

97.患者女, 38 岁。因脾肿大、脾功能亢进行脾切除手术, 术后 3 周持续低热, 无寒战, 无腹痛, 白细胞 $13.0 \times 10^9/L$ 。最可能的诊断是

- A.出血
B.左膈下脓肿
C.暴发性感染
D.门静脉血栓
E.盆腔脓肿

98.患者因反复心悸入院, 心电图示 P 波消失, 见锯齿波, 频率 300 次/分, 心率 150 次/分。最可能的诊断是

- A.正常心电图
B.房性心动过速
C.心房扑动伴 2:1 房室传导
D.完全房室阻滞
E.心房颤动伴房室阻滞

(1) 心电图检查 P 波消失, 代以形态, 间距及振幅均绝对整齐呈锯齿状 F 波, 频率 250~350 次/分钟, 常见的房扑多为 2: 1 传导。

(2) 以心电图特征可分为 2 型: I 型扑动波频率 300 次/分钟左右, II, III, aVF 导联 F 波为负向, II 型扑动波频率 250 次/分钟, II, III, aVF 导联 F 波直立, 起搏治疗可终止 I 型, 对 II 型无效。

99.患者女, 反复发作抑郁症伴精神病性症状, 怀孕 2 个月。最合适的治疗是

- A. 舍曲林
- B. 文拉法辛
- C. 吗氯贝胺
- D. 无抽搐 ECT
- E. 安非他酮

100. 患者女，24 岁。停经 3 个月，双乳易触发泌乳，TRH 兴奋试验无明显变化。
可能的诊断为

- A. 早孕
- B. 甲亢
- C. 催乳素瘤
- D. 结核
- E. 继发闭经