

## 护资-模考 1

【A1/A2】1. 属于健康性护理诊断的是

- A. 语言沟通障碍
- B. 清理呼吸道无效
- C. 有窒息的危险
- D. 母乳喂养有效
- E. 活动无耐力

【A1/A2】2. 对患者进行健康教育属于

- A. 独立性护理措施
- B. 非独立性护理措施
- C. 协作性护理措施
- D. 依赖性护理措施
- E. 辅助性护理措施

【A1/A2】3. 传染病区护士中班结束与夜班护士床旁交班后，脱下的隔离衣悬挂正确的是

- A. 挂在治疗室，污染面朝外
- B. 挂在治疗室，清洁面朝内
- C. 挂在病室，清洁面朝外
- D. 挂在内走廊，清洁面朝外
- E. 挂在内走廊，清洁面朝内

【A1/A2】4. 护士的标准预防护理措施中不包括

- A. 洗手
- B. 进行免疫接种
- C. 戴手套
- D. 穿隔离衣
- E. 戴口罩

【A1/A2】5. 在护理程序中，下列不属于信息输出的是

- A. 确定护理诊断
- B. 评价患者健康状况的变化
- C. 实施护理措施
- D. 根据需要确定是否需要调整护理计划和措施
- E. 制订护理计划

【A1/A2】6. 护士锐器伤的发生率高，而由锐器伤职业暴露感染中经血液传播的疾病比例高，其中最高的是

- A. 肝炎和艾滋病
- B. 梅毒

- C. 弓形虫病
- D. 疟疾
- E. 伤害

【A1/A2】7. 锐器盒应放多少就不可再用

- A. 1/2
- B. 1/3
- C. 1/4
- D. 3/4
- E. 2/3

【A1/A2】8. 防止化学烧伤主要是防止易烧伤人体的化学药品与人体接触，下列措施可能会造成烧伤危险的是

- A. 在搬取化学药品和进行操作时，一定要注意防止滑倒
- B. 按规定穿好劳动保护用品
- C. 废弃的化学药品可以扔进垃圾桶处理
- D. 化学药品不乱放，用完放到原来的位置
- E. 规范操作，养成良好的操作习惯

【A1/A2】9. 属于半污染区的是

- A. 值班室
- B. 医护办公室
- C. 配膳室
- D. 患者浴室
- E. 病房

【A1/A2】10. 在隔离病区工作护士的下列行为中正确的是

- A. 掀页撕取避污纸
- B. 把口罩挂在胸前
- C. 身着隔离衣进入治疗室
- D. 为患者翻身后用手整理口罩
- E. 护理结核患者后立即更换口罩

【A1/A2】11. 关于医疗垃圾的放置，以下正确的是

- A. 棉签丢在黑色垃圾桶里
- B. 注射器丢在黑色垃圾桶里
- C. 换下的辅料丢在黑色垃圾桶里
- D. 安瓿瓶丢在锐器盒里
- E. 空盒丢在黄色垃圾桶里

【A1/A2】12. 某三级甲等医院 ICU 共有 10 张床位。按照国家卫生行政管理部门对 ICU 护士

与床位比的要求，该科室配备的护士人数应不少于

- A. 10 名
- B. 15 名
- C. 20 名
- D. 25 名
- E. 30 名

【A1/A2】13. 某护士用下排气式蒸汽灭菌锅进行灭菌。8:35am 锅内压力达到所需数值，其后一直维持在 103~137kPa 之间，结束灭菌的正确时间是

- A. 8:45am
- B. 8:50am
- C. 9:05am
- D. 9:35am
- E. 10:00am

【A1/A2】14. 长 18cm 的无菌镊，浸泡于无菌罐中时，适宜的消毒液深度至少为

- A. 6cm
- B. 7cm
- C. 8cm
- D. 9cm
- E. 10cm

【A1/A2】15. 不符合特级护理内容的是

- A. 24 小时专人护理
- B. 严密观察病情及生命体征变化
- C. 做好基础护理，严防并发症
- D. 给予卫生保健指导
- E. 填写危重患者护理记录单

【A1/A2】16. 无菌包被无菌溶液浸湿，正确处理应是

- A. 立即使用完
- B. 4 小时内用完
- C. 24 小时内用完
- D. 烘干后使用
- E. 重新灭菌

【A1/A2】17. 取无菌溶液 300ml，操作正确的是

- A. 拿无菌溶液瓶标签朝下
- B. 用无菌纱布包裹瓶口倾倒溶液
- C. 拿无菌纱布填塞瓶口
- D. 用过的无菌溶液不用标注开瓶日期和时间

E. 倾倒前要用少量无菌溶液清洗瓶口

【A1/A2】18. 下列无菌操作原则不正确的是

- A. 无菌物品与非无菌物品分别放置
- B. 取无菌物品必须用无菌持物钳
- C. 无菌包外标明物品名称、灭菌日期
- D. 怀疑被污染则不可使用
- E. 一套无菌物品未用完，可以给其他患者使用

【A1/A2】19. 特殊口腔护理的适应证不包括

- A. 禁食
- B. 高热
- C. 鼻饲
- D. 昏迷
- E. 腹泻

【A1/A2】20. 发生压疮的原因不包括

- A. 局部组织长期受压
- B. 使用石膏绷带衬垫不当
- C. 全身营养缺乏
- D. 局部皮肤经常受排泄物刺激
- E. 肌肉软弱萎缩

【A1/A2】21. 某传染病病室，长 5m、宽 4m、高 3m，用食醋进行室内消毒，食醋的用量是

- A. 300~600ml
- B. 600~800ml
- C. 800~1050ml
- D. 1000~1200ml
- E. 1300~1400ml

【A1/A2】22. 直肠肛管疾病检查时取膝胸卧位，病变部位为 11 点，若患者改为截石位时，其病变部位是

- A. 5 点
- B. 11 点
- C. 9 点
- D. 7 点
- E. 3 点

【A1/A2】23. 患者男，65 岁。纵隔肿瘤术后，两护士为其翻身，正确的方法是

- A. 一人托住患者颈肩部和腰部，另一人托住患者臀部和腘窝处
- B. 一人托住患者颈肩部和臀部，另一人托住患者腰部和腘窝处

- C. 直接将患者翻向对侧
- D. 直接将患者翻向近侧
- E. 将患者两手置于身侧，两腿屈曲

【A1/A2】24. 患者女，62岁。下肢瘫痪，长期卧床并用盖被保暖。为保护双足功能，可选用的保护具是

- A. 床档
- B. 宽绷带
- C. 肩部约束带
- D. 支被架
- E. 膝部约束带

【A1/A2】25. 患者男，49岁。在腹腔镜下行胆囊切除术，对其使用过的腹腔镜进行浸泡消毒，可采用的消毒液为

- A. 1%戊二醛溶液
- B. 0.05%苯扎溴铵
- C. 0.05%~0.1%氯己定水溶液
- D. 0.2%过氧乙酸溶液浸泡手
- E. 2%戊二醛溶液

【A1/A2】26. 患者女，37岁。阑尾炎术后，须戴上无菌手套对其伤口更换敷料，错误的方法是

- A. 未戴手套的手可触及手套外面
- B. 已戴手套的手不可触及手套内面
- C. 已戴手套的手不可触及未戴手套的手
- D. 脱手套时不可用力强拉手套边缘或手指部分
- E. 发现手套破裂应立即更换

【A1/A2】27. 患者男，32岁。因肺结核住在传染科病房并隔离。可解除隔离时患者需满足的条件是

- A. 痰培养结果为阴性
- B. 已度过隔离期
- C. 咳嗽症状消除
- D. 患者请求回家
- E. 三次痰培养结果为阴性

【A1/A2】28. 患者男，39岁。左下肢发生气性坏疽，其换下的敷料应进行

- A. 紫外线消毒
- B. 高压蒸汽灭菌
- C. 过氧乙酸浸泡
- D. 焚烧

E. 甲醛熏蒸

【A1/A2】29. 患者男，23岁。因化疗后白细胞  $0.8 \times 10^9/L$ ，对该患者应进行

- A. 严格隔离
- B. 接触隔离
- C. 消化道隔离
- D. 呼吸道隔离
- E. 保护性隔离

【A1/A2】30. 患者男，36岁。急性甲型肝炎，对其护理时错误的是

- A. 应与痢疾患者分开在不同病室
- B. 接触患者或为患者做好治疗后，应及时洗手
- C. 保证病房内无蝇、无蟑螂
- D. 室内无法消毒的物品，应直接装入有标记的污物袋送出销毁或消毒处理
- E. 对于患者的呕吐物可先放垃圾袋，与其他生活垃圾一并处理

【A1/A2】31. 测量血压的方法，错误的是

- A. 测量前安静休息 20~30 分钟
- B. 测量时将动脉、心脏处于同一水平
- C. 袖带松紧以能塞进一指为宜
- D. 打气至 240mmHg
- E. 放气速度以 4mmHg/s 为宜

【A1/A2】32. 忌测口温应除外哪种患者

- A. 甲状腺功能亢进症术后患者
- B. 昏迷患者
- C. 腹泻患者
- D. 新生儿
- E. 精神障碍患者

【A1/A2】33. 潮气量为 500ml，呼吸频率为 14 次/min，无效腔气量为 150ml，则肺泡通气量为

- A. 2.1L/min
- B. 3.5L/min
- C. 4.9L/min
- D. 6L/min
- E. 7L/min

【A1/A2】34. 正常人体温在 24 小时内呈周期性波动，体温最高出现在

- A. 上午 9~11 点
- B. 中午 12 点左右

- C. 清晨 2~6 点
- D. 上午 7~8 点
- E. 午后 13~18 点

【A1/A2】35. 对于出入液量，以下记录方法不正确的是

- A. 晨 7 时至晚 7 时前，用蓝笔记录于出入液量记录单
- B. 12 小时小结，需用红笔记录于出入液量记录单
- C. 晚 7 时至次晨 7 时前，用红笔记录于出入液量记录单
- D. 记录要及时、准确、具体、字迹清晰
- E. 24 小时总结需用红笔记录于体温单

【A1/A2】36. 对于要素饮食的护理，处理不当的是

- A. 要素饮食保存的温度 4℃
- B. 要素饮食经造瘘口注入的温度为 41~42℃
- C. 要素饮食低温保存时间 24 小时
- D. 每小时注入量不得超过 150ml
- E. 注入速度为 60~80 滴/min

【A1/A2】37. 关于胃管，说法错误的是

- A. 耳垂至剑突的长度为插管长度
- B. 抽出胃液即能证实胃管在胃内
- C. 注入胃管空气，能听到气过水声，即证实胃管在胃内
- D. 从发际到剑突的距离为插管长度
- E. 将胃管末端置于水中，无气体逸出，即证实胃管在胃内

【A1/A2】38. 禁用冷疗的患者是

- A. 烫伤
- B. 牙痛
- C. 慢性炎症
- D. 鼻出血
- E. 中暑

【A1/A2】39. 行冰帽或冰槽降温时，患者肛温应控制在

- A. 24~27℃
- B. 27~30℃
- C. 30~33℃
- D. 34~35℃
- E. 35~37℃

【A1/A2】40. 为高热患者乙醇拭浴不正确的做法是

- A. 乙醇温度为 30℃



- B. 禁擦前胸、腹部
- C. 擦浴时间不超过 20 分钟
- D. 擦浴后 30 分钟测体温
- E. 体温低于 37℃ 取下头部冰袋

【A1/A2】41. 我国的《护士条例》中规定了护士的权利和义务。在以下的护士享有的权利的诉讼中，不正确的是

- A. 按照国家有关规定获取工资报酬、享受福利待遇的权利
- B. 获得与其所从事的护理工作相适应的卫生防护、医疗保健服务的权利
- C. 按照国家有关规定获得与本人业务能力和学术水平相应的专业技术职称的权利
- D. 参加专业培训，从事学术研究和交流，参加行业协会和专业学术团体的权利
- E. 获得接触有毒有害物质津贴的权利

【A1/A2】42. 护士处理医嘱时，应首先执行的医嘱是

- A. 长期医嘱
- B. 临时医嘱
- C. 临时备用医嘱
- D. 长期备用医嘱
- E. 停止医嘱

【A1/A2】43. 医生为某患者开具青霉素肌内注射。护士在核对医嘱时，注意到该患者无青霉素用药史记录，医生也未开青霉素皮试医嘱。此时，护士应首先采取的措施是

- A. 拒绝转抄医嘱
- B. 向护士长报告
- C. 执行医嘱
- D. 为患者行青霉素皮试
- E. 向医师提出加开皮试医嘱

【A1/A2】44. 对护士素质的叙述，不正确的是

- A. 护士素质是护理工作所需要具备的身心要素
- B. 评判性思维是护士应具备的专业素质
- C. 护士素质的提高是终身学习的过程
- D. 护士素质具有可塑性和不稳定性
- E. 自控力、忍耐力属于护士的心理素质

【A1/A2】45. 每 100ml 尿蛋白定量标本瓶中的防腐剂是

- A. 碳酸 0.5ml
- B. 稀盐酸 0.5ml
- C. 甲醛 0.5ml
- D. 甲苯 0.5ml
- E. 浓盐酸 0.5ml



【A1/A2】46. 下面采集粪便标本时要备透明胶带和载玻片的是

- A. 粪便常规标本
- B. 粪便隐血标本
- C. 粪便培养标本
- D. 检查蛲虫
- E. 检查阿米巴原虫

【A1/A2】47. 痰培养取标本前，护士指导患者漱口，方法正确的是

- A. 先用 0.2% 氯己定溶液漱口，再用清水漱口
- B. 先用 0.1% 苯扎溴铵溶液漱口，再用生理盐水漱口
- C. 先用 0.08% 甲硝唑溶液漱口，再用清水漱口
- D. 先用复方硼砂溶液漱口，再用清水漱口
- E. 先用 0.02% 呋喃西林溶液漱口，再用生理盐水漱口

【A1/A2】48. 采集血气分析标本时，错误的操作是

- A. 使用 2ml 无菌干燥注射器
- B. 抽取经过稀释的肝素溶液，充盈注射器后弃去
- C. 无菌操作下抽取动脉血 1ml
- D. 将血迅速注入无菌试管内并用软木塞塞住
- E. 立即送检

【A1/A2】49. 重症病房护士轮值夜班，凌晨 2 点时应为某患者翻身。护士觉得很闲乏。认为反正护士长也没在，别人也没有看到，少翻一次身不会这么巧就出现压疮。这种做法违反了

- A. 自强精神
- B. 慎独精神
- C. 奉献精神
- D. 舒适感
- E. 安全感

【A1/A2】50. 临终患者最后丧失的感觉是

- A. 视觉
- B. 嗅觉
- C. 味觉
- D. 听觉
- E. 触觉

【A1/A2】51. 为死亡患者护理，以下选项错误的是

- A. 清洁全身，为其穿衣
- B. 把枕头取出，头部放平
- C. 清洁面部，必要时堵塞孔道

- D. 为其带上白齿
- E. 将尸体卡系在腕部

【A1/A2】52. 急诊护士在抢救过程中，正确的是

- A. 口头医嘱向医生复述一遍，经双方确认无误后方可执行
- B. 抢救完毕，请医生第2天补写医嘱与处方
- C. 输液瓶、输血袋用后及时按医用垃圾处理
- D. 急救药品的空安瓿经患者检查后方可丢弃
- E. 任何情况下，护士不执行口头医嘱

【A1/A2】53. 护士在体温单上绘制肛温的符号为

- A. ⊙（蓝色）
- B. ○（蓝色）
- C. ●（红色）
- D. ×（蓝色）
- E. ●（蓝色）

【A1/A2】54. 下面需要避光的药物是

- A. 两性霉素
- B. 氟康唑
- C. 氨茶碱
- D. 吗丁啉
- E. 疫苗

【A1/A2】55. 护士执业过程中要求定期进行健康体检，目的是享有

- A. 人身安全不受侵犯的权利
- B. 履行职责相关的权利
- C. 安全执业的权利
- D. 获得报酬的权利
- E. 培训的权利

【A1/A2】56. 接种卡介苗时，护士常选用的注射部位是

- A. 三角肌下缘
- B. 大腿外侧
- C. 大腿前侧
- D. 腹部
- E. 背部

【A1/A2】57. 下列药物过敏试验的皮试液浓度，正确的是

- A. 青霉素 500U/0.1ml
- B. 链霉素 2500U/0.1ml

- C. 普鲁卡因 0.25mg/0.1ml
- D. 细胞色素 C 0.75mg/0.1ml
- E. 破伤风抗毒素 150IU/0.1ml

【A1/A2】58. 抢救时间的记录内容不包括

- A. 患者到达的时间
- B. 医生到达的时间
- C. 抢救措施落实的时间
- D. 病情变化的时间
- E. 家属到达的时间

【A1/A2】59. 使用气囊导尿管行留置导尿时，插管长度应为见尿后再插入

- A. 1~2cm
- B. 2~3cm
- C. 3~5cm
- D. 4~6cm
- E. 7~10cm

【A1/A2】60. 服用磺胺类药物时多饮水的主要目的是

- A. 降低药物毒性
- B. 减少对胃的刺激
- C. 减少对肾脏损害
- D. 提高疗效
- E. 减少对肝脏损害

【A1/A2】61. 患者男，72岁，来自偏远山区。因次日要行胃部切除术，护士告诉患者：“您明天要手术，从现在开始，不要喝水，不要吃饭。”患者答应，第2天术前护士询问患者时，患者回答说：“我按你说的没有喝水，也没吃饭，就喝了两袋牛奶。”影响护患沟通的因素为

- A. 经济收入
- B. 疾病程度
- C. 个人经历
- D. 理解差异
- E. 情绪状态

【A1/A2】62. 患儿，女，2个月。因肺炎、高烧急诊入院，护士在为其进行静脉输液时，2次穿刺失败，患儿父亲非常气愤，甚至谩骂护士，导致此事件发生的主要因素是

- A. 角色责任模糊
- B. 角色期望冲突
- C. 角色心理差位
- D. 角色权力争议
- E. 经济压力过重

【A1/A2】63. 对于出入液量的记录内容，下列选项正确的是

- A. 每日摄入量主要记录饮水量
- B. 固体食物只记单位个数
- C. 患者饮水容器应固定，并测定容量
- D. 每日排出量主要记录粪便量、尿量
- E. 伤口渗出液需观察不记录

【A1/A2】64. 护士从患者的角度，通过倾听和提问，与患者交流，理解患者的感受。护士采取的交谈策略是

- A. 沉默
- B. 核对
- C. 阐述
- D. 移情
- E. 反应

【A1/A2】65. 护士与哭泣的患者交流时，方法不正确的是

- A. 安慰并阻止患者哭泣
- B. 待患者平静下来可主动聆听
- C. 鼓励其将哭泣的原因说出来
- D. 不能训斥、评论患者
- E. 陪伴患者

【A1/A2】66. 护患沟通提问过程中，如果护士采用的是封闭式提问，其主要的优点是

- A. 患者可以更好地阐述自己的观点
- B. 护士可以在短时间内获取需要的信息
- C. 护士可以获得更多资料
- D. 护士可以获得更加真实全面的资料
- E. 患者可以更加全面地介绍自己的情况

【A1/A2】67. 建立起良好的医护关系的原则是双方应该相互

- A. 依存
- B. 独立
- C. 监督
- D. 尊重
- E. 补充

【A1/A2】68. 值班护士在听到呼叫器传来呼救：“XX 床的患者突然昏迷了。”此时护士去病室的行姿应为

- A. 慢步走
- B. 快步走

- C. 跑步
- D. 小跑步
- E. 快速跑步

【A1/A2】69. 患者男，68岁。摔倒，左侧肢体远端桡骨骨折、胫骨骨折，右侧第5指骨骨折，该患者血压测量部位是

- A. 左侧桡动脉
- B. 左侧肱动脉
- C. 右侧股动脉
- D. 右侧肱动脉
- E. 左侧股动脉

【A1/A2】70. 患者男，57岁。因严重肝病导致昏迷，呼吸微弱，浅而慢。护士为其测量呼吸的正确方法是

- A. 以1/4脉率计算
- B. 测脉率后观察胸腹起伏次数
- C. 计算所听到的呼吸音的次数
- D. 用手感觉呼吸气流通过的次数
- E. 用少许棉花置患者鼻孔前观察棉花飘动次数

【A1/A2】71. 患者女，59岁。需做大便潜血试验，护士指导其在标本采集前3天内，可食用的食物为

- A. 肉类
- B. 动物肝
- C. 绿叶蔬菜
- D. 豆制品
- E. 动物血

【A1/A2】72. 患者女，32岁。医嘱行<sup>131</sup>I甲状腺功能测定，护士指导患者在试验期间应忌食的食物是

- A. 芹菜
- B. 紫菜
- C. 花菜
- D. 黄瓜
- E. 西红柿

【A1/A2】73. 患者：“我每天都要喝一点酒。”护士：“请问您每天具体喝多少？”护士使用的沟通技巧是

- A. 叙述
- B. 重复
- C. 澄清

- D. 反映
- E. 反馈

【A1/A2】74. 患者男，75岁。患慢性阻塞性肺疾病30余年，现处于疾病稳定期。在为其制订肺功能康复计划时，应是

- A. 护士单独制订，强制患者执行
- B. 护士单独制订，指导患者执行
- C. 患者自行制订并执行
- D. 患者自行制订，由护士指导执行
- E. 护士与患者共同制订，护士指导患者执行

【A1/A2】75. 患者男，尿路损伤后出现排尿困难，护士遵医嘱为其留置导尿，患者表情紧张，问：“会不会很疼呀？”下列回答较妥当的是

- A. 放心一点也不疼
- B. 当然会疼，谁让你受伤了呢
- C. 我也不太清楚
- D. 为了治病，疼也得忍着
- E. 会有一些疼痛，我会尽量帮你减轻痛苦

【A1/A2】76. 患者男，68岁。因脑出血昏迷住院，现需要鼻饲饮食，在插管时，患者出现呛咳、呼吸困难、发绀等情况。此时患者最可能出现了

- A. 胃管盘在口腔
- B. 肺部发生感染
- C. 胃管误入气道
- D. 食管黏膜被损伤
- E. 患者病情恶化

【A1/A2】77. 患者女，55岁。因关节疼痛需每日红外线照射一次，在照射过程中观察皮肤出现紫红色，此时护士应该

- A. 停止照射，改用热敷
- B. 立即停止照射，涂抹凡士林保护皮肤
- C. 适当降低温度，继续照射
- D. 改用小功率灯，继续照射
- E. 改用大功率灯，继续照射

【A1/A2】78. 患者男，60岁。因高热急诊入院，体温39.9℃。正确的物理降温措施是

- A. 嘱患者多饮冰水
- B. 前额、头顶部置冰袋
- C. 全身温水擦浴
- D. 心前区乙醇擦浴
- E. 冰敷60分钟后测体温

【A1/A2】79. 患者男，22 岁。手术后麻醉尚未清醒，手足厥冷，全身发抖，欲用热水袋热敷。下列操作方法不恰当的是

- A. 热水袋水温应控制在 60℃ 以内
- B. 热水袋套外再包裹大毛巾
- C. 密切观察局部皮肤颜色
- D. 及时更换热水
- E. 交接班时应着重交代

【A1/A2】80. 患者男，27 岁。体检中发现感染艾滋病病毒，患者有责任将感染的事实及时告知的人员为

- A. 与其共同学习者
- B. 与其有性关系者
- C. 与其共同居住者
- D. 与其有合作关系者
- E. 与其共同工作者

【A1/A2】81. 患者男，68 岁，直肠癌。护士观察患者粪便时可见

- A. 带状便
- B. 果酱样便
- C. 栗子样便
- D. 陶土色便
- E. 水样便

【A1/A2】82. 患者女，38 岁。因腹痛、腹泻、果酱样便入院就诊。经检查确诊为阿米巴痢疾，遵医嘱行保留灌肠，采取右侧卧位的目的为

- A. 利于药物达到治疗部位
- B. 减少对患者的腹部刺激
- C. 防止药液溢出
- D. 使患者舒适安全
- E. 使患者易于忍受

【A1/A2】83. 患者女，24 岁，因先兆流产卧床保胎。患者主诉腹胀，大便不能排出，医嘱小量不保留灌肠。以下做法正确的是

- A. 灌肠液可用 50% 硫酸镁 90ml、甘油 60ml、温开水 30ml
- B. 插入肛管的深度是 10~15cm
- C. 抽吸灌肠液时，注意反折肛管
- D. 灌肠液保留 30 分钟以上
- E. 灌肠筒液面距床面 60cm

【A1/A2】84. 患者女，28 岁。患咽炎，医嘱：复方磺胺甲硝唑 1.0g，p. o. B. i. D. 。护士指



导患者服药时间，正确的是

- A. 8am
- B. 8pm
- C. 8am-4pm
- D. 8am-12n-4pm
- E. 8am-12n-4pm-8pm

【A1/A2】85. 患者女，68岁。患者有多种疾病，同时服用下列几种药物，宜饭前服用的药物是

- A. 伊曲康唑
- B. 维生素C
- C. 枸橼酸铋钾
- D. 青霉素
- E. 甲硝唑

【A1/A2】86. 患者女，45岁。上午10点行磁共振检查，护士分发口服药时患者未回，此时正确的处理是

- A. 交给病友
- B. 暂缓发药
- C. 置于床头柜
- D. 交给患者家属
- E. 将药品退回药房

【A1/A2】87. 患者男，37岁。车祸后并发血气胸，进行手术治疗后医嘱常规行沐舒坦（盐酸氨溴索）雾化吸入。用该药物的目的是

- A. 解痉
- B. 平喘
- C. 镇痛
- D. 抑制腺体分泌
- E. 稀释痰液，促进排出

【A1/A2】88. 患者女，26岁，有习惯性流产史。现妊娠8周，遵医嘱给予黄体酮肌内注射。正确的操作是

- A. 乙醇消毒皮肤
- B. 消毒范围3cm
- C. 选择粗长针头注射
- D. 进针角度为45°
- E. 见回血后方可推药

【A1/A2】89. 患者女，36岁。患急性支气管炎，医嘱给予口服止咳糖浆每次30ml，每日3次治疗。护士指导患者服止咳糖浆的正确方法是

- A. 在其他药后服，服后不饮水
- B. 咳嗽即服，服后多饮水
- C. 饭前服，服后少饮水
- D. 饭后服，服后多饮水
- E. 睡前服，服后少饮水

【A1/A2】90. 患者女，48岁，患有肥厚型心肌病5年。近1个月来常有心绞痛发作及一过性晕厥，患者因此非常紧张，整日卧床，不敢活动。该患者出现的角色行为改变属于

- A. 角色行为强化
- B. 角色行为缺如
- C. 角色行为冲突
- D. 角色行为差异
- E. 角色行为消退

【A1/A2】91. 绌脉正确的记录方式及记录时间是

- A. 心率 / 脉率 / min
- B. 脉率 / 心率 / min
- C. 心率 / 脉率 / 30s
- D. 脉率 / 心率 / s
- E. 心率 / 脉率 / s

【A1/A2】92. 临床护理质量标准中规定：无菌物品的合格率应为

- A. 100%
- B. 99%
- C. 98%
- D. 95%
- E. 90%

【A1/A2】93. 在乙类传染病中，需要按甲类传染病管理的是

- A. 新型冠状病毒肺炎
- B. 艾滋病
- C. 登革热
- D. 布鲁斯菌病
- E. 流行性出血热

【A1/A2】94. 脑死亡的诊断标准不包括

- A. 瞳孔散大
- B. 不可逆的深度昏迷
- C. 自发呼吸停止
- D. 脑干反射消失
- E. 脑电波平直

【A1/A2】95. 患儿，男，6岁。急性胃肠炎，轻度脱水。输液治疗中患儿出现寒战、高热、头痛、恶心，考虑可能为

- A. 发热反应
- B. 微粒栓塞
- C. 空气栓塞
- D. 循环负荷过重
- E. 过敏反应

【A1/A2】96. 干燥法存放无菌持物钳的有效期一般为

- A. 4小时
- B. 6小时
- C. 1天
- D. 3天
- E. 7天

【A1/A2】97. 用氧安全的重点是做好“四防”，其内容不包括

- A. 防震
- B. 防火
- C. 防热
- D. 防油
- E. 防移动

【A1/A2】98. 小儿误食老鼠药磷化锌中毒后洗胃用

- A. 1:2000高锰酸钾
- B. 0.5%硫酸铜
- C. 盐水
- D. 醋酸
- E. 过氧化氢

【A1/A2】99. 血压测量的“四定”指的是

- A. 定时间、定部位、定体位、定血压计
- B. 定时间、定部位、定血压计、定人员
- C. 定时间、定部位、定体位、定计量单位
- D. 定时间、定体位、定部位、定听诊器
- E. 定时间、定体位、定部位、定病室

【A1/A2】100. 体温 $39.0\sim 40.4^{\circ}\text{C}$ ，24小时波动不超过 $1^{\circ}\text{C}$ ，这种热型称为

- A. 稽留热
- B. 弛张热
- C. 间歇热

- D. 不规则热
- E. 波浪热

