

护资-模考3

【A1/A2】1. 患者在查体中发现血清抗-HIV 阳性，护士在对其进行健康教育指导时，不正确的是

- A. 排泄物用漂白粉消毒
- B. 严禁献血
- C. 性生活应使用避孕套
- D. 不能和他人共用牙刷
- E. 外出时应戴口罩

【A1/A2】2. 属于传染病预防措施的是

- A. 计划免疫
- B. 封锁疫区
- C. 环境消毒
- D. 限制集会
- E. 停工停课

【A1/A2】3. 引起直肠肛管周围脓肿发病的病原微生物是

- A. 真菌
- B. 衣原体
- C. 寄生虫
- D. 细菌
- E. 支原体

【A1/A2】4. 流行性乙型脑炎的传播途径是

- A. 母婴传播
- B. 空气传播
- C. 虫媒传播
- D. 血液传播
- E. 粪-口传播

【A1/A2】5. 肝硬化患者手术前，最需要补充的维生素是

- A. 维生素 A
- B. 维生素 B
- C. 维生素 C
- D. 维生素 K
- E. 维生素 E

【A1/A2】6. 患者女，20 岁。寒战，发热，右小腿内侧皮肤出现鲜红色片状疹，烧灼感疼痛，附近淋巴结肿大疼痛。错误的护理措施是

- A. 遵医嘱使用抗生素
- B. 嘱患者勿抬高患肢
- C. 局部湿热敷



- D. 给予物理降温
- E. 嘱患者卧床休息

【A1/A2】7. 皮肤多个相邻毛囊和皮脂腺的急性化脓性炎症是

- A. 疖
- B. 痈
- C. 网状淋巴管炎
- D. 急性淋巴结炎
- E. 急性淋巴管炎

【A1/A2】8. 挤压面部“危险三角区”未成熟的疖，最严重的后果是

- A. 鼻部感染
- B. 化脓性海绵状静脉窦炎
- C. 面部肿胀
- D. 形成痈
- E. 留瘢痕

【A1/A2】9. 急性淋巴管炎患者首选的抗生素是

- A. 庆大霉素
- B. 青霉素
- C. 头孢菌素
- D. 卡那霉素
- E. 氨苄西林

【A1/A2】10. 由厌氧菌所致蜂窝织炎做创面清洁时，最常用的清洁液是

- A. 0.1%碘附
- B. 0.2%过氧乙酸
- C. 外用生理盐水
- D. 3%过氧化氢
- E. 75%乙醇

【A1/A2】11. 局部按压有捻发音的软组织感染是

- A. 痈
- B. 急性蜂窝织炎
- C. 丹毒
- D. 疖
- E. 急性淋巴炎

【A1/A2】12. 执行床边隔离的软组织化脓性感染是

- A. 疖
- B. 痈
- C. 丹毒
- D. 急性淋巴管炎
- E. 急性蜂窝织炎

【A1/A2】13. 患者诊断为痈时，最可能出现的血常规检查结果是

- A. 嗜酸性粒细胞增加
- B. 淋巴细胞计数增加
- C. 网织红细胞计数增加
- D. 中幼粒细胞计数增加
- E. 中性粒细胞比例增加

【A1/A2】14. 患者女，26岁。因颈部蜂窝织炎入院，医嘱予气管切开。操作前，护士向其解释该措施的目的是预防

- A. 窒息
- B. 肺不张
- C. 全身感染
- D. 吞咽困难
- E. 化脓性海绵状静脉窦炎

【A1/A2】15. 患者男，27岁。5天前上嘴唇出现肿胀，局部出现多个脓头，诊断为唇痈。不应该实施的治疗是

- A. 早期切开减压
- B. 全身使用抗生素
- C. 局部药物外敷
- D. 饮食以流质为主
- E. 让患者充分休息

【A1/A2】16. 患者女，26岁，下肢急性淋巴管炎。查体见肢体肿胀明显，局部应擦拭的药剂是

- A. 0.1%碘附
- B. 50%硫酸镁
- C. 外用生理盐水
- D. 3%过氧化氢
- E. 75%乙醇

【A1/A2】17. 患者男，27岁。右小腿玻璃割伤，于社区诊所诊治。2天后伤口或病灶近心侧皮肤出现“红线”并有压痛。该患者可能发生了以下何种感染

- A. 急性蜂窝织炎
- B. 丹毒
- C. 淋巴结炎
- D. 甲沟炎
- E. 管状淋巴管炎

【A1/A2】18. 患儿，男，11个月。2015年10月因发热、呕吐、腹泻入院。大便为黄色蛋花汤样，每日十余次，量多，无腥臭味。前囟、眼窝稍凹陷，尿量减少，大便镜检(-)。对该患儿的治疗不恰当的是

- A. 及时足量使用广谱抗生素
- B. 补液
- C. 补钾
- D. 应用双歧杆菌
- E. 使用蒙脱石散

【A1/A2】19. 小儿感染性腹泻最常见的病原体是

- A. 人类轮状病毒和致病性大肠埃希菌
- B. 柯萨奇病毒
- C. 真菌
- D. 寄生虫
- E. 埃可病毒

【A1/A2】20. 某9个月男婴，腹泻2天，大便每日15~16次，蛋花汤样。判断患儿脱水程度的评估指标不包括

- A. 精神状态
- B. 尿量
- C. 肠鸣音
- D. 皮肤弹性
- E. 前囟

【A1/A2】21. 患儿，女，3个月。轻型腹泻，家长主诉给患儿清洁臀部时哭闹明显。护士进行健康教育评估时要特别注意患儿的

- A. 体温
- B. 呼吸
- C. 尿量
- D. 肛周皮肤
- E. 每日大便次数

【A1/A2】22. 患儿，女，11个月。腹泻3天，大便为蛋花汤样带黏液，无腥臭味，无尿8小时。眼窝凹陷极明显。血钠125mmol/L。诊断为小儿秋季腹泻。该患儿脱水的程度和性质是

- A. 中度低渗性脱水
- B. 中度等渗性脱水
- C. 重度等渗性脱水
- D. 重度低渗性脱水
- E. 重度高渗性脱水

【A1/A2】23. 患儿，10个月。因病毒性肠炎入院，不宜进食的食物有

- A. 母乳
- B. 纯牛乳
- C. 发酵乳
- D. 去乳糖配方乳

E. 豆制代乳品

【A1/A2】24. 小儿腹泻、发热、呕吐 3 天住院，现遵医嘱禁食。请问该患儿目前应禁食几小时

- A. 4~6
- B. 6~8
- C. 8~10
- D. 10~12
- E. >12

【A1/A2】25. 患儿，男，3 个月。因腹泻入院，脱水纠正后，患儿突然发生惊厥，考虑患儿发生惊厥的原因是

- A. 补液过多
- B. 低血钾
- C. 低血钙
- D. 高血钾
- E. 低血镁

【A1/A2】26. 患儿，1 岁。腹泻近 1 个月，诊断为腹泻伴脱水，给予补液。治疗后患儿尿量增加，皮肤弹性恢复正常，但腱反射减弱，腹胀明显，肠鸣音减弱，心音低钝，护士判断该患儿可能发生的情况是

- A. 酸中毒
- B. 低钙血症
- C. 低钾血症
- D. 低镁血症
- E. 脱水纠正

【A1/A2】27. 患儿，10 个月。呕吐、腹泻 3 天，经补液治疗后出现低血钾症状，护士遵医嘱为患儿补钾，下列处理措施不正确的是

- A. 静脉滴注溶液中钾浓度不超过 0.3%
- B. 含钾溶液可静脉推注，但速度应慢
- C. 静脉滴注时间不应短于 6~8 小时
- D. 有尿后补钾
- E. 最好用输液泵控制速度

【A1/A2】28. 患者女，68 岁。患者有多种疾病，同时服用下列几种药物，宜饭前服用的药物是

- A. 伊曲康唑
- B. 维生素 C
- C. 枸橼酸铍钾
- D. 青霉素
- E. 甲硝唑



【A1/A2】29. 护士评估肝硬化患者的皮肤改变时可发现蜘蛛痣，蜘蛛痣一般不出现的部位是

- A. 腹部
- B. 胸部
- C. 面颈部
- D. 手臂
- E. 肩背部

【A1/A2】30. 与消化性溃疡发病相关的因素是

- A. 习惯性便秘
- B. 十二指肠肠壁薄弱
- C. 幽门螺杆菌感染
- D. 十二指肠萎缩
- E. 家族遗传

【A1/A2】31. 提示消化性溃疡有活动性的辅助检查是

- A. 纤维胃镜检查
- B. 胃黏膜活组织检查
- C. X线钡餐检查可见龛影
- D. 幽门螺杆菌阳性
- E. 粪便隐血试验阳性

【A1/A2】32. 有助于维护和修复小儿肠道黏膜屏障功能的药物是

- A. 青霉素
- B. 小檗碱
- C. 制霉菌素
- D. 蒙脱石散
- E. 双歧杆菌

【A1/A2】33. 引起腹外疝的两个主要原因是

- A. 妊娠和重体力劳动
- B. 腹水和便秘
- C. 腹壁强度低和腹内压高
- D. 外伤和感染造成的腹壁缺损
- E. 腹股沟管和股管宽大

【A1/A2】34. 与痔的形成关系不大的是

- A. 长期便秘
- B. 久站、久坐
- C. 腹内压增高
- D. 妊娠
- E. 剧烈运动

【A1/A2】35. 以假小叶形成为主要病理改变的疾病是



- A. 慢性肝淤血
- B. 弥漫型肝炎
- C. 急性重型肝炎
- D. 肝硬化
- E. 亚急性重型肝炎

【A1/A2】36. 氨中毒引起的肝性脑病的主要机制是

- A. 氨使蛋白质代谢障碍
- B. 氨干扰大脑的能量代谢
- C. 取代正常的神经递质
- D. 引起神经传导异常
- E. 促进氨基酸不平衡

【A1/A2】37. 阿托品用于治疗不完全性肠梗阻患者，其主要作用是

- A. 刺激迷走神经兴奋
- B. 解除平滑肌痉挛
- C. 抑制交感神经兴奋
- D. 抑制中枢神经系统
- E. 抑制腺体分泌

【A1/A2】38. 评估肝硬化患者有无腹水的最佳方法是

- A. 问诊
- B. 叩诊
- C. 听诊
- D. 触诊
- E. 视诊

【A1/A2】39. 胰腺炎患者禁用吗啡镇痛的原因是

- A. 吗啡可导致呼吸抑制
- B. 吗啡容易导致炎症扩散
- C. 吗啡可引起 Oddi 括约肌痉挛，加重疼痛
- D. 吗啡与其他治疗用药有配伍禁忌
- E. 使用吗啡容易成瘾

【A1/A2】40. 对于注射硬化剂治疗 I、II 度内痔的药理作用，错误的描述是

- A. 痔块萎缩
- B. 小血管闭塞
- C. 痔块硬化
- D. 蛋白凝固
- E. 组织纤维增生

【A1/A2】41. 给予某肝性脑病早期的患者口服乳果糖，其药理作用是

- A. 减少氨的形成和吸收

- B. 补充膳食纤维
- C. 作为肝性脑病治疗的主要能量来源
- D. 纠正氨基酸代谢比例失调
- E. 抑制肠道细菌生长

【A1/A2】42. 患者男，23岁。直肠肛管周围脓肿切开引流术后3天，在饮食指导中错误的是

- A. 多喝水
- B. 均衡饮食
- C. 少吃水果蔬菜
- D. 避免辛辣食物
- E. 避免油炸食物

【A1/A2】43. 患者女，45岁，肝炎后肝硬化5年。近1年来，出现消瘦、乏力，厌食，上腹饱胀不适，恶心呕吐，面色黧黑，腹壁脐周可见曲张的静脉。此时给患者做实验室检查，不可能出现的结果是

- A. 血清白球比例下降
- B. 血清胆红素增高
- C. 凝血酶原时间缩短
- D. 血清ALT增高
- E. 血清胆固醇酯降低

【A1/A2】44. 患者男，63岁。慢性胃炎，幽门螺杆菌(+)，需要采用抗菌药物治疗，其用药原则是

- A. 剂量宜大
- B. 宜静脉给药
- C. 联合用药
- D. 宜长期使用
- E. 药物种类不受限制

【A1/A2】45. 患儿男，11个月。2015年10月因发热、呕吐、腹泻入院。大便为黄色蛋花汤样，每日10余次，量多，无腥臭味。前囟、眼窝稍凹陷，尿量减少，大便镜检(-)。对该患儿的治疗不恰当的是

- A. 及时足量使用广谱抗生素
- B. 补液
- C. 补钾
- D. 应用双歧杆菌
- E. 使用蒙脱石散

【A1/A2】46. 患者男，65岁，发现右腹股沟内侧包块3年余。3天前腹股沟包块增大变硬，不能还纳，伴剧烈疼痛，8小时前疼痛有所缓解，但出现发热。患者最可能出现了

- A. 易复性疝
- B. 难复性疝



- C. 嵌顿性疝
- D. 绞窄性疝
- E. 急性阑尾炎

【A1/A2】47. 患者男，25岁。1周前肛门周围持续性跳痛，皮肤红肿，并有局部压痛及波动感，诊断为肛门周围脓肿。行手术治疗，并应用抗生素，选择抗生素的方法，正确的是

- A. 对革兰氏阳性菌有效的抗生素
- B. 对厌氧菌有效的抗生素
- C. 对金黄色葡萄球菌有效的抗生素
- D. 对革兰氏阴性杆菌和厌氧菌有效的抗生素，宜联合用药
- E. 对铜绿假单胞菌有效的抗生素

【A1/A2】48. 患者女，35岁，1天前进食油腻的食物后出现上腹剧烈疼痛。查体：Murphy征(+)。其压痛点位置是

- A. 膈下
- B. 右肋下
- C. 右下腹
- D. 左肋下
- E. 脐周

【A1/A2】49. 患者男，38岁。与朋友聚餐大量饮酒、吃肉后出现上腹持续性刀割样疼痛，阵发性加剧，伴恶心、呕吐、发热，体温38.5℃。急查血清淀粉酶超过正常值4倍，诊断为急性胰腺炎。急诊收入院后，护士收集的患者资料中与急性胰腺炎的发病有关的是

- A. 睡眠欠佳
- B. 有胆绞痛史
- C. 青霉素过敏史
- D. 20岁时曾患甲型肝炎
- E. 父母双方均有高血压病史

【A1/A2】50. 患儿，7岁。因阵发性剑突下钻顶样疼痛伴恶心、呕吐半天入院。查体：剑突下压痛，无腹肌紧张，急诊护士应首先考虑

- A. 肝内胆管结石
- B. 胆道蛔虫病
- C. 急性阑尾炎
- D. 急性胰腺炎
- E. 肝外胆管结石

【A1/A2】51. 患者男，45岁。肝硬化门静脉高压症伴上消化道大出血入院，给予三腔管压迫止血12小时后出血停止。患者主诉三腔管刺激不适，要求拔除，护士的做法错误的是

- A. 加强与患者沟通，安抚患者情绪
- B. 嘱其听音乐、看报纸等转移注意力
- C. 安慰鼓励患者，增强其带管的信心
- D. 耐心解释三腔管的必要性及拔管可能造成的危害

E. 安慰患者并满足患者要求，轻柔正确拔出三腔管

【A1/A2】52. 关于消化性溃疡患者用药的叙述，不正确的是

- A. 氢氧化铝凝胶应在餐后 1 小时服用
- B. 服用西咪替丁应注意观察有无头晕、皮疹
- C. 硫糖铝片应在餐前 1 小时服用
- D. 奥美拉唑可引起头晕，用药时不可开车
- E. 甲硝唑应在餐前半小时服用

【A1/A2】53. 消化道疾病手术后，提示患者肠蠕动恢复的有效指征是

- A. 肛门排气
- B. 腹胀减轻
- C. 患者有饥饿感
- D. 患者有便意
- E. 胃管的引流量较前减少

【A1/A2】54. 急性阑尾炎腹痛起始于脐周或上腹的机制是

- A. 胃肠功能紊乱
- B. 阑尾位置不固定
- C. 躯体神经反射
- D. 内脏神经反射
- E. 阑尾管壁痉挛

【A1/A2】55. 嵌顿性疝与绞窄性疝最主要的不同点是

- A. 有无腹痛
- B. 腹痛程度
- C. 疝块大小
- D. 疝内容物是否能回纳
- E. 有无疝内容物血运障碍

【A1/A2】56. 对腹外疝患者进行出院指导，正确的内容是

- A. 3 个月内避免重体力劳动
- B. 1 个月内避免重体力劳动
- C. 半年内避免重体力劳动
- D. 术后不会复发，可任意活动
- E. 少吃富含高维生素的食物

【A1/A2】57. 一般患者短时间直肠肛管检查最常用的体位是

- A. 左侧卧位
- B. 膝胸卧位
- C. 蹲位
- D. 截石位
- E. 俯卧位

【A1/A2】58. 肛瘘最常见的原发病是

- A. 痔疮
- B. 直肠息肉
- C. 肛裂
- D. 直肠肛管周围脓肿
- E. 直肠癌

【A1/A2】59. 高位肛瘘是指

- A. 瘘管位于肛门内括约肌以上者
- B. 瘘管位于肛门外括约肌以上者
- C. 瘘管位于齿状线以上者
- D. 瘘管位于肛管下 1/3 段者
- E. 瘘管位于肛管上 1/3 段者

【A1/A2】60. 治疗单纯高位肛瘘，能有效避免肛门失禁的方法是

- A. 1: 5000 高锰酸钾溶液坐浴
- B. 挂线疗法
- C. 局部换药治疗
- D. 瘘管搔刮
- E. 使用抗菌药物

【A1/A2】61. 以下微生物中，较少引起直肠肛管周围脓肿的是

- A. 大肠杆菌
- B. 类杆菌
- C. 结核杆菌
- D. 葡萄球菌
- E. 梭状芽孢杆菌

【A1/A2】62. 肝硬化失代偿期患者最常见的并发症是

- A. 电解质紊乱
- B. 肝性脑病
- C. 原发性肝癌
- D. 肝肾综合征
- E. 上消化道出血

【A1/A2】63. 关于肝硬化门脉高压患者的临床表现，错误的叙述是

- A. 早期可出现脾大，脾功能亢进
- B. 全身无出血倾向
- C. 可出现黄疸、蜘蛛痣、腹壁静脉曲张等
- D. 腹部膨隆，可叩出腹部移动性浊音
- E. 门静脉血液阻力增加，是门脉高压的始动因素



【A1/A2】64. 我国肝硬化的最主要病因是

- A. 病毒性肝炎
- B. 酒精中毒
- C. 胆汁淤积
- D. 日本血吸虫病
- E. 化学毒物或药物

【A1/A2】65. 肝性脑病的体征最具有特征性的是

- A. 腱反射亢进
- B. 肌张力增加
- C. 扑翼样震颤
- D. 踝阵挛
- E. 巴宾斯基征阳性

【A1/A2】66. Charcot 三联征是指

- A. 腹痛、恶心、高热
- B. 恶心、腹胀、寒战
- C. 腹痛、腹胀、寒战高热
- D. 腹痛、黄疸、恶心
- E. 腹痛、寒战高热、黄疸

【A1/A2】67. 急性胆囊炎患者的右肩背部疼痛属于

- A. 内脏性疼痛
- B. 躯体性疼痛
- C. 牵涉性疼痛
- D. 转移性疼痛
- E. 胆绞痛

【A1/A2】68. 胆总管结石以下列哪种类型多见

- A. 胆固醇结石
- B. 尿酸结石
- C. 草酸钙结石
- D. 胆色素结石
- E. 磷酸镁铵结石

【A1/A2】69. 以下不属于急性胆囊炎特征的是

- A. 右上腹痛
- B. 疼痛向右肩部放射
- C. 墨菲征阳性
- D. 可触及肿大胆囊
- E. 黄疸明显

【A1/A2】70. 胆道蛔虫病患者临床表现最重要的特点是

- A. 发作时伴恶心、呕吐

- B. 症状与体征不符
- C. 症状可自行缓解
- D. 多不伴黄疸
- E. 疼痛呈反复、间歇发作

【A1/A2】71. 急性胰腺炎患者表现为偶有阵发性的肌肉抽搐，最可能的原因是

- A. 低钙反应
- B. 疼痛反应
- C. 营养失调导致
- D. 精神高度紧张导致
- E. 使用哌替啶后的正常反应

【A1/A2】72. 导致我国胰腺炎发病的最常见原因是

- A. 酗酒
- B. 暴饮暴食
- C. 胆道疾病
- D. 应用糖皮质激素
- E. 胰管阻塞

【A1/A2】73. 患者男，56岁。肝硬化腹水，在放腹水的过程中突然出现昏迷，首先采取的措施是

- A. 吸氧
- B. 头部降温
- C. 停止放腹水
- D. 补充血容量
- E. 保持呼吸道通畅

【A1/A2】74. 患者女，39岁。行毕Ⅱ式胃大部切除术后第1天，护士查房时见胃管内吸出咖啡色胃液约260ml，正确的处理是

- A. 胃管内灌注冰盐水
- B. 加快输液速度
- C. 应用止血药
- D. 继续观察，不需特殊处理
- E. 马上做好手术止血的准备

【A1/A2】75. 患者男，54岁。3天来反复上腹痛，进餐后发作或加重，伴反酸暖气，咨询社区护士其应进行的检查，社区护士给出的建议正确的是

- A. 腹部平片
- B. B超
- C. CT
- D. 胃镜
- E. MRI

【A1/A2】76. 患者女，42岁。反复间歇性上腹痛2年。诊断为十二指肠球部溃疡，缓解腹痛的措施正确的是

- A. 睡前加餐
- B. 腹部热敷
- C. 取平卧体位
- D. 服用镇痛药物
- E. 尽早手术治疗

【A1/A2】77. 患者男，50岁，患有消化性溃疡10年。近来疼痛加重，原有疼痛节律消失，变为持续上腹痛，伴频繁呕吐，呕吐物含发酵性宿食，其最可能的并发症是

- A. 幽门梗阻
- B. 上消化道出血
- C. 胃癌
- D. 穿孔
- E. 急性胰腺炎

【A1/A2】78. 患者女，26岁。半年前开始出现反复发作的腹泻、腹痛、排黏液脓便，疑诊溃疡性结肠炎，拟行肠镜检查。门诊护士告知患者行肠镜检查前应注意的是

- A. 前4小时可进食
- B. 前1天晚餐后禁食
- C. 前2天停用铁剂
- D. 前2天清洁灌肠
- E. 前3天停用阿司匹林类药物

【A1/A2】79. 患者男，26岁。1天前右下腹有转移性腹痛，麦氏点有固定的压痛。诊断为阑尾炎，采取保守治疗。现腹痛缓解后突然加重，范围加大，考虑是阑尾穿孔，急性阑尾炎易发生坏死、穿孔的主要原因是

- A. 阑尾开口小
- B. 阑尾淋巴丰富
- C. 阑尾蠕动慢而弱
- D. 阑尾系膜短
- E. 阑尾动脉为终末动脉

【A1/A2】80. 患者女，28岁。阑尾穿孔合并腹膜炎手术后第7天，体温39℃，伤口无红肿，大便次数增多，混有黏液，伴里急后重。该患者可能并发了

- A. 肠炎
- B. 肠粘连
- C. 盆腔脓肿
- D. 膈下脓肿
- E. 细菌性痢疾

【A1/A2】81. 患者女，60岁。2天前因急性阑尾炎行阑尾切除术，现诉腹胀，未排气、排便。下列护理措施错误的是

- A. 评估患者腹胀情况
- B. 给予阿托品肌注
- C. 鼓励患者床上多翻身
- D. 必要时给予肛管排气
- E. 鼓励患者下地活动

【A1/A2】82. 患者男，35岁。因午餐后感脐周疼痛3小时，呈阵发性加重，腹胀伴恶心、呕吐，呕吐物为血性，发病后肛门无便。患者有阑尾炎手术史。护士对其进行评估时，评估内容不包括

- A. 腹痛、腹胀的特点
- B. 心理状态
- C. 呕吐量、颜色和性质
- D. 活动耐力
- E. 有无手术史

【A1/A2】83. 患者女，56岁。痔疮术后第3日，患者出现心慌、出冷汗、面色苍白并伴有肛门坠胀感，敷料渗血较多，考虑患者最可能出现了

- A. 创面出血
- B. 切口感染
- C. 尿潴留
- D. 便秘
- E. 肛门狭窄

【A1/A2】84. 患儿，男，因早产住院治疗。现患儿3个月，需接种卡介苗。正确的做法是

- A. 立即接种
- B. PPD 试验阴性再接种
- C. 4个月后再接种
- D. 与百白破疫苗同时接种
- E. PPD 试验阳性再接种

【A1/A2】85. 慢性乙型肝炎抗病毒治疗的首选药物是

- A. δ -干扰素和拉米夫定
- B. 拉米夫定和邻甲酸钠
- C. α -干扰素和拉米夫定
- D. γ -干扰素和拉米夫定
- E. β -干扰素和拉米夫定

【A1/A2】86. HIV 感染后对免疫系统造成损害，主要的机制是损害了下列细胞中的

- A. 中性粒细胞
- B. B 淋巴细胞
- C. CD4+T 淋巴细胞
- D. CD8+T 淋巴细胞
- E. 自然杀伤 (NK) 细胞

【A1/A2】87. 异烟肼的主要不良反应有

- A. 周围神经炎
- B. 肝损害
- C. 眩晕、听力障碍
- D. 高尿酸血症
- E. 视神经炎

【A1/A2】88. 患儿，4岁。发热、头痛5天，神志不清伴抽搐1天。查体：深度昏迷，呼吸节律不齐，颈项强直，脑膜刺激征阳性，皮肤可见瘀点及瘀斑。周围血常规：WBC $22 \times 10^9/L$ ，NO.90，LO.10。脑脊液：白细胞 $820 \times 10^6/L$ ，NO.62，LO.38，糖 1.7mmol/L ，氯化物 99mmol/L ，蛋白 2.3g/L ，涂片和培养细菌均阳性。该患儿可能患了

- A. 流行性脑脊髓膜炎
- B. 流行性乙型脑炎
- C. 癫痫
- D. 脑瘫
- E. 急性脱髓鞘性多发性神经炎

【A1/A2】89. 患儿，女，8岁。确诊猩红热2周后并发急性肾小球肾炎，引起并发症的主要原因是链球菌及其毒素入侵人体后产生的

- A. 化脓性病变
- B. 非特异性炎症
- C. 感染性病变
- D. 中毒性病变
- E. 变态反应性病变

【A1/A2】90. 患者因“浸润性肺结核”合并咳血痰1天入院，在院期间，护士对患者的饮食宣教，错误的是

- A. 多食含纤维食物
- B. 高热量、高蛋白饮食
- C. 尽量减少饮水量
- D. 多吃新鲜蔬菜水果
- E. 以温凉流质食物为主

【A1/A2】91. 流行性脑脊髓膜炎患儿的皮疹特点是

- A. 斑丘疹
- B. 斑疹
- C. 荨麻疹
- D. 丘疹
- E. 瘀点、瘀斑

【A1/A2】92. 流行性乙型脑炎与流行性脑脊髓膜炎的临床表现差异，最重要的是

- A. 意识障碍的出现与程度
- B. 生理反射异常及出现病理反射



- C. 抽搐发作程度
- D. 皮肤瘀点及瘀斑
- E. 颅内压升高程度，呼吸衰竭的出现

【A1/A2】93. 流行性乙型脑炎极期最严重的三种症状是

- A. 高热、意识障碍、呼吸衰竭
- B. 意识障碍、呼吸衰竭、循环衰竭
- C. 高热、惊厥、呼吸衰竭
- D. 高热、惊厥、循环衰竭
- E. 惊厥、呼吸衰竭、循环衰竭

【A1/A2】94. 麻疹患者在出疹期首先出现皮疹的部位是

- A. 前额、面、颈
- B. 耳后、发际
- C. 胸、背
- D. 胸、腹
- E. 四肢

【A1/A2】95. 急性黄疸型肝炎黄疸前期最突出的表现是

- A. 消化道症状
- B. 呼吸道症状
- C. 泌尿道症状
- D. 神经系统症状
- E. 血液系统症状

(96~98 题共用题干)

【A3/A4】患儿，男，6岁。1天前突发高热，体温达39℃，并伴有咽痛、吞咽痛。今晨发现耳后、颈部及上胸部出现分布均匀的丘疹，舌头肿胀，呈杨梅舌。

96. 正确的护理措施是

- A. 严密隔离
- B. 呼吸道隔离
- C. 消化道隔离
- D. 保护性隔离
- E. 无须隔离

97. 在其床旁固定使用的体温计消毒最好选用

- A. 甲醛
- B. 乙醇
- C. 苯扎溴铵
- D. 氯己定
- E. 环氧乙烷

98. 护理人员在护理这位患者时，可以不洗手的情况是



- A. 处理污物前
- B. 戴无菌手套前
- C. 脱手套后
- D. 进行护理操作后
- E. 接触患者后

(99~100 题共用题干)

【A3/A4】患者男，48 岁。门诊诊断为胃癌，收治入院。

99. 入院后，查血发现其患有急性期甲型肝炎，需对其采取的隔离方式是

- A. 严格隔离
- B. 接触隔离
- C. 呼吸道隔离
- D. 床边隔离
- E. 消化道隔离

100. 该患者所使用过的餐具应该采取

- A. 高压蒸汽灭菌
- B. 喷雾法消毒
- C. 擦拭法消毒
- D. 熏蒸法消毒
- E. 浸泡法消毒