

2021 年云南省护士资格证模考试题

(模考试题四)

【A1/A2】1. 5-羟色胺再摄取抑制剂治疗抑郁症时，起效时间是开始服药后

- A. 1 周
- B. 2 周
- C. 3 周
- D. 4 周
- E. 5 周

【A1/A2】2. 幻觉是精神分裂症患者最常见的感知障碍，其中最常见幻觉是

- A. 幻视
- B. 幻听
- C. 幻嗅
- D. 幻味
- E. 内脏性幻觉

【A1/A2】3. 抑郁症患者情绪低落的表现一天中的规律是

- A. 晨轻夜重
- B. 晨重夜轻
- C. 晨轻夜轻
- D. 晨重夜重
- E. 无规律

【A1/A2】4. 抑郁症患者的核心表现是

- A. 情绪低落
- B. 思维迟缓
- C. 情感淡漠
- D. 睡眠障碍
- E. 自责自罪

【A1/A2】5. 19 岁女生，主诉因“怕脏反复洗手，双手变得粗糙皴裂，明知没必要却无法控制”来就诊。最佳治疗方案是

- A. 精神分析治疗
- B. 抗精神病药物治疗
- C. 工娱治疗
- D. 电休克治疗

E. 药物治疗+心理治疗

【A1/A2】6. 患者男，71岁，诊断为阿尔茨海默症。目前临床最常用的治疗药物是

- A. 抗焦虑药物
- B. 抗抑郁药物
- C. 抗精神病药物
- D. 乙酰胆碱酯酶抑制剂
- E. 促脑代谢药物

【A1/A2】7. 阿尔茨海默症患者的首发症状是

- A. 妄想
- B. 人格改变
- C. 记忆障碍
- D. 语言功能障碍
- E. 视空间技能障碍

【A1/A2】8. 关于对重症抑郁症患者的健康教育，正确的叙述是

- A. 建议患者进行自我心理调整为主，用药为辅
- B. 鼓励安静休息，避免声光刺激
- C. 生活中回避压力，不要主动挑起对抗
- D. 尽量减少社会活动，避免受人关注
- E. 坚持服用药物治疗，不要漏服或随意停药

【A1/A2】9. 张女士，经产妇，26岁。妊娠10个月，急诊检查宫口已开2cm，住院处护士首先应

- A. 办理入院手续
- B. 进行沐浴更衣
- C. 进行会阴清洗
- D. 让产妇步行人病区
- E. 用平车送入产房待产

【A1/A2】10. 下列骨盆径线测量值正常的是

- A. 髌棘间径 22cm
- B. 髌嵴间径 24cm
- C. 骶耻外径 17cm
- D. 坐骨结节间径 9cm
- E. 骶耻内径 14cm

【A1/A2】11. 正常分娩时胎膜破裂的时间一般是

- A. 临产前
- B. 潜伏期
- C. 活跃期
- D. 第二产程

E. 第三产程

【A1/A2】12. 在胎儿分娩过程中，贯穿于分娩整个产程的是

- A. 衔接
- B. 下降
- C. 俯屈
- D. 仰伸
- E. 内旋转

【A1/A2】13. 宫缩间期，胎头回缩，宫缩时胎头出来，为

- A. 胎头拨露
- B. 胎头着冠
- C. 胎头娩出
- D. 第一产程
- E. 第三产程

【A1/A2】14. 输卵管峡部妊娠时，最易出现的病理结局是

- A. 输卵管妊娠流产
- B. 输卵管妊娠破裂
- C. 继发性腹腔妊娠
- D. 陈旧性宫外孕
- E. 孕卵管向宫内生长

【A1/A2】15. 下列因素中最易引发早产的是

- A. 轻度贫血
- B. 骨盆狭窄
- C. 子宫畸形
- D. 羊水偏少
- E. 慢性乙肝

【A1/A2】16. 尿路感染女性发病率高于男性，是因为女性尿道较男性尿道

- A. 短而宽
- B. 长而窄
- C. 扁而平
- D. 宽而长
- E. 短而窄

【A1/A2】17. 患者女，26岁。新婚。平时月经规律，现停经42天，主诉晨起恶心、呕吐，怀疑患者为早孕，拟采集尿标本做妊娠试验，护士应留取

- A. 晨起第一次尿
- B. 随时收集尿液
- C. 中段尿
- D. 临睡前尿

E. 24 小时尿

【A1/A2】18. 患者女，39 岁。继发性痛经，进行性加重，非月经期下腹痛。妇科检查：可触及较大异位囊肿及子宫粘连的肿块。医生诊断为子宫内膜异位症。该患者最佳的诊断方法是

- A. 超声波检查
- B. CA125 检查
- C. 腹腔镜检查
- D. 宫腔镜检查
- E. 阴道镜检查

【A1/A2】19. 产妇，25 岁。产后开始哺乳。为避免乳头皲裂，护士指导产妇哺乳时应注意的是

- A. 让新生儿勤吸允乳头
- B. 让新生儿含住乳头及大部分乳晕
- C. 哺乳前碘附消毒乳头
- D. 哺乳前清水清洗乳头
- E. 苯甲酸雌二醇涂抹乳头防止皲裂

【A1/A2】20. 29 岁产妇，因双胎妊娠行剖宫产娩出两活婴。新生儿均因轻度窒息转儿科治疗。该产妇因患有活动型乙型肝炎，护士告知其需要退奶，产后第 2 天值班护士查房时发现产妇情绪低落，其可能的原因不包括

- A. 母婴分离
- B. 手术后疲劳
- C. 生产过程中缩宫素的使用
- D. 产妇体内雌、孕激素水平急剧下降
- E. 家属对新生儿的高度关注带来的失落感

【A1/A2】21. 某孕妇，孕前基础血压为 120/80mmHg。孕 30 周时出现下肢水肿，头痛头晕。查体：血压 150/100mmHg，蛋白尿（+）。诊断为妊娠期高血压疾病，患者出现上述症状的病理生理变化基础是

- A. 底蜕膜出血
- B. 全身的小动脉痉挛
- C. 水钠潴留
- D. 内分泌功能失调
- E. 肾小管重吸收功能降低

【A1/A2】22. 初产妇，30 岁，妊娠 40 周顺产。胎儿经阴道娩出后护士立即为其按摩子宫并协助胎盘娩出，这一行为可能导致的不良后果是

- A. 胎盘粘连
- B. 胎盘卒中
- C. 胎盘嵌顿
- D. 胎盘植入

E. 胎盘剥离不全

【A1/A2】23. 患者女，36岁，已婚。停经60天，阴道少量出血5天，色暗红，伴下腹轻微疼痛。今晨在家突然阴道流血增多，并有一烂肉样组织物排出。妇科检查宫口已开，有组织露出，子宫如孕7周大小，阴道流血多，此时最应进行的处理是

- A. 备血
- B. 取头高足低位
- C. 备皮，为手术做准备
- D. 病理检查
- E. 测量生命体征每4小时1次

【A1/A2】24. 孕妇29岁，孕37周，G2P0，前置胎盘入院。现有少量阴道流血，孕妇担心胎儿安危会产生的心理问题是

- A. 无助感
- B. 恐惧
- C. 悲哀
- D. 自尊低下
- E. 倦怠

【A1/A2】25. 患者女，28岁。分娩时行会阴侧切，分娩后用25%硫酸镁湿敷。护士在操作过程中应特别注意的是

- A. 热敷局部皮肤涂凡士林
- B. 保持合适的水温
- C. 敷料拧至不滴水为止
- D. 严格执行无菌操作
- E. 操作完毕后及时更换敷料

【A1/A2】26. 某社区妇幼保健院机构进行孕期检查，护士应指导孕妇正确进行产前检查的孕期是

- A. 妊娠14~19周，每周检查1次
- B. 妊娠20~31周，每周检查1次
- C. 妊娠6~13周，每周检查1次
- D. 妊娠32~36周，每周检查1次
- E. 妊娠37~41周，每周检查1次

【A1/A2】27. 初产妇，29岁。既往月经规律，妊娠38+2周。门诊查体：宫高在脐剑之间，胎心140次/min。指导孕妇进行的最简便有效的判断胎儿安危的方法是

- A. 胎儿电子监护
- B. 尿
- C. 3测定
- D. 羊膜镜检查
- E. OCT检查
- F. 胎动计数

【A1/A2】28. 某产妇，25岁。自然分娩后1小时在产房观察，责任护士应注意

- A. 泌乳量
- B. 会阴切口
- C. 心理状态
- D. 体温
- E. 宫缩情况

【A1/A2】29. 一产妇，顺产。阴道大量流血，产后半小时胎盘未剥离，经检查宫底平脐，子宫硬。不需要再做的检查是

- A. 宫底情况
- B. 子宫收缩力
- C. 阴道分泌物
- D. 凝血功能
- E. 阴道情况

【A1/A2】30. 产妇进入第二产程的重要标志是

- A. 宫口开全
- B. 胎头拨露
- C. 胎头着冠
- D. 胎膜已破
- E. 外阴膨隆

【A1/A2】31. 初产妇，27岁。顺产后第14天，护士评估其子宫复旧情况，下列情况说明子宫复旧不良的是

- A. 宫颈内口关闭
- B. 宫颈外口呈“一”形
- C. 子宫内膜尚未充分修复
- D. 耻骨联合上方可触及宫底
- E. 产妇有白色恶露

【A1/A2】32. 胎儿娩出后，护士对胎儿首先进行的护理措施是

- A. 保暖
- B. 擦干羊水
- C. 结扎脐带
- D. 清理呼吸道
- E. 新生儿 Apgar 评分

【A1/A2】33. 林女士，足月自然产后4天，出现下腹痛，体温正常，恶露多，有臭味，子宫底脐上1指，子宫体软，应考虑为

- A. 子宫肌炎
- B. 子宫内膜炎
- C. 盆腔结缔组织炎

- D. 急性输卵管炎
- E. 腹膜炎

【A1/A2】34. 关于第三产程“胎盘”的护理措施，不妥当的是

- A. 胎盘未完全剥离之前不能用力牵拉
- B. 发现胎盘残留首选静脉滴注缩宫素
- C. 一旦胎儿娩出后立即注射缩宫素
- D. 胎盘未剥离前用力牵拉可拉断脐带而大出血
- E. 胎盘未剥离前用力下压宫底可致子宫内翻

【A1/A2】35. 产后血性恶露持续的时间一般是

- A. 1~2 天
- B. 3~4 天
- C. 8~10 天
- D. 10~15 天
- E. 15~20 天

【A1/A2】36. 指导产妇早期起床活动，理解错误的是

- A. 增强血液循环
- B. 促进子宫复旧
- C. 有利恶露排出
- D. 有助乳汁分泌
- E. 有利缓解便秘

【A1/A2】37. 产妇产后 8 小时发生尿潴留，以下护理措施错误的是

- A. 药物和针灸
- B. 诱导排尿
- C. 坐起排尿
- D. 立即插入导尿管
- E. 按摩热敷

【A1/A2】38. 某孕妇，30 岁。停经 28+5 周，G2P0。行产前检查时，B 超：羊水最大暗区垂直深度 8.5cm，被诊断为“羊水过多”。给予该孕妇的指导中，错误的是

- A. 休息时去枕平卧位
- B. 一次放羊水量不超过 1500ml
- C. 密切观察胎心及胎动
- D. 减少增加腹压的活动
- E. 定期测量宫高及腹围

【A1/A2】39. 急性胎儿窘迫最早出现的症状是

- A. 胎动减少
- B. 胎动消失
- C. 胎心率加快

- D. 胎儿生长受限
- E. 胎盘功能减退

【A1/A2】40. 孕妇，31岁。妊娠38周，因阴道持续性流液2小时入院。医生诊断为胎膜早破，护士协助采用的卧位应为

- A. 平卧位
- B. 头低足高位
- C. 头高足低位
- D. 截石位
- E. 膝胸卧位

【A1/A2】41. 一婴儿34周出生，体重1.3kg，病房内的温度应该为

- A. 18~22℃
- B. 22~24℃
- C. 24~26℃
- D. 26~28℃
- E. 28~30℃

【A1/A2】42. 符合早产儿外观特点的是

- A. 皮肤红润，胎毛少
- B. 耳壳软骨发育好
- C. 乳晕明显，有结节
- D. 指甲长过指端
- E. 足底光滑，纹理少

【A1/A2】43. ABO血型不合引起的新生儿溶血症最常见于

- A. 母亲为A型，新生儿为B型
- B. 母亲为A型，新生儿为O型
- C. 母亲为O型，新生儿为A型
- D. 母亲为B型，新生儿为A型
- E. 母亲为AB型，新生儿为AB型

【A1/A2】44. 某新生儿，日龄5天。出生体重3kg，目前体重2.8kg，妈妈很担心孩子的体重会继续下降，护士向妈妈解释孩子的体重将恢复正常，下列解释正确的是

- A. 1天内恢复正常
- B. 7天内恢复正常
- C. 10天内恢复正常
- D. 2周内恢复正常
- E. 3周内恢复正常

【A1/A2】45. 患儿，女，孕32周，早产。体重1450g，体温不升，呼吸50次/min，血氧饱和度95%，胎脂较多。护士首先应采取的护理措施是

- A. 将患儿置于暖箱中

- B. 给予鼻导管低流量吸氧
- C. 立即擦净胎脂
- D. 接种卡介苗
- E. 立即向患儿家长进行入院宣教

【A1/A2】46. 不属于新生儿常见的正常生理状态的是

- A. “马牙”
- B. 生理性黄疸
- C. 臀红
- D. 假月经
- E. 乳腺肿大

【A1/A2】47. 新生儿生后具有，数月后自然消失的神经反射不包括

- A. 觅食反射
- B. 吸吮反射
- C. 握持反射
- D. 拥抱反射
- E. 吞咽反射

【A1/A2】48. 有关新生儿黄疸健康教育的叙述，错误的是

- A. 保管患儿衣物时勿放樟脑丸
- B. 保持患儿大便通畅
- C. 母乳性黄疸的患儿须中断母乳喂养
- D. 红细胞 G-6-PD 缺陷的患儿，忌食蚕豆
- E. 有后遗症的患儿，给予康复治疗和功能锻炼

【A1/A2】49. 新生儿黄疸在出生后 24 小时内出现者应首先考虑

- A. 新生儿生理性黄疸
- B. 新生儿败血症
- C. 新生儿肝炎
- D. 新生儿溶血病
- E. 先天性胆道闭锁

【A1/A2】50. 患儿女，足月儿。出生后 1 分钟评估患儿情况：躯干皮肤色红，四肢较紫，心率 120 次/min，哭声响亮，肌张力好，呼吸 45 次/min。该足月儿最终的 Apgar 评分是

- A. 6 分
- B. 7 分
- C. 8 分
- D. 9 分
- E. 10 分

【A1/A2】51. 早产儿，生后 2 天，胎龄 34 周。因发绀给予氧气吸入，为预防其氧中毒，正确的做法是

- A. 维持动脉血氧分压在 80~90mmHg

- B. 维持经皮血氧饱和度在 88%~93%
- C. 连续吸氧时间不超过 7 天
- D. 吸氧浓度在 70%~80%
- E. 给予机械正压通气

【A1/A2】52. 某早产儿，出生后 Apgar 评分较低，转入新生儿病房，治疗 12 天后情况好转，今天医生通知家长出院，护士在出院指导时应向家长重点强调的是

- A. 及时添加辅食
- B. 预防感染
- C. 培养良好生活习惯
- D. 防止外伤
- E. 及早训练按时排便

【A1/A2】53. 患儿，女，足月儿。因脐带绕颈，出生后 1 分钟 Apgar 评分为 1 分，5 分钟后 2 分，经窒息复苏后，目前患儿仍嗜睡、反应差，呕吐。此时对患儿不恰当的护理是

- A. 头罩吸氧
- B. 监测生命体征
- C. 立即开奶
- D. 配合亚低温疗法
- E. 注意保暖

【A1/A2】54. 新生儿，男，胎龄 35 周。生后第 1 天，基本情况可，其母尚无乳汁分泌。为预防新生儿低血糖，护理措施重点是

- A. 可试喂米汤
- B. 及时喂葡萄糖水
- C. 应果断进行人工喂养
- D. 配合进行静脉输注葡萄糖液
- E. 等待母亲乳汁开始分泌再开奶，坚持母乳喂养

【A1/A2】55. 新生儿，男，日龄 4 天。出生后第 3 天发现乳腺肿大，目前应采取的护理措施是

- A. 立即报告医生，及时诊疗
- B. 将内容物挤出，以免病情恶化
- C. 预防性使用抗生素
- D. 无须处理，并告知家长正确认识
- E. 对患儿乳房进行常规消毒

【A1/A2】56. 足月新生儿生后第 2 天，身体健康，对其脐部的护理措施中，错误的是

- A. 勤换尿布，衣物柔软
- B. 脐部保持清洁、干燥
- C. 接触新生儿前后要洗手
- D. 严格执行无菌操作技术
- E. 用 3%过氧化氢液清洗脐部

【A1/A2】57. 患儿，男，胎龄 36 周，生后 20 小时即出现黄疸。查母血型为 Rh（-），患儿血型为 Rh（+），患儿生后 36 小时出现嗜睡，尖声哭叫、肌张力下降，胆红素上升至 342 $\mu\text{mol/L}$ 。该患儿最可能发生了

- A. 新生儿胆红素脑病
- B. 新生儿低钙血症
- C. 新生儿颅内出血
- D. 新生儿化脓性脑膜炎
- E. 新生儿低血糖

【A1/A2】58. 5 岁发育正常的小儿，其平均身高约为

- A. 87cm
- B. 109cm
- C. 103cm
- D. 110cm
- E. 102cm

【A1/A2】59. 小儿喂养中，若供给糖的比例过少，机体会氧化脂肪产能。此时，机体最可能出现的病理生理改变是

- A. 脱水
- B. 水中毒
- C. 酸中毒
- D. 碱中毒
- E. 氮质血症

【A1/A2】60. 幼儿期是指

- A. 从出生~1 岁
- B. 从出生~2 岁
- C. 1~3 岁
- D. 3~5 岁
- E. 4~6 岁

【A1/A2】61. 十岁小孩的正常体重

- A. 22kg
- B. 20kg
- C. 35kg
- D. 28kg
- E. 30kg

【A1/A2】62. 小儿的自我概念开始形成的时期是

- A. 婴儿期
- B. 幼儿期
- C. 学龄前期

- D. 学龄期
- E. 青春期

【A1/A2】63. 小儿，男，现体重 9kg。会走，能叫“爸爸”、“妈妈”，尚不能自主控制大小便。该小儿的年龄最可能是

- A. 3 个月
- B. 6 个月
- C. 12 个月
- D. 18 个月
- E. 24 个月

【A1/A2】64. 足月儿，女婴，7 个月。体检指标正常，此月龄最适合添加的辅食是

- A. 蛋黄
- B. 软饭
- C. 猪肝
- D. 面食
- E. 鸡蛋

【A1/A2】65. 一个出生为 2.5kg 的婴儿，5 个月时体重大约为

- A. 7kg
- B. 6kg
- C. 8kg
- D. 11kg
- E. 9kg

【A1/A2】66. 某 6 月龄婴儿，父母带其到儿童保健门诊进行预防接种，此时应给该患儿注射的疫苗是

- A. 百白破疫苗
- B. 乙肝疫苗
- C. 卡介苗
- D. 麻疹疫苗
- E. 脊髓灰质炎疫苗

【A1/A2】67. 小儿，男，4 个月。根据小儿保健疫苗接种计划需接种

- A. 卡介苗第 1 次
- B. 脊灰疫苗第 2 次
- C. 百白破第 1 次
- D. 百白破第 2 次
- E. 乙肝第 1 次

【A1/A2】68. 属于疫苗接种异常反应的是

- A. 心因性反应
- B. 偶合发病

- C. 原有疾病加重
- D. 一般反应
- E. 变态反应

【A1/A2】69. 1岁女婴，出生史正常，喂养正常，现进行常规生长发育检查。该女婴的左手腕部X线摄片，可显示的骨化中心数量最多为

- A. 4个
- B. 2个
- C. 0个
- D. 6个
- E. 8个

【A1/A2】70. 不属于新生儿家庭访视内容的是

- A. 询问新生儿出生情况
- B. 观察新生儿一般情况
- C. 新生儿体格检查
- D. 指导喂养及日常护理
- E. 家庭成员

【A1/A2】71. 小儿出现生理性厌食的年龄是

- A. 8个月
- B. 10个月
- C. 1岁
- D. 1.5岁
- E. 2岁

【A1/A2】72. 小儿，女，10月龄，常规生长发育检测报前囟未闭合，家长担心发育不正常。护士告知家长正常小儿前囟闭合的月龄是

- A. 10~11个月
- B. 12~18个月
- C. 20~22个月
- D. 22~24个月
- E. 24~30个月

【A1/A2】73. 产妇，25岁。产后第4天，仍未大便，有多种原因可导致她发生便秘，但不包括

- A. 哺乳后体内水分少
- B. 腹直肌明显松弛
- C. 未恢复正常肠蠕动
- D. 产后卧床运动少
- E. 盆底肌肉松弛

【A1/A2】74. 某孕妇，26岁。孕32周，突然阴道不自主流液4小时入院，入院后医嘱肌注

地塞米松，其目的是

- A. 促进胎儿肾脏发育
- B. 促进胎儿心脏发育
- C. 促进胎儿肺成熟
- D. 促进胎儿肝脏发育
- E. 促进胎儿大脑发育

【A1/A2】75. 孕妇，末次月经第一天日期为 2018. 6. 10，预产期可能为

- A. 2019. 1. 17
- B. 2019. 2. 17
- C. 2019. 1. 13
- D. 2019. 3. 17
- E. 2019. 2. 13

【A1/A2】76. 孕妇，23 岁。自我判断已临产，去产科分娩室，助产士接待该孕妇并作常规检查。助产士判断临产的症状，不包括的症状是

- A. 有规律的宫缩
- B. 孕妇的哭叫程度
- C. 进行性宫颈管消失
- D. 宫口已经扩张
- E. 胎先露已下降

【A1/A2】77. 经产妇，2 天前顺产一健康新生儿，该产妇出现下述临床表现时，护士应立即报告医生的是

- A. 口腔温度为 36.8℃
- B. 脉率为 109 次/min
- C. 汗液分泌增多
- D. 排尿次数频繁
- E. 呼吸为 22 次/min

【A1/A2】78. 产妇，35 岁。因胎儿宫内窘迫行低位产钳助产术娩出一活婴。产后 3 天诉会阴部疼痛难忍。查体：会阴部肿胀，左侧切口红肿、有触痛。以下处理不正确的是

- A. 红外线照射
- B. 50%硫酸镁湿敷切口
- C. 每日冲洗外阴
- D. 取健侧卧位
- E. 1:5000 高锰酸钾液坐浴

【A1/A2】79. 初产妇，35 岁。自然分娩，产程延长，手取胎盘。出院时，责任护士告知其预防产褥感染的措施，错误的内容是

- A. 加强营养
- B. 不能外出
- C. 注意卫生

- D. 禁止盆浴
- E. 防止感冒

【A1/A2】80. 孕妇，28岁，G₃P₈，孕38周。今突感剧烈腹痛伴有少量阴道流血。查体：血压150/110mmHg，子宫似足月妊娠大小，硬如木板，有压痛，胎心90次/min，胎位不清。其最可能发生了

- A. 临产
- B. 先兆子宫破裂
- C. 早产
- D. 胎盘早期剥离
- E. 前置胎盘

【A1/A2】81. 孕妇，26岁。妊娠39周分娩，在左侧会阴切开下顺产一活婴。胎盘胎膜娩出完整，产后30分钟阴道出血增多，测血压90/60mmHg，脉搏90次/min。宫底位于脐上3横指，子宫软，按压宫底排出血液及血块约500ml。首要的处理原则是

- A. 抗休克
- B. 抗感染
- C. 检查软产道
- D. 加强宫缩
- E. 清理宫腔

【A1/A2】82. 产妇，25岁，3天前经阴道分娩一女婴。今日查房发现其乳头皲裂，为减轻母乳喂养时的不适。正确的护理措施是

- A. 先在损伤较重的一侧乳房哺乳
- B. 为减轻疼痛应减少喂哺的次数
- C. 哺乳前用毛巾和肥皂水清洁乳头和乳晕
- D. 喂哺后挤出少许乳汁涂在乳头和乳晕上
- E. 哺乳时让婴儿含吮乳头即可

【A1/A2】83. 某孕妇，26岁。因重度子痫前期应用硫酸镁治疗，发生中毒现象，除应停用硫酸镁外，还应立即使用

- A. 肌内注射山莨菪碱
- B. 静脉滴注50%葡萄糖
- C. 静脉滴注低分子右旋糖酐
- D. 静脉滴注5%的葡萄糖
- E. 静脉推注10%葡萄糖酸钙

【A1/A2】84. 某孕妇，30岁，G₁P₀，孕37周。因羊水过多行羊膜腔穿刺术后为该孕妇腹部放置沙袋的目的是

- A. 减轻疼痛
- B. 减少出血
- C. 预防休克
- D. 预防血栓形成

E. 预防感染

【A1/A2】85. 初孕妇，29岁，孕20周行产前检查。检查时腹部触及多个小肢体，考虑多胎妊娠。以下检查方法中最有助于明确诊断的是

- A. 腹部B超
- B. 胎心监护
- C. 腹部X摄片
- D. 腹部MIR检查
- E. 腹部CT

【A1/A2】86. 孕妇，26岁。孕39周，上午家务劳动时突感胎动频繁，至傍晚胎动渐减弱、消失，急诊入院，听诊胎心音90次/min。下列护理措施不妥的是

- A. 左侧卧位，间断吸氧
- B. 行胎心监护
- C. 嘱孕妇增加营养和休息即可，继续观察病情
- D. 协助做好手术产的准备
- E. 做好新生儿的抢救和复苏准备

【A1/A2】87. 某产妇，29岁。G₁P₀，孕39周。因胎儿畸形分娩时子宫破裂行子宫修补术。该患者术后再次妊娠至少需要等待的时间是

- A. 3个月
- B. 6个月
- C. 1年
- D. 2年
- E. 3年

【A1/A2】88. 某初孕妇，32岁。妊娠38周，腹部触诊，宫底可触及圆而硬的胎儿部分，腹部右侧凹凸不平，左侧相对平坦，胎心音脐上左侧听得最清楚。该孕妇胎儿胎位可能是

- A. 枕左前位
- B. 枕右前位
- C. 骶左前位
- D. 骶右前位
- E. 肩右前位

【A1/A2】89. 某产妇，足月产后3天，出现下腹痛，体温不高，恶露多，有臭味，子宫底位于脐上1指，子宫体软。以下护理措施中，错误的是

- A. 做好会阴护理
- B. 半卧位或抬高床头
- C. 检测体温变化
- D. 做好心理支持
- E. 红外线照射会阴部每日3次，每次1小时

【A1/A2】90. 妊娠满28周不足37周的孕妇，出现下列哪种情况，不能作为判断早产的依据

- A. 羊水量超过 2000ml
- B. 宫颈管缩短 \geq 80%
- C. 宫颈管完全消失
- D. 出现规律性宫缩
- E. 宫口扩张 $>$ 2cm

【A1/A2】91. 某孕妇，G₂P₀，妊娠 30 周。规律下腹疼痛伴阴道血性分泌物 6 小时。查体：胎位 LOA，胎心率 146 次/min，宫缩 20s/7~8min，宫缩力弱，肛查胎先露 S-3，宫颈管缩短，宫口可容一指尖。目前最恰当的处理措施是

- A. 严密观察等待自然分娩
- B. 滴注缩宫素加强宫缩
- C. 抑制宫缩保胎治疗
- D. 立即行剖宫产终止妊娠
- E. 阴道检查后确定分娩方式

【A1/A2】92. 孕妇，28 岁，孕 38 周。在上厕所蹲下的时候发现有液体从阴道流出，去医院检查诊断为胎膜早破，此时她的阴道 pH 为

- A. 4.5~5.5
- B. 5.5~6.0
- C. 5.0~6.0
- D. 3.5~4.5
- E. 6.5~7.5

【A1/A2】93. 肾病综合征大量蛋白尿的原因是

- A. 血浆胶体渗透压下降
- B. 肾小球滤过膜通透性增加
- C. 肾功能下降
- D. 尿量增加
- E. 感染

【A1/A2】94. 患儿，男，7 岁。面及眼睑水肿 3 天，少尿入院，入院前 2 周患扁桃体炎。体温 37.5℃，脉搏 80 次/min，呼吸 24 次/min，神志清醒，面部水肿，咽略红，心肺（-），尿常规：RBC（+++），蛋白（++），管型 0，WBC 5 个/HP。该患儿应考虑为

- A. 尿路感染
- B. 单纯性肾病
- C. 急性肾炎
- D. 慢性肾炎
- E. 肾炎型肾病

【A1/A2】95. 早产儿，出生 7 天，母乳喂养。巩膜、皮肤黄染，血清胆红素 10mg/dl，一般情况尚好，体温、食欲及大小便均正常。该早产儿黄疸的可能原因是

- A. 新生儿溶血病
- B. 母乳性黄疸

- C. 新生儿缺血缺氧性脑病
- D. 生理性黄疸
- E. 红细胞增多症

(96~97 题共用题干)

【A3/A4】患者女，25岁，孕8周，先天性心脏病。妊娠后表现为一般体力活动受限制，活动后感觉心悸、轻度气短，休息时无症状。

96. 患者现在很紧张，询问是否能继续妊娠。护士应告诉她做决定的依据主要是

- A. 年龄
- B. 心功能分级
- C. 胎儿大小
- D. 心脏病种类
- E. 病变发生部位

97. 患者整个妊娠期心脏负担最重的时期是

- A. 孕12周内
- B. 孕24~26周
- C. 孕28~30周
- D. 孕32~34周
- E. 孕36~38周

(98~100 题共用题干)

【A3/A4】患者女，44岁。因1周前尿量减少，约500~600ml/d，食欲差、双眼睑水肿就诊。查体：血压170/100mmHg。实验室检查：血肌酐 $726\mu\text{mol/L}$ ，尿素氮 $26.8\mu\text{mol/L}$ ，血钾 6.5mmol/L ，RBC $2.35\times 10^{12}/\text{L}$ ，Hb 0g/L 。初步诊断为肾衰竭收住入院。

98. 引起该患者高血压的最主要原因是

- A. 肾素活性增高
- B. 水钠潴留
- C. 使用环孢素等药物
- D. 精神应激
- E. 钠盐摄入过多

99. 该患者应避免摄取的食物是

- A. 苹果
- B. 芋头
- C. 橘子
- D. 马铃薯
- E. 鸡蛋

100. 该患者每天摄入的液体量应为

- A. 前一天的尿量加上500ml
- B. 相当于前一天的尿量
- C. 前一天的尿量减去500ml

D. 2000~5000ml

E. 一般不严格限水，但不可过多饮水

