

导

# 2019 年事业单位联考 E 类综合应用能力模拟试卷三

## 第一部分 医学基础知识

一、单项选择题，共 40 题，每题 1.2 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意。

1. 钙的生理作用不包括

- A. 降低毛细血管和细胞膜的通透性
- B. 降低神经肌肉的兴奋性
- C. 参与能量代谢
- D. 参与肌肉收缩和细胞的分泌作用

2. 检查发现患者体型瘦长，胸廓前后径不及左右径的一半，应考虑为

- A. 桶状胸
- B. 鸡胸
- C. 扁平胸
- D. 漏斗胸

3. 内麦粒肿是下列哪项的病变

- A. 汗腺
- B. 睑板腺
- C. Zeis 腺
- D. Moll 腺

4. 胰腺癌大多起源于

- A. 腺管上皮细胞
- B. 导管细胞癌
- C. 胰体癌
- D. 胰泡细胞癌

5. 下列各项属于高渗性脱水患者尿液特点的是

- A. 尿量增多，尿相对密度增高
- B. 尿量减少，尿相对密度增高
- C. 尿量增多，尿相对密度降低
- D. 尿量减少，尿相对密度降低

导

6. 癫痫大发作时治疗首选

- A. 地西洋静脉注射
- B. 乙琥胺
- C. 卡马西平
- D. 苯妥英钠

7. 食物中蛋白质生物学价值的高低主要取决于

- A. 是动物蛋白还是植物蛋白
- B. 蛋白质的绝对含量
- C. 蛋白质与脂肪的比值
- D. 必需氨基酸含量与比值

8. 药物习惯性是指

- A. 某药物对某一特定人群的疗效较好
- B. 服药一段时间后才能发挥药效
- C. 长期反复使用某药物后，患者对该药物产生欣快感
- D. 长期反复使用某药物，一旦停药后会感到不适

9. 患者静滴青霉素时突发晕厥，皮肤湿冷，脉搏不可扪及，首选的抢救药物是

- A. 糖皮质激素
- B. 肾上腺素
- C. 硝普钠
- D. 阿托品

10. 原发性肝癌中哪一种肉眼类型常不合并肝硬化或硬化较轻

- A. 弥漫型
- B. 结节型
- C. 外生型
- D. 巨块型

11. 一般腹水量需达到多少量，方可清楚地叩出移动性浊音

- A. 100ml
- B. 500ml
- C. 1000ml
- D. 2000ml

12. 治疗肺炎球菌肺炎首选

- A. 林可霉素
- B. 克林霉素
- C. 庆大霉素
- D. 青霉素 G

导

13. 中央型肺癌胸片检查的直接征象是

- A. 局限性肺气肿
- B. 肺门块影，分叶
- C. 阻塞性肺炎
- D. 肺不张

14. 十二指肠溃疡的压痛点常在

- A. 脐部偏左上方
- B. 脐部偏左下方
- C. 脐部偏右上方
- D. 脐部偏右下方

15. 下列选项中，属于长效糖皮质激素的是

- A. 倍他米松
- B. 可的松
- C. 氢化可的松
- D. 泼尼松龙

16. 下列选项不属于癌前病变的是

- A. 结肠多发性息肉
- B. 结核球
- C. 纤维囊性乳腺病
- D. 黏膜白斑

17. 一般不会发生贫血性梗死的器官是

- A. 心
- B. 脾
- C. 肾
- D. 肠

18. 多普勒超声的定量分析不包括

- A. 瓣口面积的测量
- B. 血流量的测量
- C. 心肌质量的测量
- D. 血流速度的测量

19. 血浆游离血红蛋白增高见于

- A. 血管内溶血
- B. 自身免疫性溶血性贫血
- C. 血管外溶血

导

D. 再生障碍性贫血

20. DIC 导致出血的特征是

- A. 慢性、反复发生
- B. 以单一器官出血为多
- C. 仅见于皮肤瘀或血肿
- D. 广泛的自发性出血

21. 根据 0~5 级肌力分级法, 3 级肌力为

- A. 肌肉可收缩, 但不能产生动作
- B. 肢体能在床上平移, 但不能抬起
- C. 肢体能抗地心引力而抬离床面, 但不能对抗阻力
- D. 肢体能对抗阻力, 但较正常为差

22. 患者住院期间因救治无效死亡, 完成死亡记录报告

- A. 应在死亡后立即完成
- B. 4 小时内完成
- C. 6 小时内完成
- D. 24 小时内完成

23. 甲型病毒性肝炎通过何种途径传播

- A. 经母婴传播
- B. 经口传播
- C. 经血传播
- D. 经密切接触传播

24. 矽肺（硅沉着病）是尘肺（肺尘埃沉着病）中最严重的一种类型, 是由于长期吸入

- A. 水泥
- B. 二氧化硅
- C. 石棉
- D. 煤炭

25. 牵涉痛是指

- A. 内脏疾病引起相邻脏器的疼痛
- B. 手术牵拉脏器引起的疼痛
- C. 神经疼痛向体表投射
- D. 内脏疾病引起体表某部位疼痛或痛觉过敏

26. 治疗帕金森病的最佳药物是

- A. 左旋多巴
- B. 毒扁豆碱

导

- C. 利血平
- D. 乙酰胆碱

27. 正常肺部叩诊音为

- A. 鼓音
- B. 过清音
- C. 浊音
- D. 清音

28. 寒战是发热的哪个时期表现

- A. 发热潜伏
- B. 体温上升
- C. 高热持续
- D. 体温下降

29. 发现肺结核的简便有效方法是

- A. 查痰
- B. 查体
- C. 查尿
- D. 做心电图

30. 最常见的肠梗阻是

- A. 机械性肠梗阻
- B. 动力性肠梗阻
- C. 血运性肠梗阻
- D. 麻痹性肠梗阻

31. 膀胱刺激症状是指

- A. 尿急、尿痛、血尿
- B. 尿频、尿痛、排尿困难
- C. 尿急、尿痛、排尿困难
- D. 尿频、尿急、尿痛

32. 上消化道出血患者粪便典型表现为

- A. 米泔水样便
- B. 黏液便
- C. 柏油样粪便
- D. 脓血样粪便

33. 面动脉的压迫止血点通常在

- A. 咬肌前缘与下颌骨下缘交点处



导

- B. 咬肌后缘与下颌角处
- C. 鼻翼外侧
- D. 口角外侧

34. 急性肾小球肾炎的主要致病菌是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 溶血性链球菌
- C. 大肠杆菌
- D. 淋球菌

35. 器质性二尖瓣关闭不全的杂音出现于

- A. 收缩早期
- B. 收缩中期
- C. 收缩晚期
- D. 全收缩期

36. 肺气肿患者胸廓常见为

- A. 扁平胸
- B. 畸形胸
- C. 桶状胸
- D. 鸡胸

37. 心电图 ST 段代表

- A. 心室缓慢复极时的电位变化
- B. 心室快速复极时的电位变化
- C. 心房缓慢复极时的电位变化
- D. 心房快速复极时的电位变化

38. 现有资料表明，传染性非典型肺炎的主要传染源是

- A. 传染性非典型肺炎患者
- B. 果子狸
- C. 携带冠状病毒的各种动物
- D. 以上都是

39. 有关霍乱的说法，错误的是

- A. 经食物和水传播
- B. 霍乱是由产霍乱毒素的霍乱弧菌引起的
- C. 起病急
- D. 以严重腹痛、腹泻为特征的急性细菌性肠道传染病

40. 我国流行性出血热最主要的传染源是

导

- A. 家鼠
- B. 黑线姬鼠
- C. 红背鼠
- D. 棕背鼠

二、多项选择题，共 20 题，每题 2.1 分。每题的备选项中，至少有 2 个是符合题意的。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。

41. 护患关系中造成积极或者消极的影响取决于护理人员，主要影响源有

- A. 语言
- B. 行为举止
- C. 情绪
- D. 理论知识

42. 护士记录患者资料符合要求的有

- A. 收集资料后需及时记录
- B. 描述资料用词语准确
- C. 内容要准确反映患者问题
- D. 客观资料应尽量用患者的语言

43. 使用约束带的时候应注意

- A. 带下须垫衬垫，松紧适宜
- B. 注意观察约束部位末梢循环及温度
- C. 只宜短期使用
- D. 定时松解，必要时按摩

44. 护理人员铺床时，两腿前后分开稍屈膝，上身直立足为了

- A. 扩大支撑面
- B. 增加身体稳定性
- C. 姿势优美
- D. 省力

45. 下列哪项是促进患者休息时的护理措施

- A. 尊重患者休息习惯
- B. 做好心理护理，解除患者焦虑
- C. 各种冷疗护理活动相对集中
- D. 协助患者自我放松

46. 以下选项中适合冷疗的是

导

- A. 牙痛
- B. 深部化脓病灶
- C. 大面积组织损伤
- D. 急性扭伤早期

47. 调节输液速度时，下列处理正确的是

- A. 一般情况下成人 40~60 滴/分，儿童 20~40 滴/分
- B. 高渗溶液，升压药滴速宜快
- C. 脱水严重滴速宜快
- D. 老年心肺病滴速宜慢

48. 保证血压测量的准确性和可比性，应做到

- A. 定体位
- B. 定部位
- C. 定时间
- D. 定血压计

49. 下列选项中属于输血正确操作的是

- A. 采血标本时，每次只能采集一位患者
- B. 输血前需两位护士共同核对
- C. 若血浆变红，血细胞呈暗紫色，则不能使用
- D. 输血过程中应听取患者主诉，观察反应

50. 急性肺水肿的护理措施正确的是

- A. 按医嘱静脉注射毛花苷丙
- B. 取坐位，两腿下垂
- C. 持续低流量吸氧
- D. 遵医嘱吗啡皮下注射

51. 慢性胃炎的治疗，下列正确的是

- A. Hp 引起的慢性活动性胃炎应给予根除治疗
- B. 发现不典型增生则需积极准备手术切除以防癌变
- C. 有烟酒嗜好应戒除
- D. 伴有肠上皮化生可考虑用  $\beta$ -胡萝卜素、维生素 C 或叶酸

52. 以下属于长期卧床患者的并发症有

- A. 消化不良
- B. 肾结石
- C. 褥疮
- D. 坠积性肺炎



导

53. 发生在危险三角区的疖为何不能挤压
- A. 此三角区域内有感染时，易在面前静脉内形成血栓
  - B. 眶上通向颅内蝶鞍两侧的海绵窦，将面部炎症传播到颅内
  - C. 炎症还可向眼部及周围组织扩散，造成视力障碍
  - D. 炎症可向全身播散，病情严重者，甚至可发生败血症
54. 新生儿硬肿症的特征为
- A. 体温不高
  - B. 皮肤冷凉
  - C. 皮下脂肪变硬
  - D. 伴有水肿
55. 剪刀步态的特点有
- A. 下肢向前内侧迈出
  - B. 双膝内侧常互相摩擦碰撞
  - C. 足尖着地，呈剪刀步或交叉步
  - D. 身体摇晃不稳，如醉汉
56. 小儿腹泻引起代谢性酸中毒的原因为
- A. 腹泻丢失大量碱性物质
  - B. 因为热量摄入不足，使体内脂肪氧化增加，酮体生成增多
  - C. 血容量减少，组织缺氧，乳酸堆积
  - D. 呕吐，丢失大量胃液
57. 消化道大量出血时，血容量已补足的指征有
- A. 肛温与皮温回升
  - B. 尿量 $>20\text{ml/h}$
  - C. 中心静脉压恢复正常
  - D. 脉搏由快、弱转为正常、有力
58. 先天性斜颈的诊断依据有
- A. 双侧颈部是否对称
  - B. 双侧胸锁乳突肌内有无肿块
  - C. 婴儿头颈是否经常向一方向倾斜
  - D. 伴有面瘫
59. 单纯性肥胖症的主要并发症有
- A. 糖尿病
  - B. 冠心病
  - C. 高甘油三酯
  - D. 动脉粥样硬化

导

60. 有关儿童中度脱水的临床表现，正确的是

- A. 皮肤黏膜弹性差
- B. 眼窝明显凹陷
- C. 烦躁不安
- D. 眼泪少

## 第二部分 岗位专业知识应用能力

(以下两大题仅限报考中医临床岗位的考生作答)

### 三、案例分析题，30分。

患者男，80岁，间断性出现左胸部憋闷疼痛二十余年，经休息及口服硝酸甘油片可以缓解。近3个月来，发作频繁，程度加重。昨天气温骤降，猝然心痛如绞，心痛彻背，喘息不得卧，伴心悸、气短、形寒、面色苍白、手足不温，苔薄白，脉沉细或沉紧。

根据上述案例，回答下列问题：

1. 请对案例中的患者作出诊断，并指出该病的证型。

2. 此病证宜采取什么治法？治疗用药是什么？

### 四、实务题，30分。

患者男，58岁，发病急骤，神昏，牙关紧闭，口噤不开，半身不遂，肢体强痉，面赤身热，气粗口臭，躁扰不宁，舌苔黄腻，脉象弦滑而数。

根据上述材料提供的信息，回答下列问题：

1. 简答此患者的中医诊断、证型、治则、处方。

2. 简答中风病恢复期的治疗。

导

(以下两大题仅限报考西医临床岗位的考生作答)

### 三、案例分析题，30分。

陈某，女，40岁，G<sub>3</sub>P<sub>1</sub>。因月经量增多，经期延长3年，加重2个月入院。患者近3年来月经量增多，由原来每次月经用1包卫生巾增至2包，经期由原来的3~4/30天到现在的7~8/30天。白带不多，无痛经。曾在外院治疗，但效果不佳。近2个月月经量较前更多，要求治疗而收入院。起病以来食欲可，大、小便正常。既往体健，24岁结婚，2002年上环至今。体格检查：T37.1℃，P90次/分，R20次/分，BP98/68mmHg。睑结膜苍白，心、肺未发现异常，肝、脾未扪及，双肾无叩痛。妇科检查：外阴、阴道无异常；宫颈中度糜烂、肥大、质中等；子宫体前位，表面凹凸不平，增大如妊娠3个月大小，双附件未扪及肿块。实验室检查：Hb82g/L，WBC5.4×10<sup>9</sup>/L，N0.72，L0.28，PLT185×10<sup>9</sup>/L，出凝血时间正常。

根据上述案例，回答下列问题：

1. 该患者的诊断、鉴别诊断以及如何鉴别？

2. 该患者还需做哪些检查？

### 四、实务题,30分。

患者男，35岁。反复上腹痛3年，近2个月加重，常夜间痛，曾有黑便史。

根据上述材料提供的信息，回答下列问题：

1. 为明确诊断，应进行哪项检查？

2. 本例最可能的诊断是什么？应该采取哪种治疗方法？

导

(以下两大题仅限报考药剂岗位的考生作答)

### 三、案例分析题,30分。

患者男,66岁。1年来经常腰腿酸痛,关节红肿,时有头晕、耳鸣。2天前头痛、头晕、耳鸣加重,伴眩晕及行走不能,感觉呼吸急促,视物模糊,休息2天未见缓解来院就医。既往有风湿性关节炎,常服复方阿司匹林片。近1个月来,日用量在20片以上。体格检查:体温36.3℃,心率78次/分,呼吸22次/分,血压116/72mmHg。心电图示:肺型P波。诊断为水杨酸中毒,风湿性关节炎。停用复方阿司匹林片,静脉滴注碳酸氢钠12.5g/d治疗,口服布洛芬及吲哚美辛,治疗3日后症状明显减轻。神态清、头晕减轻、耳鸣消失、视物清。7日后治愈出院,无头晕。

根据上述案例,回答下列问题:

1. 患者视物模糊属于什么反应?产生这种反应的原因是什么?

2. 停用复方阿司匹林片,静脉滴注碳酸氢钠有什么意义?产生救治作用的机制是什么?

### 四、实务题,30分。

卡马西平单次口服给药,消除半衰期为25~65h,长期口服给药后,消除半衰期为12~17h。与香豆素类抗凝药合用可以降低抗凝作用,与红霉素合用本品的血药浓度升高。

根据上述材料提供的信息,回答下列问题:

1. 为什么卡马西平长期给药半衰期缩短?

2. 为什么与香豆素类抗凝药合用抗凝作用减弱?

导

(以下两大题仅限报考护理岗位的考生作答)

### 三、案例分析题，30分。

患者女，32岁。间歇性发热，纳差，体温37.6~39.2℃，伴腕、膝关节酸痛1月余。体检：头发稀少，口腔有溃疡灶；左膝及右腕关节局部红肿，压痛明显，但无畸形。实验室检查：尿蛋白(+)，血白细胞 $3.7 \times 10^9/L$ ，ALT60U/L，红细胞沉降率45mm/h，LE细胞(-)，抗Sm抗体(+)。

根据上述案例，回答下列问题：

1. 请分析该患者的护理诊断。

2. 请给出正确的护理措施。

### 四、实务题，30分。

患者女，36岁。急性淋巴细胞白血病。医嘱给予浓缩红细胞和血小板输注。在首先输注浓缩红细胞过程中，患者出现全身皮肤瘙痒伴颈部、前胸出现荨麻疹。

根据上述材料提供的信息，回答下列问题：

1. 首先考虑该患者出现了什么反应？

2. 针对上述患者发生的情况，护士应该首先采取什么处理措施？

(以下两大题仅限报考医学技术岗位的考生作答)

### 三、案例分析题，30分。

患者男，50岁，5年来间断性上腹痛，近来疼痛加重，2日前出现呕血、黑便而入院。



导

治疗。经询问病史知患者 5 年前开始出现不明显原因的上腹胀痛，以餐后 1 小时明显，持续 1~2 小时后自行缓解，近来加重。2 日前出现上腹胀、恶心、头晕，解黑便 3 次，并呕吐咖啡色液体 1 次，约 160ml。此后出现心悸、头晕。发病来体重略下降。既往无手术、外伤和药物过敏史，也无烟酒嗜好。查体：T36.7℃，P106 次/分，R22 次/分，BP94/76mmHg，神清，面色苍白，四肢湿冷，无出血点和蜘蛛痣，全身浅表淋巴结不大，巩膜无黄染，心肺无异常。下腹平软，未见腹壁静脉曲张，上腹有轻压痛，无肌紧张、反跳痛，全腹未触及包块，肝脾未及，腹水征（一肠鸣音 11 次/分，双下肢无水肿。实验室检查：RBC $2.7 \times 10^{12}/L$ ，Hb87g/L，WBC $6.3 \times 10^9/L$ 。分类 N74%，L23%，M5%，PLT $280 \times 10^9/L$ ，大便隐血试验呈强阳性。

根据上述案例，回答下列问题：

1. 请做出初步诊断并简述其诊断依据。

2. 为明确诊断，应进一步做哪些检查？

#### 四、实务题，30 分。

患者男，26 岁，体检发现纵隔肿块 2 个月，无症状，CT 检查见下图。



图 A、B 依次为同层面平扫及增强扫描，图 C 为冠状位增强扫描

根据上述材料提供的信息，回答下列问题：

1. 请写出诊断及诊断依据。

2. 请写出鉴别诊断。

导

(以下两大题仅限报考公共卫生管理岗位的考生作答)

### 三、案例分析题，30分。

患者男，80岁。因左侧肢体偏瘫入院，经检查由脑血栓所致，病情稳定，医嘱二级护理。次日凌晨时，患者坠床，造成颅内出血，虽经全力抢救，终因伤势过重死亡。

根据上述案例，回答下列问题：

1. 造成该事件的主要原因是什么

2. 根据对患者造成的伤害程度，该事故属于几级医疗事故

### 四、实务题，30分。

某县卫生防疫站接到县医院报告，该县医院自12时至晚上，先后收治发热、腹痛、呕吐、腹泻患者26人，患者均来自该地一建筑工地外来雇佣的民工，经询问病史得知，患者曾均在同一地点就餐。

根据上述材料提供的信息，回答下列问题：

1. 患者出现了什么问题？

2. 请简述该问题的流行病学特点。