

## 护士资格考试历年重复考点



关注华图卓坤公众号

了解最新考试动态



下载《卫人机考》APP

即刻刷题备考

1. 正常人肺部的叩诊音（清音）
2. 左心衰竭的特征性体征（交替脉）
3. 一种深而规则的大呼吸（深度呼吸又称库斯莫呼吸）
4. 深昏迷、浅昏迷主要区别（角膜反射和防御反射是否存在）
5. 皮肤异常干燥见于（脱水）
6. 面容枯槁、面色苍白或铅灰、表情淡漠、眼眶凹陷称为（危重面容）
7. 哪种心脏疾病一般无杵状指（慢性风湿性心脏病）
8. 心绞痛的哪一点与急性心肌梗死不同（心电图未见病理性 Q 波）
9. 肠鸣音亢进见于（急性肠炎）
11. 腹部出现移动性浊音提示有（腹水）
12. 胸骨右缘第二肋间处为哪个瓣膜听诊区（主动脉瓣第一听诊区）
13. 最能提示壁层腹膜有炎症的提征是（腹部反跳痛）
14. 为减轻腹膜炎引起的胸痛应采取什么卧位（患侧卧位）
15. 淋巴细胞增多多见于（病毒性感染）
16. 中性粒细胞增多多见于（急性感染）
17. 最能反映贫血的实验室指标为（血红蛋白定量）
18. 心电图连接时，红色导联线应连接（右上肢）
19. 阑尾周围脓肿消退后做阑尾切除术的最佳时间为（三个月后手术切除）
20. 典型心绞痛，如舌下含化硝酸甘油，1~2 分钟开始起效，作用持续 30 分钟左右
21. 可作为肿瘤定性的诊断是（病理检查）
22. 关于癌症特征不正确的是（早期疼痛）
23. 冬眠疗法护理（先停物理降温，再逐渐停用冬眠药物，任其自然复温）
24. 高渗性脱水早期主要表现（口渴）
25. 休克病人的体位（中凹卧位）
26. 动脉粥样硬化导致器官病变最常见的是（冠状动脉）
27. 缺血性心脏病最常见的病因是（冠状动脉粥样硬化）
28. 软组织急性化脓性感染时，在出现波动前，应早期切开引流的是（脓性指头炎）

29. 抢救伤员应首先处理（窒息）
30. 基础代谢率为（脉压+脉率-111）
31. 急性乳腺炎的主要病因是（乳汁淤积）
32. 腹外疝的发病基础是（腹壁有先天性或后天性薄弱破损）
33. 急性心肌梗死合并急性病态窦房结综合征常见原因是（右冠状动脉病变）
34. 胃癌最多发生于（胃窦部）
35. 门腔静脉吻合术首要目的（降低门静脉压力）
36. 外科急腹症特点（一般先有腹痛，后出现发热等伴随症状）
37. 正常骨盆出口平面的横径（9cm）
38. 妊娠合并心脏病的孕妇最易发生心衰的时间（32~34周）
39. 孕妇自数胎动（早中晚各数1小时，3个小时胎动之和乘以4，大于30次为正常）
40. 不孕症妇女了解有无排卵的方法（基础体温测定）
41. 急性心肌梗死早期（24小时内）死亡主要原因是（心律失常）
42. 胎儿娩出多长时间，胎盘尚未娩出者，称胎盘滞留（30分钟）
43. 目前诊断子宫内膜异位症的最佳方法（腹腔镜检查）
44. 妊娠满28周而不满37周终止者称（早产）
45. 与急性肾炎发病有关的细菌（链球菌）
46. 引起急性前间壁心肌梗死闭塞的冠状动脉分支是（左冠状动脉前降支）
47. 左冠状动脉回旋支阻塞引起的心肌梗死部位是（高侧壁），发作的典型部位是（胸骨体中段或上段）
48. 急产是指总产程在（3小时内）
49. 咯血伴脓痰见于（支气管扩张）
50. 口服毒物患者洗胃时，每次洗胃液体量为（300~500ml）
51. 严重的哮喘发作持续（24小时以上），经治疗不易缓解者，称之为哮喘持续状态
52. 呼气性呼吸困难见于（支气管哮喘）
53. 慢性阻塞性肺气肿最有价值的检查是（胸部X线）
54. 成人脉压增大可见于（主动脉瓣关闭不全、动脉硬化等病人）

55. 呼吸中带有刺激性大蒜味的现象见于（有机磷农药中毒）
56. 脉压减小可见于（心包积液、缩窄性心包炎、主动脉瓣狭窄等病人）
57. 重度哮喘发作缓解期首选的治疗药物是（糖皮质激素）
58. 成年男性正常血红蛋白参考值范围（120~160g/L）
59. 引起大叶性肺炎最常见的病原菌是（肺炎链球菌）
60. 尿蛋白定量标本瓶中的防腐剂是（每 100ml 尿液加甲苯 0.5ml）
61. 尿液呈酱油色见于（急性溶血）
62. 风湿病增生期最具有特征性的病理变化是（风湿小体形成）
63. 关于肿瘤的恶性程度，正确的是：小细胞癌（未分化小细胞癌）恶性程度高，生长快，较早出现淋巴和血行转移，对放射和化学药物治疗较敏感。
64. 各种类型休克基本病理变化（有效循环血量锐减）
65. 为预防急性肾衰竭，哪种外伤病人，应从静脉输入碱性溶液以碱化尿液（大腿挤压伤）
66. 心脏骤停后最容易发生的继发性病理变化是（脑缺氧和脑水肿）
67. 机体调节酸碱平衡最迅速的一条途径是（血液缓冲系统）
68. 哪项脏器损伤，临床表现以腹膜炎为主（肠）
69. 原发性腹膜炎与继发性腹膜炎的主要区别（腹腔有无原发性病灶）
70. 溃疡病穿孔，非手术治疗期间，哪项护理措施最重要（胃肠减压）
71. 十二指肠溃疡好发于（十二指肠球部）
72. 急性阑尾炎腹痛起始于脐周或上腹的机制（躯体神经反射）
73. 腹膜炎引起肠梗阻属于（麻痹性肠梗阻）
74. 门静脉高压症可引起哪种疾病（痔）
75. 对急腹症病人最应重视的问题（潜在并发症休克）
76. 治疗骨折最常用的方法（外固定与手法复位）
77. 关节脱位的特征性表现（畸形、弹性固定、关节盂空虚）
78. 高位肠梗阻除腹痛外最主要症状（频繁呕吐）
79. 三个月小儿动作行为发育（直立时能抬头）
80. 婴幼儿病理性哭闹多见于（腹痛、头痛）
81. 新生儿可从母体获得，3~5 个月逐渐消失的抗体是（IgG）

82. 化脓性炎症灶内最多见的炎细胞是（中性粒细胞）
83. 急性心肌梗死频发室性期前收缩首选（利多卡因）
84. 长期单纯以羊乳喂养小儿易发生的贫血是（营养性巨幼细胞贫血）
85. 鹅口疮常用清洗口腔的药液是（2%碳酸氢钠溶液）
86. 新生儿颅内出血典型症状（先表现兴奋后出现抑制）
87. 某再生障碍性贫血病人，出现高热，伴抽搐，此时，最合适的降温措施是（头部及大血管处放置冰袋）
88. 某孕妇，第1胎，妊娠39周来院检查，医生告之临产先兆，收住院，最可靠的依据是（见红）
89. 患儿，1岁，因室间隔缺损入院，突然出现烦躁不安、青紫。体检：神志清，两肺底有少许湿啰音，心率180次/分，肝脏在肋下3.5cm，该患儿可能合并（心力衰竭）
90. 酮症酸中毒患者经治疗后，意识恢复时间内，突然感到心悸、饥饿、出汗，随即又意识不清，应立即（静脉注射50%葡萄糖）
91. 患者48岁，月经紊乱近一年，经量时多时少，周期无规律，此次2个月末来潮后出血，近半个月，查，子宫正常大小，软，诊断为无排卵型功血，首选的止血方法是（刮宫术）
92. 35岁，女性，风湿性心脏病心力衰竭患者，应用洋地黄和利尿剂后，出现恶心、呕吐，心电图示室性早搏呈二联律及三联律应（立即停用洋地黄）
93. 出口前后径（平均值约为11.5cm）
94. 出口横径（平均值约为9cm）
95. 出口前矢状径（平均值约为6cm）
96. 出口后矢状径（平均值约为8.5cm）
97. 阵发性室上性心动过速选用（维拉帕米）
98. 铜绿假单胞菌感染是脓液呈（淡绿色）
99. 胃大部切除术后应采取（低半卧位）
100. 颅脑手术后应采取（卧于健侧或平卧）
101. 最容易发生嵌顿的腹外疝是（股疝）
102. 最常见的腹外疝是（腹股沟斜疝）

103. 氰化物中毒用（口服 3%过氧化氢溶液后引吐，1:15000~1:20000 高锰酸钾洗胃）
104. 敌百虫中毒，禁用（碱性药物洗胃）
105. 巴比妥类药物中毒，采用（硫酸钠导泻，1:15000~1:20000 高锰酸钾洗胃）
106. 强酸、强碱中毒用作保护剂的物质是（蛋清水）
107. 慢性阻塞性肺气肿病人痰液黏稠，多饮水是为了（促进痰液稀释而容易排出）
108. 急性白血病化疗病人多饮水的目的是（防止尿酸性肾病）
109. 肾盂肾炎病人多饮水可以（加速细菌、毒素及炎性分泌物排出）
110. 甲状腺功能亢进症病人多饮水（补充出汗等所丢失的水分）
111. 胃破裂可出现（膈下游离气体）
112. 盆腔脓肿常伴有（里急后重）
113. 痰中带血主要见于（支气管扩张、肺结核、肺炎、肺癌）
114. 肝性脑病患者禁用（肥皂水灌肠）
115. 术前消化道准备的目的是（防止麻醉及手术时呕吐、减轻术后腹胀、保持消化道内清洁）
116. （上消化道出血）是肝硬化最常见的并发症，多突然发生大量呕血或黑便，常引起出血性休克、诱发肝性脑病。
117. 外科急腹症的护理诊断有（焦虑或恐惧、腹痛、体液不足、有感染的危险等）
118. 骨折特有的临床表现是（畸形、反常活动、骨擦音或骨擦感）
119. 胃手术后主要的护理诊断有（自我形象紊乱、疼痛、活动无耐力、潜在并发症、感染）
120. 法洛四联症患儿喜蹲踞，是因为（使右向左分流减少，缺氧症状暂时得到缓解）
121. 化脓性脑膜炎最可靠的诊断标准依据是（脑脊液中检出化脓性细菌）
122. 红细胞和血红蛋白量均增高的心脏病有（慢性肺源性心脏病）
123. 输入库存血（输入库存血 1000ml 以上时，必须按医嘱注射 10%葡萄糖酸钙或氯化钙 10ml）
124. 1 型糖尿病典型症状为（多尿、多饮、多食和体重下降）
125. 先天性心脏病按病理生理分三类，属于右向左分流的先心病是（法洛四联症）

126. 肺结核大咯血最危险的并发症是（窒息）
127. 支气管哮喘急性发作首选（ $\beta_2$ 受体激动药）
128. 鉴别诊断输卵管妊娠流产与黄体破裂（测血中 hCG）
129. （妊娠 32~34 周、分娩期及产后的最初 3 天内），是患有心脏病的孕妇最危险的时期
130. 有机磷农药中毒瞳孔变化（双侧瞳孔缩小）
131. 少尿是指（24h 尿量少于 400ml 或每小时尿量少于 17ml）
132. 一般妇科检查时采取的体位是（截石位）
133. 宫颈阴道部为（鳞状上皮细胞），它们具有较强的抗感染能力
134. 慢性宫颈炎以（白带增多）为主要症状
135. 乳腺癌淋巴结转移多见于（同侧腋窝），开始为少数散在的淋巴结增大，质硬，无压痛，尚可推动
136. 较大的子宫肌壁间肌瘤合并妊娠，出现发热伴腹痛。检查肌瘤迅速增大。应想到是肌瘤发生（红色变）
137. 大的子宫肌瘤最常见的症状是（月经过多，经期延长）
139. 为确诊子宫内膜不规则脱落的诊断，诊刮的恰当时间为（月经第 5~6 日诊刮）
140. 黄体功能不足的药物替代疗法可用（孕激素）
141. （分段诊断性刮宫）是诊断子宫内膜癌最可靠的方法。
142. 诊断性刮宫刮出豆腐渣样的组织，应高度怀疑（子宫内膜癌）
143. II 型呼吸衰竭： $\text{PaCO}_2$  升高，同时有  $\text{PaO}_2$  下降。动脉血气分析为（ $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$  和  $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$ ）
144. 治疗支气管肺炎抗生素应持续用至（体温正常后 5~7 天）
145. 肾病综合征诊断标准中（24 小时尿蛋白定量测定  $> 3.5\text{g}$ ）
146. 营养性缺铁性贫血选用治疗最恰当的是（硫酸亚铁加维生素 C）
147. 非重型再障首选药物（雄激素）
148. 2~12 岁可按下列公式推算（ $\text{身高}(\text{cm}) = \text{年龄}(\text{岁}) \times 7 + 75(\text{cm})$ ）
149. 早产儿病理性黄疸，黄疸持续时间是（ $> 4$  周）
150. 先心病最常见的类型是（室间隔缺损）

