

## 一、小儿原发型肺结核的临床表现。

### 【答题要点】

小儿原发型肺结核是原发性结核病中最常见者，为结核分枝杆菌初次侵入肺部后发生的原发感染，是小儿肺结核的主要类型。

下面我将从症状、体征和辅助检查的结果三个方面对它的临床表现进行阐述：

第一方面：症状。

症状轻重不一。轻者可无症状，一般起病缓慢，可有低热、盗汗等结核中毒症状，多见于年龄较大儿童。婴幼儿及症状较重者可急性起病，高热可达到 39~40℃，但一般情况尚好。婴儿可表现为体重不增或生长发育障碍。

第二方面：体格检查可见周围淋巴结不同程度肿大。

第三方面：辅助检查方面。

X线胸片检查，往往会发现原发综合征的表现。

## 二、阑尾炎的临床表现。

### 【答题要点】

阑尾炎临床表现非常典型，并且需要尽早处理，从症状、体征和并发症三个方向对阑尾炎的临床表现进行阐述。

第一个方面：症状。

(1) 阑尾炎主要症状为腹痛，典型的腹痛发作始于上腹，逐渐移向脐部，数小时后转移并局限在右下腹。

(2) 同时可出现胃肠道症状：包括厌食、恶心、呕吐、腹泻等。

(3) 患者也可出现体温升高、心率增快、乏力等表现。

第二个方面：体征。

(1) 患者可出现右下腹压痛，压痛点通常位于麦氏点。

(2) 患者可出现反跳痛、腹肌紧张等腹膜刺激征象。提示阑尾炎出现化脓、坏疽或穿孔等病理改变。

(3) 如体检发现右下腹饱满，扪及一压痛性肿块，边界不清、固定，应考虑阑尾周围脓肿的诊断。

(4) 患者可出现结肠充气试验、腰大肌试验、闭孔内肌试验阳性。

第三个方面：并发症。

(1) 阑尾炎并发腹腔脓肿可出现腹胀、压痛性肿块、全身感染中毒症状。

(2) 阑尾炎并发化脓性门静脉炎可出现寒战、高热、肝大、轻度黄疸等。

### 三、妊高症治疗中，硫酸镁的用药指征和注意事项是什么。

#### 【答题要点】

硫酸镁是治疗妊高症的首选用药，也是重度子痫前期预防子痫发作的预防用药。

**第一：硫酸镁用药指征有以下几点：**

- ①控制子痫抽搐及防止再抽搐；
- ②预防重度子痫前期发展为子痫；
- ③子痫前期临产前用药预防抽搐。

**第二：硫酸在使用时应注意以下几点：**

血清镁离子有效浓度为 1.8~3.0mmol/L，超过 3.5mmol/L 可出现中毒症状。

使用硫酸镁前以下条件必须具备：

- ①膝腱反射存在；
- ②呼吸 $\geq 16$ 次/分钟；
- ③尿量 $\geq 17\text{ml/h}$  或 $\geq 400\text{ml/24h}$ ；
- ④备有 10%葡萄糖酸钙。镁离子中毒时停用硫酸镁并缓慢静推(5~10分钟)

10%葡萄糖酸钙 10ml。

以上是我对硫酸镁的用药指征和注意事项的阐述。