

2017 年鄂尔多斯市 中心医院护理岗 (真题+解析)

更多考务考情欢迎咨询



鄂尔多斯市中心医院公开招聘工作人员 护理真题

考试 120 分钟，满分 100 分

一、单选题（共 81 题）

1. 下列不属于代谢性酸中毒原因的是

- A. 体内酸产生的过多
- B. 碱丢失过多
- C. 高血钾
- D. 肾脏排酸功能障碍

2. 中心静脉压的正常值是

- A. $5\sim 12\text{cmH}_2\text{O}$
- B. $10\sim 15\text{cmH}_2\text{O}$
- C. $15\sim 20\text{cmH}_2\text{O}$
- D. $10\sim 12\text{cmH}_2\text{O}$

3. 第一所护士学校是在哪一年哪一个国家成立的

- A. 1850 年 法国
- B. 1860 年 英国
- C. 1878 年 英国
- D. 1888 年 美国

4. 因抢救未及时书写病例，需要在多长时间内补齐病例，并备注补齐时间等。

- A. 4 小时
- B. 6 小时
- C. 8 小时
- D. 10 小时

5. 检查痰液中癌细胞，固定标本的溶液宜选什么溶液

- A. 10% 甲醛
- B. 浓盐酸
- C. 75% 乙醇
- D. 40% 甲醇

6. 抢救青霉素过敏的首选药

- A. 去甲肾上腺素
- B. 盐酸肾上腺素
- C. 异丙肾上腺素
- D. 氢化可的松

7. 成人胃管插入的深度

- A. 40~45cm B. 45~55cm C. 43~50cm D. 50~55cm

8. 休克患者应取的卧位

- A. 去枕仰卧位 B. 中凹卧位
C. 头高足低位 D. 半坐卧位

9. 昏迷患者做口腔护理时不需要准备的物品是

- A. 压舌板 B. 漱口液 C. 开口器 D. 棉球

10. 吸痰时间一般不能超过

- A. 5s B. 10s C. 15s D. 20s

11. TAT 皮试液每 0.1ml 中含有

- A. 5U B. 15U C. 150U D. 200U

12. 某患者臀部出现了 $2 \times 2\text{cm}$ 的溃疡面，表面有黄色渗出物及水疱，该病人属于压疮的哪一期

- A. 淤血红润期 B. 炎性浸润期
C. 浅度溃疡期 D. 深度溃疡期

13. 中等量咯血是指咯血量在以下哪个范围

- A. 100~300 B. 200~300 C. 200~500 D. 300~500

14. 成人脉率的正常范围是

- A. 20~40 B. 40~60 C. 60~100 D. 80~100

15. 成人少尿的标准是 24 小时尿量小于

- A. 200ml B. 400ml C. 600ml D. 800ml

16. 患者在输液过程中出现静脉痉挛，护士应该给予的护理措施是

- A. 停止输液 B. 加快输液 C. 输液侧肢体保暖 D. 抬高液体的高度

17. 既能够杀灭细菌又能够杀灭芽孢的方法是

- A. 消毒 B. 灭菌 C. 清洁 D. 防腐

18. 缺

19. 鼻饲患者每次注入的液体量不能超过

- A. 200ml B. 300ml C. 400ml D. 500ml

20. 以下激素不是垂体分泌的是

- A. 促甲状腺激素 B. 促肾上腺皮质激素 C. 催乳素 D. 雌激素

21. 成人心肺复苏时，正确的按压通气比是

- A. 10：2 B. 20：2 C. 30：2 D. 40：2

22. 以下疾病是由维生素 A 缺乏引起的是

- A. 免疫力低下 B. 脚气病 C. 夜盲症 D. 骨质疏松

23. 护士在临床工作中，已经配置好的溶液，放置的时间不能超过

- A. 2 小时 B. 3 小时 C. 4 小时 D. 5 小时

24. 胃溃疡疼痛的特点

- A. 疼痛-缓解-进食 B. 疼痛-进食-缓解
C. 进食-疼痛-缓解 D. 进食-缓解-疼痛

25. 缺

26. 上消化道出血患者大便的颜色是

- A. 柏油样便 B. 黑便 C. 鲜红色便 D. 暗红色便

27. 成人正常呼吸频率是

- A. 12~16 次/分 B. 16~20 次/分 C. 20~24 次/分 D. 18~22 次/分

28. 哮喘持续状态是指患者持续多少小时仍未缓解

- A. 12 小时 B. 24 小时 C. 18 小时 D. 48 小时

29. 上消化道出血伴休克的首要护理措施

- A. 去枕平卧头偏一侧 B. 建立静脉通道
C. 立即给予止血药物 D. 准备急救用品及药物

30. 幼儿期是指

- A. 0~1 岁 B. 1~3 岁 C. 1~5 岁 D. 2~4 岁

31. 脑室引流首要的护理措施

- A. 严密观察患者生命体征 B. 预防感染，严格执行无菌操作
C. 观察引流液的颜色、量、性质 D. 保持引流管通畅

32. 以下属于特异性感染的是

- A. 肺结核 B. 急性胰腺炎 C. 脓毒血症 D. 丹毒

33. 分娩时的主要产力是

- A. 子宫收缩力 B. 肛提肌收缩力 C. 膈肌收缩力 D. 腹肌收缩力

34. 护士给药原则中最重要的是

- A. 遵医嘱给药 B. 给药途径准确
C. 给药时间准确 D. 注意药物不良反应

35. 护士给患者补钾每日不可超过

- A. 4g B. 6g C. 8g D. 10g

36. 空气栓塞时，护士应给与患者的卧位是

- A. 俯卧位
- B. 头低足高左侧卧位
- C. 端坐位，双腿下垂
- D. 右侧卧位，头低足高

37. 缺

38. 皮内注射的角度是

- A. 5°
- B. $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$
- C. 30°
- D. 45°

39. 某患者需要输入 2000ml 药液，在 10 小时内输完，则患者每分钟滴数为

- A. 40
- B. 50
- C. 60
- D. 70

40. 缺

41. 护士在操作过程中被锐器扎伤，以下处理正确的是

- A. 由近心端向远心端挤压
- B. 局部挤压
- C. 按压
- D. 无需处理

42. 医院感染主要的感染源是

- A. 探访者
- B. 医护人员
- C. 病人
- D. 护工

43. 下列属于高效消毒剂的是

- A. 碘伏
- B. 过氧化氢
- C. 乙醇
- D. 碘酊

44. 急性肾功能衰竭患者少尿无尿期死亡的主要原因是

- A. 低钙血症
- B. 低钠血症
- C. 高钾血症
- D. 低钾血症

45. 血袋使用后需要保持多少小时

A. 12 小时 B. 24 小时 C. 18 小时 D. 48 小时

46. 健胃药服用的时间是

A. 饭前 B. 饭后 C. 睡前 D. 空腹

47. 腕关节损伤后 3 小时入院，护士应该给与

A. 热敷 B. 冷敷 C. 冷热交替 D. 关节复位固定

48. 肾结核患者尿沉渣离心沉淀后可见到的红细胞数一般大于

A. 2 B. 5 C. 8 D. 3

49. 可用于真菌感染的漱口水是

A. 复方硼酸溶液 B. 1%~4%碳酸氢钠溶液
C. 0.02%洗必泰 D. 1%~3%过氧化氢溶液

50. 女患者导尿插入的深度是

A. 4~6cm B. 8~10cm C. 18~22cm D. 7~10cm

51. 上肢血压测量需与肱动脉平齐，坐位时主要位于第几肋间

A. 第 4 肋间 B. 第 5 肋间 C. 第 6 肋间 D. 第 7 肋间

52. 缺

53. 患者日常活动既需要人的帮助，也需要器材设备辅助，则该患者的机体活动功能分级为

A. 1 级 B. 2 级 C. 3 级 D. 4 级

54. 以下关于高热病人饮食的说法，正确的是

A. 高盐饮食 B. 高蛋白 C. 少喝水 D. 高脂饮食

55. 病房最适宜的湿度为

- A. 35%~45% B. 40%~50% C. 50%~60% D. 60%~70%

56. 以下对于破伤风患者的护理措施，正确的是

- A. 充足的光照 B. 床挡防护
C. 抽搐时立即按压 D. 增加家属探视

57. 内服药使用的标签是

- A. 蓝色 B. 红色 C. 黑色 D. 黄色

58. 缺

59. 脑出血最常见的病因是

- A. 动脉粥样硬化 B. 先天性动脉瘤破裂 C. 房颤 D. 高血压伴有动脉粥样硬化

60. 为老年人及昏迷患者使用热水袋时，温度不超过

- A. 40℃ B. 50℃ C. 60℃ D. 70℃

61. 住院病人头发不好梳理时，护士应该蘸取以下哪种溶液进行梳理

- A. 20%乙醇 B. 30%乙醇 C. 40%乙醇 D. 50%乙醇

62. 肾结核患者最早的临床表现是

- A. 血尿 B. 尿频 C. 发热 D. 贫血

63. 缺

64. 护士职业素养培养的关键是

- A. 道德素养 B. 专业素养 C. 礼仪素养 D. 素质素养

65. 静脉输液时消毒的范围是

- A. 5cm B. 6cm C. 7cm D. 8cm

66. 下肢深静脉血栓最严重的并发症是

- A. 下肢溃疡
- B. 动脉痉挛、肢体缺血
- C. 肺栓塞
- D. 下肢浅静脉曲张

67. 下列关于手术消毒说法错误的是

- A. 在手术切口范围 15~20 厘米处开始消毒
- B. 以切口为中心进行环形消毒
- C. 污染过的棉球不可以进行回擦
- D. 消毒肛门会阴时及污染的切口时，应当由肛门会阴及污染的切口向外擦拭

68. 预后最不好的肺结核类型是

- A. 浸润型肺结核
- B. 原发型肺结核
- C. 血源播散型肺结核
- D. 慢性纤维空洞型肺结核

69. 断指保存的温度是

- A. -8℃
- B. 0℃
- C. 4℃
- D. 8℃

70. 妊娠的患者不宜口服下列哪种药物

- A. 青霉素
- B. 四环素
- C. 磷霉素
- D. 头孢菌素

71. 阑尾炎最典型的疼痛表现是

- A. 右下腹转移性疼痛
- B. 腹痛
- C. 压痛
- D. 发热

72. 心绞痛主要的表现是

- A. 心前区疼痛
- B. 发热
- C. 疼痛
- D. 心律失常

73. 生命体征测量包括

- A. 体温、呼吸、血压、脉搏
- B. 体温、呼吸、血压
- C. 体温、呼吸、脉搏
- D. 体温、血压、脉搏

74. 梦游主要发生于哪个年龄段

- A. 幼儿期 B. 婴儿期 C. 学龄前期 D. 学龄期

75. 缺

76. 成人缺铁性贫血的重要原因是

- A. 铁丢失过多 B. 铁摄入不足 C. 铁需求增加 D. 慢性失血

77. 缺

78. 某患者从高处坠落，最适宜的搬运患者的方法是

- A. 一人搬运 B. 二人搬运 C. 三人搬运 D. 四人搬运

79. 缺

80. 缺

81. 呕血病人应当给与哪种饮食

- A. 暂时禁食 B. 半流质饮食 C. 软质饮食 D. 普通饮食

二、多选题（共 10 题）

82. 呼吸困难出现三凹征包括

- A. 锁骨上窝 B. 胸骨上窝 C. 锁骨下窝 D. 肋间隙

83. 下列患者不适宜进行灌肠的是

- A. 妊娠 B. 急腹症 C. 消化道出血 D. 肺炎

84. 输血应该查对的是

- A. 床号 B. 姓名 C. 血量 D. 医嘱

85. 门静脉高压的表现有

- A. 脾大 B. 肝硬化 C. 静脉侧支循环 D. 腹水

86. 缺

87. 下列属于肺癌病因的是

- A. 腌制食品 B. 化学物质 C. 空气污染 D. 吸烟

88. 下列属于急性胰腺炎病因的是

- A. 暴饮暴食 B. 吸烟 C. 胆道疾病 D. 过量饮酒

89. 医院饮食包括

- A. 试验饮食 B. 基本饮食 C. 软质饮食 D. 治疗饮食

90. 常见的输液反应是

- A. 发热反应 B. 循环负荷过重 C. 静脉炎 D. 空气栓塞

91. 缺

92. 护理任务包括

- A. 保持健康 B. 治疗疾病 C. 恢复健康 D. 减轻痛苦

三、判断题（共8题，每题1分）

93. 高热病人容易发生口腔溃疡。（）

94. 输液速度过快容易引起肺水肿。（）

95. 缺

96. 紫外线容易引起皮肤癌症。（）

97. 传染病病房的患者可以与其他病房患者互串交流。（）

98. 病人在入院 12 小时后发生的感染称为院内感染。（）

99. 缺

100. 缺

101. 宫颈炎主要的症状是接触性出血。()

102. 由于胆内含脂肪酶，所以胆汁促进脂肪的消化和吸收。()

103. 肾衰竭可以分为急性、慢性肾衰。()

104. 心绞痛是因为主动脉一过性缺血而引起的一系列症状 ()

105. 血小板减少性紫癜一般都需要抗过敏，抗感染治疗。()

106. 年龄小的患者骨折愈合好，相反年龄大的骨折愈合晚。()

107. 肝脏病人应指导患者高蛋白饮食。()

鄂尔多斯市中心医院公开招聘工作人员 护理答案

一、单选题（共 81 题）

1. 【答案】c

【解析】代谢性酸中毒的主要原因有：①碱性物质丢失过多，如腹泻、各种消化道瘘等；②酸性物质过多，如休克致急性循环衰竭、组织缺氧、乳酸大量产生，糖尿病时产生酮体过多，氯化铵、精氨酸输入过多等；③肾功能不全，内生的 H^+ 不能排出体外， HCO_3^- 吸收减少。

【答案】A

【解析】正常中心静脉压值 $5\sim 12\text{cmH}_2\text{O}$ 。

3. 【答案】B

【解析】第一所护士学校是在 1860 年英国成立的。

4. 【答案】B

【解析】医疗文件具有法律效力，因抢救病人未能及时书写时，应在抢救结束后 6h 内据实补记。

5. 【答案】A

【解析】检查痰液中癌细胞，固定标本的溶液可以选择 95%乙醇或者 10%甲醛溶液。

6. 【答案】B

【解析】皮下注射 0.1%盐酸肾上腺素 0.5~1ml，症状不缓解可以遵照医嘱间隔 30min 重复使用或静脉注射 0.5ml，直至脱离危险。此药可收缩血管、增加外周阻力、兴奋心肌、增加心排出量、松弛支气管平滑肌，是抢救过敏性休克的首选药物。

7. 【答案】B

【解析】插入长度的测量方法：①患者前额发际至胸骨剑突的长度；②患者鼻尖至耳垂再至剑突。成人置入深度：45~55cm。

8. 【答案】B

【解析】中凹卧位也称休克卧位，是指病人头胸抬高 $10\sim 20^\circ$ ，下肢抬高 $20\sim 30^\circ$ 。主要适用于休克患者，抬高头胸部，保持气道通畅，有利于通气，改善缺氧症状；抬高下肢，有利于静脉血回流，增加回心血量。

9. 【答案】B

【解析】昏迷病人禁忌漱口，因此无需准备漱口液，需用开口器从臼齿处放入。

10. 【答案】c

【解析】每次吸痰时间应：小于 15 秒。

11. 【答案】B

【解析】常用皮试液浓度

皮试液名称	每 1 毫升含量	每 0.1 毫升含量
青霉素	200U~500U	20U~50U
链霉素	2500U	250U
破伤风抗毒素	150U	15U
0.25%普鲁卡因	2.5mg	0.25mg
细胞色素 c	0.75mg	0.075mg

12. 【答案】B

【解析】压疮的分期及护理

分期	临床表现	护理
淤血红润期	局部皮肤受压或受潮湿刺激后，出现红、肿、热、麻木或触痛，有的无肿热反应。	此期应采取积极措施，防止局部继续受压，使之悬空，避免摩擦潮湿等刺激，保持局部干燥，增加翻身次数。
炎性浸润期	如果红肿部位继续受压，血液循环得不到改善，受压表面皮色转为紫红，皮肤因水肿变薄而出现水疱，此时极易破溃，显露出潮湿红润的创面。	护理重点是保护皮肤，避免感染。除继续加强上述措施外，对未破的小水疱应减少摩擦，防感染，让其自行吸收；大水疱用无菌注射器抽出水疱内液体（不剪表面）后，表面涂以 2%碘酒或用红外线照射，每次 15 分钟，保持创面干燥。

浅度溃疡期	浅层组织感染，脓液流出，溃疡形成。	此时应清洁创面，祛腐生新，促其愈合，根据伤口情况给予相应处理。
深度溃疡期	坏死组织发黑，脓性分泌物增多，有臭味。感染向周围及深部扩展，可达骨骼，甚至引起败血症。	外科手术。

13. 【答案】A

【解析】咯血量少时仅为痰中带血。将1次咯血量小于100ml定为小量咯血；在100~300ml为中量咯血；1次咯血量大于300ml或24小时内咯血量超过500ml为大量咯血。还可有出血部位呼吸音的减弱和湿啰音。大咯血患者常有紧张不安、血压下降等表现。

14. 【答案】C

【解析】成人脉率的正常范围是60~100。

15. 【答案】B

【解析】多尿：24小时尿量超过2500ml；少尿：24小时尿量少于400ml或每小时尿量少于17ml；无尿或尿闭：24小时尿量少于100ml或12小时内无尿。

16. 【答案】C

【解析】静脉输液时发生静脉痉挛应当采取的措施是药液自然回温或静脉周围局部热敷。

17. 【答案】B

【解析】灭菌是指用物理、化学或生物方法，清除或杀灭环境中传播媒介上的一切微生物，包括致病微生物和非致病微生物，包括细菌芽孢和真菌孢子。

18.

19. 【答案】A

【解析】鼻饲前抽吸胃液，不超过 150ml；每次鼻饲量不超过 200ml，间隔不少于 2 小时；鼻饲液的温度：38~42℃。

20. 【答案】D

【解析】卵巢激素的生理功能卵巢主要合成及分泌的激素有雌激素、孕激素和少量雄激素。

【答案】C

【解析】成人心肺复苏时，按压通气比应该是 30：2。

22. 【答案】C

【解析】缺乏维生素 A 容易得夜盲症、皮肤粗糙；缺乏维生素 B1 可得神经炎、脚气病；缺乏维生素 C 可得坏血病、抵抗力下降，牙龈出血等病；缺乏维生素 D，儿童可得佝偻病，成人可得骨质疏松症等。

23. 【答案】A

【解析】护士在临床工作中，已经配置好的溶液，放置的时间不能超过 2 小时。

24. 【答案】C

【解析】胃溃疡、十二指肠溃疡的疼痛比较

	胃溃疡	十二指肠溃疡
机制	保护因素减弱	侵袭因素减弱
疼痛性质	烧灼或痉挛感	钝痛、灼痛、胀痛或剧痛，也可仅饥饿样不适感
疼痛发作时间	进食后 30~60 分钟疼痛	下次餐前，午夜至凌晨 3 点常痛醒
一般规律	进食~疼痛~缓解	疼痛~进食~缓解

25.

26. 【答案】B

【解析】上消化道出血者均有黑便，鲜红色便主要见于下消化道出血。

27. 【答案】B

【解析】成人正常呼吸频率是 16~20 次/分。

28. 【答案】B

【解析】哮喘持续状态：严重的哮喘发作持续 24 小时以上，经治疗不易缓解。表现为极度呼吸困难、发绀、端坐呼吸、大汗淋漓，甚至出现呼吸、循环衰竭。

29. 【答案】B

【解析】上消化道出血伴休克时应立即建立两条静脉通道。配合医生迅速、准确地实施输血、输液、各种止血治疗及用药等抢救措施，并观察效果及不良反应。准备好急救用品、药物。

30. 【答案】B

【解析】胎龄满 28 周至出生后 7 足天是围生期；出生后脐带结扎开始到足 28 天是新生儿期；出生后到满 1 周岁是婴儿期；1 周岁后到满 3 周岁是幼儿期；3 周岁后到 6~7 周岁是学龄前期；从入小学起（6~7 岁）到青春期（13~14 岁）开始之前是学龄期。

31. 【答案】D

【解析】脑室引流患者最主要的护理措施是保持引流管通畅，如怀疑小凝血块或搓碎的脑血管组织阻塞，可严格消毒管口后，用无菌注射器轻轻抽吸，禁忌用生理盐水冲洗。

32. 【答案】A

【解析】特异性感染：是指由一些特殊的病菌、真菌等引起的感染，结合该题选项只有肺结核是由结核分枝杆菌特异性引起，且结核分枝杆菌检查是确诊肺结核病的特异性依据。

33. 【答案】A

【解析】产力是指将胎儿及其附属物从子宫内逼出的力量。产力包括子宫收缩力(简称宫缩)、腹肌及膈肌收缩力(统称腹压)和肛提肌收缩力。其中子宫收缩力是临产后的主要动力。

34. 【答案】A

【解析】护士给药原则中最重要的是遵医嘱给药。

35. 【答案】B

【解析】护士给患者补钾每日不可超过 6g。

36. 【答案】B

【解析】发生空气栓塞，此时患者应采取左侧、头低足高位，使气体浮向右心室心尖部，避开肺动脉入口。

37.

38. 【答案】A

【解析】皮内注射法针尖斜面与皮肤呈 5° 角，皮下注射法针尖斜面与皮肤呈 $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$ 角，肌肉注射法针头与皮肤呈 90° 角。

39. 【答案】B

【解析】题目已知输入液体的总量和预计输完所用的时间，求每分钟滴数。则根据公式 每分钟滴数 = 液体的总量 (ml) \times 点滴系数 (滴/毫升) / 输液所用时间 (min)，可知该患者每分钟滴数为 50 滴。

40.

41. 【答案】A

【解析】护士在操作过程中被锐器扎伤，正确的处理是由近心端向远心端挤压，以减少有害物质的吸收。

42. 【答案】C

【解析】患者和病原体携带者是医院感染中主要的感染源。

43. 【答案】B

【解析】高效消毒剂：指可杀灭一切细菌繁殖体（包括分枝杆菌）、病毒、真菌及其孢子等，对细菌芽孢（致病性芽孢菌）也有一定杀灭作用，达到高水平消毒要求的制剂。在所给答案中，过氧化氢属高效消毒剂：具有广谱、高效、速效、无毒、对金属或织物有腐蚀性。

44. 【答案】C

【解析】高血钾症是急性肾衰竭最严重的并发症，是死亡最常见的原因。高钾血症可诱发各种心律失常，重者心室颤动、心脏骤停；代谢性酸中毒；可有高磷、低钙低钠，低氯血症等。

45. 【答案】B

【解析】输血后将血袋保存于 2~8℃冰箱 24 小时，以备出现意外情况时核查用。

46. 【答案】A

【解析】健胃药服用的时间最好是在饭前服用。

47. 【答案】B

【解析】损伤早期为防止皮下出血与肿胀，应该使用冷敷，以达到降温、止血、消炎、止痛目的。

【答案】D

【解析】红细胞：正常人尿内无或偶见红细胞，如离心沉淀后的尿沉渣在每高倍视野中平均见到 3 个以上红细胞，称镜下血尿。常见于急、慢性肾炎，肾结核，泌尿道结石，肿瘤及出血性疾病。

49. 【答案】B

【解析】常用的漱口液及作用

溶液名称	作用
生理盐水	清洁口腔，预防感染
复方硼酸溶液（朵贝尔氏液）	轻度抑菌、除臭
1%~3%过氧化氢溶液	防腐、防臭，适用于口腔感染有溃烂、坏死组织者
1%~4%碳酸氢钠溶液	属碱性药，对真菌有抑菌作用
0.02%洗必泰（氯己定）溶液	清洁口腔，广谱抗菌

50. 【答案】A

【解析】导尿时插入的深度：男患者：插入尿道 20~22cm，见尿液流出再插入 1~2cm；插导尿管时，阴茎与腹壁成 60°，使耻骨前弯被拉直，便于插管。如导尿管留置术见尿后再插入 5~7cm。女患者：插入尿道 4~6cm，见尿液流出再插入 1cm 左右。

51. 【答案】A

【解析】测血压时，血压计“0”点应与心、肱动脉在同一水平位上。坐位时肱动脉平第四肋软骨，仰卧位时肱动脉平腋中线水平。

52.

53. 【答案】C

【解析】

分级	表现
0级	完全能独立，可自由活动
1级	需要使用设备或器械
2级	需要他人的帮助、监护和教育
3级	既需要他人帮助，也需要设备和器械辅助
4级	完全不能独立，不能参加活动。

54. 【答案】B

【解析】高热病人机体消耗增加，应当高蛋白饮食。

55. 【答案】C

【解析】病房最适宜的湿度为 50%~60%。

56. 【答案】B

【解析】破伤风病人护理要点：①病室要求遮光，安静，温度 15~20℃，湿度 60%左右，避免外界刺激。②保持呼吸道通畅，预防呼吸道并发症包括协助排痰、吸痰；给雾化吸入；给氧；做好气管切开的护理；防止受凉；防止进食时误吸等。③加强营养，维持体液平衡给口服、管饲或静脉营养；静脉输液、输血浆、清蛋白等。预防损伤如加床防护栏，防坠床；抽搐发作时，垫牙垫，防舌咬伤。⑤加强基础护理根据病情提供相应的护理。⑥人工冬眠护理监测生命体征；调整冬眠药物滴速；观察冬眠并发症。⑦导尿及导尿管护理抽搐严重者医学教育网|整理，常规留置导尿管，并做好有关护理。⑧严格隔离消毒病人住隔离病房，专人护理，护理人员应穿隔离衣；器械物品为病人专用，敷料应焚烧，器械需经特殊处理后才能高压灭菌。

57. 【答案】A

【解析】内服药使用的标签是蓝色。

58.

59. 【答案】D

【解析】各类脑血管疾病的鉴别：

		病因	发病	临床表现
出血性脑血管疾病	脑出血	高血压、动脉硬化、血液病、外伤、脑血管畸形等	在白昼情绪激动、活动过度、酒后或排便用力时发病	①烈头痛、头晕、呕吐；②意识障碍；③“三偏症”（对侧偏瘫、偏身感觉障碍、对侧同向偏盲）

	蛛网膜下腔出血	先天性脑动脉瘤、脑部血管畸形、白血病、恶性贫血、再障等	起病急骤，在活动中突然发病	①剧烈头痛；②喷射性呕吐；③脑膜刺激征阳性；④一般无肢体瘫痪
缺血性脑血管疾病	短暂性脑缺血发作	主要是动脉硬化	突然发病，持续时间短	①心、呕吐；②眩晕眼震，单眼失明；③偏身感觉障碍；④偏瘫或单瘫
	脑血栓形成	动脉硬化、风湿症、红斑性狼疮性动脉炎、结节性动脉周围炎	常在睡眠或安静休息时发病	①前驱症状（头痛、眩晕、肢体麻木、无力及一过性失语或短暂脑缺血发作）；②晨起半身肢体瘫痪
	脑栓塞	风湿性心脏病、心肌梗死、骨折、人工气胸等	颅外其他部位病变多在静止期或活动后发病	无前驱症状

60. 【答案】B

【解析】对婴幼儿、老年人、麻醉未清醒、末梢循环不良和昏迷病人水温应在 50℃ 以内。对意识不清、感觉迟钝的患者使用热水袋时应再报一块大毛巾或放于两层毯之间，并定时检查用热部位皮肤情况，以防烫伤。

61. 【答案】B

【解析】20%—30% 乙醇——急性肺水肿时湿化给氧；30% 乙醇——湿润、松解头发缠结；25%—35% 乙醇——乙醇擦浴；50% 乙醇——皮肤按摩；75% 乙醇——新生儿头皮静脉、脐部消毒，供皮区的消毒；95% 乙醇用于燃烧法消毒和静脉炎湿敷等（静脉炎首选 50% 硫酸镁）。

62. 【答案】B

【解析】肾结核的临床表现：膀胱刺激症：尿频是肾结核病人最早出现的症状；血尿；脓尿；肾区疼痛和肿块；全身症状常不明显。晚期肾结核可有发热、盗汗、贫血、虚弱、消瘦、食欲减退等症状和红细胞沉降率增快。

63.

64. 【答案】A

【解析】护士职业素养培养的关键是道德素养。

65. 【答案】A

【解析】周围静脉输液技术：在穿刺点上方 6cm 处扎止血带，消毒直径在 5cm 以上。一般从远端小静脉开始穿刺。静脉留置针输液术：在穿刺点上方 10cm 处扎止血带，常规消毒直径 5cm 以上。

66. 【答案】C

【解析】肺栓塞是下肢深静脉血栓最严重的并发症，当下肢深静脉血栓形成，预防肺栓塞应注意：①严格卧床两周；②严禁按摩患肢；③禁止施行对患肢有压迫的检查。出现栓塞的 24 小时内，病人应：①限制自身活动；②保持呼吸节律正常；③通知医院，等待医治。

67. 【答案】D

【解析】消毒肛门会阴时及污染的切口时，应该从周围向中心成同心圆样消毒。

68. 【答案】A

【解析】浸润型肺结核是最常见的继发性肺结核，血源播散型肺结核是预后最差的肺结核类型。

69. 【答案】C

【解析】断指保存的温度是 4℃。

70. 【答案】B

【解析】四环素类药物可透过胎盘屏障进入胎儿体内，沉积在牙齿和骨的钙质区内，引起胎儿牙齿变色，牙釉质再生不良及抑制胎儿骨骼生长，该类药物在动物中有致畸胎作用，因此妊娠期妇女不宜应用。同时妊娠期妇女对四环素的肝毒性反应尤为敏感，应避免使用此

类药物。该品可自乳汁分泌，乳汁中浓度较高，对乳儿有潜在的发生严重不良反应的可能，哺乳期妇女应用时应暂停授乳。

71. 【答案】A

【解析】急性阑尾炎最典型的症状为：转移性右下腹疼痛，腹痛多始于脐周或上腹部，数小时后疼痛转移并局限于右下腹部。

72. 【答案】A

【解析】心绞痛主要的表现是心前区疼痛或不适。

73. 【答案】A

【解析】生命体征测量包括体温、呼吸、血压、脉搏。

74. 【答案】D

【解析】梦游是睡眠中自行下床行动，而后再回床继续睡眠的怪异现象。梦游者多为学龄期儿童（从入小学 6~7 岁起到青春期 13~14 岁）。梦游者下床后的行动期间，仍在沉睡状态，大多数梦游睡醒后对自己夜间的行动一无所知。少部分记忆清晰，但不敢确定是梦游，以为自己只是做梦。并且对于自己梦游的经历往往具有极强烈的应激性，比如说谎、否认等其他行为转移。

75.

【答案】D

【解析】铁摄入量不足是妇女、儿童缺铁性贫血的主要原因。铁吸收不良主要与胃肠功能紊乱或某些药物作用，导致胃酸缺乏或胃肠黏膜吸收功能障碍而影响铁的吸收有关。铁丢失过多（慢性失血）是成人缺铁性贫血最常见和最重要的病因。。

77.

78. 【答案】D

【解析】四人搬运法：用于颈、腰椎骨折患者或病情较重者。搬运骨折患者时，在平车上垫木板，做好骨折部位固定。

79.

80.

81. 【答案】A

【解析】呕血的病人应禁食。恢复期给予高热量、高蛋白、高维生素、易消化的饮食，避免食用过咸、过甜、辛辣、生冷等刺激性食物。

二、多选题（共 10 题）

82. 【答案】ABD

【解析】三凹征：是指吸气时胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙出现明显凹陷，是由于上部气道部分梗阻所致吸气性呼吸困难。常见于气管异物、喉水肿、白喉等。

83. 【答案】ABC

【解析】灌肠禁忌症：妊娠、急腹症、严重心血管疾病、消化道出血等病人。

84. 【答案】ABC

【解析】输血“三查八对”：“三查”即查对血液制品的有效期、血液制品的质量、输血装置是否完好；“八对”即核对患者床号、姓名、住院号、血袋(瓶)号、血型、交叉配血试验结果、血制品的种类、剂量。

85. 【答案】ACD

【解析】门静脉高压者可有脾大、静脉侧支循环形成及腹水等表现。

86.

87. 【答案】BCD

【解析】腌制食品不会引发肺癌。

88. 【答案】ACD

【解析】急性胰腺炎的病因：胆道疾病，其中胆石症最为常见；胰管梗阻：如胰管结石、肿瘤、狭窄；十二指肠乳头临近部位的病变；酗酒和饮食不洁、暴饮暴食：乙醇可使胰液大量分泌，酗酒可使胰液内蛋白增高，沉淀形成蛋白栓，致使胰液排出不畅。

89. 【答案】ABD

【解析】医院饮食包括试验饮食、基本饮食、治疗饮食。

90. 【答案】ABCD

【解析】常见输液反应：发热反应（最常见）、循环负荷过重（急性肺水肿）、静脉炎、空气栓塞。

91.

92. 【答案】ABCD

【解析】护理任务包括保持健康、治疗疾病、恢复健康、减轻痛苦。

三、判断题（共 15 题）

93. 【答案】×

【解析】高热病人容易发生口腔感染，但溃疡的几率不大。

94. 【答案】✓

【解析】输液速度太快容易发生循环负荷过重（急性肺水肿），主要临床表现为：在输液过程中，患者突然出现呼吸困难、咳嗽、咳粉红色泡沫样痰，严重时痰液可由口、鼻涌出，肺部可闻及湿啰音，心率快、心律不齐。发现肺水肿症状，应立即停止输液，通知医生进行紧急处理；协助患者取端坐位，两腿下垂，以减少下肢静脉血回流，减轻心脏负担；给予高流量吸氧，使肺泡内压力增高，从而减少肺泡内毛细血管渗出液的产生；同时，可将湿化瓶内放入 20%~30%乙醇，再进行氧气吸入，因为乙醇可以减低肺泡内泡沫的表面张力，使

泡沫破裂消散，以此改善肺部气体交换，减轻缺氧症状；必要时进行四肢轮扎。

95.

96. 【答案】✓

【解析】紫外线容易引起皮肤癌症。

97. 【答案】×

【解析】传染病的病人应该根据患者所患疾病的传播途径、传染源等情况选择合适的隔离环境，不可以在传染病病房随便走动。

98. 【答案】×

【解析】院内感染是指住院病人在入院时不存在、也不处于潜伏期、是在住院期间遭受病原体侵袭而引起的任何诊断明确的感染或疾病，包括在住院期间的感染和在医院内获得而在院外发生的感染。

99.

100.

101. 【答案】×

【解析】急性宫颈炎：大部分患者无症状。有症状者主要表现为阴道分泌物增多，呈黏液脓性，引导分泌物刺激可引起外阴瘙痒及灼热感。此外，可出现经间期出血、性交后出血等症状。若合并尿路感染，可出现尿急、尿频、尿痛。若为淋病奈瑟菌感染，因尿道旁腺、前庭大腺受累，可见尿道口、阴道口黏膜充血、水肿以及多量脓性分泌物。慢性宫颈炎：多无症状，少数患者可有阴道分泌物增多，淡黄色或脓性，性交后出血，月经间期出血，偶有分泌物刺激引起外阴瘙痒不适。妇科检查可发现子宫颈呈糜烂样改变，或有黄色分泌物覆盖子宫颈口或从子宫颈口流出，也可表现为子宫颈息肉或子宫颈肥大。

102. 【答案】×

【解析】口腔中含有初步消化淀粉的唾液淀粉酶，胃液中含有能够初步消化蛋白质的酶，肠液和胰液中含有消化糖类、脂肪和蛋白质的酶。胆汁中不含消化酶，但胆汁对脂肪有乳化作用，能把脂肪变成微小颗粒，增加了脂肪与消化酶的接触面积，从而有利于脂肪的消化，在小肠中，脂肪颗粒最终被分解为甘油和脂肪酸。

103. 【答案】✓

【解析】肾衰竭是各种慢性肾脏疾病发展到后期引起的肾功能部分或者全部丧失的一种病理状态。肾衰竭可分为急性肾衰竭及慢性肾衰竭，急性肾衰竭的病情进展快速，通常是因肾脏血流供应不足（如外伤或烧伤）、肾脏因某种因素阻塞造成功能受损或是受到毒物的伤害，引起急性肾衰竭的产生。而慢性肾衰竭主要原因为长期的肾脏病变，随着时间及疾病的进行，肾脏的功能逐渐下降，造成肾衰竭的发生。

104. 【答案】×

【解析】心绞痛是冠状动脉粥样硬化性心脏病（简称冠心病）的主要临床表现，是由于冠状动脉供血不足，心肌暂时缺血、缺氧而引起的发作性胸骨后疼痛，为突然发作，多见于体力劳动或情绪激动时，受寒或饱餐后。持续约数分钟，休息或用硝酸甘油片后症状缓解。

105. 【答案】×

【解析】肾上腺糖皮质激素是治疗特发性血小板减少性紫癜的首选治疗措施。

106. 【答案】✓

【解析】随着年龄增长，骨骼开始变脆，人体对蛋白质和钙质的吸收利用能力降低，骨细胞的分解速度逐渐超过了骨细胞的合成速度，使骨骼内部逐渐空虚，骨骼不再像年轻时那样坚硬，而是变脆，因此，容易出现骨折。此外随着年龄增长，肌腱硬化、肌肉、肌腱等运动功能也随之减退，活动能力逐渐下降，弹性和韧性变差，肌肉萎缩，肌肉之间协调差，导致年龄大者，骨折愈合晚。

107. 【答案】×

【解析】对于肝脏疾病患者，护士应当指导患者低蛋白饮食，限制蛋白质摄入，以防诱发肝性脑病。