

# 东胜区人民医院 护理岗 (真题无答案解析)

更多考务考情欢迎咨询



# 218 年鄂尔多斯市东胜区人民医院

## 招聘考试

### (护理岗)

#### 一、单项选择题

1. 患者发生静脉炎的主要原因是 ( )

- A. 输液速度过快
- B. 输液量过大
- C. 溶液含有致热物质
- D. 长期输入高浓度溶液

2. 肺结核患者宜采用的饮食治疗是 ( )。

- A. 高蛋白、高热能饮食，注意补充钙和铁
- B. 细软、少渣、易消化软食
- C. 流质
- D. 产氨少的优质蛋白饮食

3. 少尿是指 24 小时尿量少于： ( )

- A. 100ml
- B. 200ml
- C. 300ml
- D. 400ml

4. 关于消毒，下列哪项描述是正确的（ ）

- A. 是指杀灭或清除传播媒介上一切微生物的处理
- B. 是指杀灭或清除传播媒介上病原微生物，使其达到无害化处理
- C. 采用化学或物理方法抑制或妨碍细菌生产繁殖及其活性的过程
- D. 采用化学或物理方法杀灭包括细菌芽孢的过程

5. 尿潴留病人首次导尿放出尿量不应超过（ ）。

- A. 500ml
- B. 800ml
- C. 1000ml
- D. 1500ml

6. A 型血者红细胞膜外表面有（ ）

- A. E 抗原
- B. D 抗原
- C. A 抗原
- D. B 抗原

7. 细菌性痢疾（ ）。

- A. 黏液、脓血便

B. 稀糊状便

C. 米泔样便

D. 柏油样便

8. 腰椎穿刺后病人的体位为：（ ）

A. 去枕仰卧位 6~8 小时

B. 头部垫软枕，约抬高  $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$

C. 头偏向一侧，口部稍向下

D. 去枕平卧 24 小时

9. 下列哪种说法正确

A. 谵妄病人不会发生冲动或自伤行为

B. 谵妄病人的视幻觉多为非恐怖性

C. 谵妄病人没有定向力障碍

D. 谵妄病人不会产生被害妄想

10. 咯血护理措施不正确的是（ ）。

A. 静卧休息，尽量少翻动

B. 大咯血时，应取平卧位，头偏向一侧

C. 咯血不止时，嘱病人屏气以利止血

D. 若为肺结核咯血则应卧向患侧

11. 某患者因风湿性心脏病、房颤入院。护士为其测量脉率、心率的正确方法是

- A. 先测脉率，再测心率，均测 1 分钟
- B. 护士测脉率，医生测心率，各测 1 分钟
- D. 一人测脉率、心率，一人计时
- C. 一人听心率，一人测脉率，同时测 1 分钟

12. 下列哪项是高渗性脱水的特点（）

- A. 失钠大于失水
- B. 细胞内失水
- C. 皮肤弹性差
- D. 眼窝凹陷明显

13. 物理降温后，需多长时间后再次测量体温以便进行观察（）。

- B. 15min
- C. 20min
- D. 30min
- A. 40min

14. 为了准确观察病人的血压，测量血压时应尽量做到四定即（）

- A. 定时间、定部位、定体位、定血压计
- B. 定时间、定部位、定血压计、定人员

C. 定时间、定部位、定体位、定记录格式

D. 定时间、定体位、定部位、定听诊器

15. 关于发生职业暴露后的处置的说法，不正确的是()

A. 针刺伤后将刺伤部位即刻从远心端向近心端挤压排出血液

B. 肥皂水冲洗

C. 用碘酒或碘伏、酒精等消毒刺伤部位

D. 用流动的净水冲洗

16. 压疮的好发部位是( )。

A. 头顶部

B. 肩胛骨

C. 腋下

D. 足底

17. 最常见的输血反应是( )

A. 发热反应

B. 变态反应

C. 枸橼酸钠中毒反应

D. 溶血性输血反应

18. 护士为病人插胃管出现呛咳、发绀时应 ( )

- A. 立即拔除胃管
- B. 嘱病人深呼吸
- C. 指导病人做吞咽动作
- D. 稍停片刻再插
- E. 请病人坚持一下

19. 尿潴留病人首次导尿放出尿量不应超过

- A. 1500ml
- B. 800ml
- C. 1000ml
- D. 2000ml

20. 洗胃插胃管的长度为 ( )

- A. 从鼻尖到剑突
- B. 从前额发际到剑突
- C. 从口腔到剑突
- D. 从鼻尖到脐

21. 从早上 8 点开始输液, 若使 1000ml 液体在 5 小时内滴完, 输液速度为每分钟



B. 45 滴

C. 50 滴

D. 55 滴

A. 60 滴

22. 慢性肾衰竭最常见的死亡原因是( )。

A. 严重感染

C. 心血管并发症

D. 代谢性碱中毒

B. 代谢性酸中毒

23. 慢性呼吸衰竭缺氧明显伴二氧化碳潴留时，采用氧疗的给氧浓度，下列哪项是正确的( )

A. 小于 25%

B. 小于 35%

C. 小于 45%

D. 小于 55%

24. 针对输血后的发热反应，应采取( )

A. 立即减慢输血速度，严重者停止输血，抑制发热反应的常用药物为解热镇痛药



- B. 主要措施为抗休克、抗感染，包括使用广谱抗生素、补液、利尿、降温、纠酸等
- C. 保证血源质量，防止血源污染，严格无菌操作
- D. 停止输血，积极抗休克，维持循环功能，保护肾功能和防治弥散性血管内凝血(DIC)

25. 测量血压前，要保证被测者安静休息()时间以上

- A. 5 分钟
- B. 10 分钟
- C. 15 分钟
- D. 20 分钟

26. 为昏迷患者进行口腔护理时，不需准备的用物是( )。

- A. 棉球
- B. 吸水管
- C. 张口器
- D. 压舌板

27. 慢阻肺的标志性症状是()

- A、慢性咳嗽
- B、气短或呼吸困难
- C、喘息和胸闷

D. 吸气性困难

28. 门诊患者特征表述不正确的是

A. 心态的单一性

B. 身份的各异性

C. 病情的复杂性

D. 就诊的随机性

29. 心力衰竭细胞最常见于

A. 左心衰竭

B. 肺炎

C. 肺水肿

D. 右心衰竭

30. 颈椎骨折进行颅骨牵引时，采取何种卧位()。

A. 端坐位

B. 半坐卧位

C. 头低足高位

D. 头高足低位

31. 穿隔离衣时应注意

B. 系领子时污染的袖口不能触及面部、衣领及工作帽

C. 穿隔离衣后到清洁区取物应避免物品触及前胸部

D. 隔离衣挂于病室走廊时，应使污染面向外

A. 穿隔离衣前先戴好帽子、口罩

32. CO 中毒时，常最先受损的脏器是

- A. 脑
- B. 肝
- C. 肾
- D. 肺

33. 护士在执行医嘱时，下列做法不妥的是()

- A. 执行口头医嘱时先复诵一遍
- B. 根据需要自行调整医嘱
- C. 发现医嘱有误时拒绝执行
- D. 医嘱与病情不符时向医生提出质疑

34. 现场对成人进行胸外按压时的部位是()。

- A、胸骨中下 1/3 交界处
- B、胸部正中乳头连线水平
- C、胸骨上 1/3
- D、胸骨中下 1/2 交界处

35. 骨关节结核最多见的发病部位是 C

- A. 肱骨
- B. 股骨

- C. 脊柱
- D. 膝关节

36. 患者需做大便潜血试验，前3天应禁食

- A. 白菜
- B. 牛奶
- C. 土豆
- D. 羊血

37. 帮助留置导尿管病人锻炼膀胱反射功能，护理措施是（ ）。

- A. 温水冲洗外阴每天2次
- B. 每周更换导尿管
- C. 间隙性引流夹管
- D. 定时给病人翻身

38. 患者女性，36岁，行子宫肌瘤手术前导尿并留置导尿管的主要目的是（ ）

- A. 排空膀胱以避免手术中误伤
- B. 测定残余尿

- C. 收集尿液作细菌培养
- D. 排出尿液以解除痛苦

39. 乳糜尿呈( )

- A. 酱油色
- B. 红色或金色
- C. 黄褐色
- D. 乳白色

40. 去枕仰卧位适用于( )

- A. 全身麻醉未清醒者
- B. 腹部检查
- C. 导尿时
- D. 休克患者

41. 有关冰袋使用准备以下叙述错误的是( )。

- A. 首先检查冰袋有无破损
- B. 冰块应放在帆布袋内砸碎
- C. 冰袋内装冰约 1/2
- D. 装冰后直接带给老人床旁使用

42. 上消化道出血病人的粪便可呈( )。

- A. 脓血样
- B. 果酱样
- C. 黑粪样
- D. 米泔水样

43. 医嘱：给该病人实施导尿术，插尿管的深度是多少（ ）。

- B. 4~6cm
- C. 7~8cm
- D. 8~9cm
- A. 9~10cm

44. 抢救青霉素过敏性休克应首选（ ）

- A. 去甲肾上腺素
- B. 抗组胺药
- C. 多巴胺
- D. 肾上腺素

45. 治疗压疮的关键是（ ）

- A. 清创
- B. 明确病因
- C. 引流
- D. 消炎

46. 男，45岁，在剖腹探查术后3日出现腹部不适，体检腹部膨隆，叩诊呈鼓音。最佳的处理方法是（ ）

- A. 清洁灌肠
- B. 保留灌肠
- C. 大量不保留灌肠
- D. 肛管排气

47. 昏迷患者眼睑不能闭合应（ ）

- A. 按摩眼睑
- B. 热敷眼部
- C. 滴眼药水
- D. 盖凡士林纱布

48. 关于代谢性酸中毒下列哪项正确（ ）

- A. 低钾血症引起
- B. 大量利尿引起
- C. 体内碳酸增高引起
- D. 大量呕吐胃内容物引起

49. 下列哪项不属于三查七对中的七对的内容（ ）



- A. 对床号、姓名
- B. 对用药后的反应
- C. 对药名
- D. 对浓度、剂量

50. 直肠癌粪外观是( )。

- A. 米泔水样
- B. 暗红果酱色
- C. 白陶土便
- D. 柏油便，黑色有光泽

51. 治疗洋地黄中毒，下列哪项措施是正确：( )

- A、停用洋地黄
- C、室性早搏静注苯妥英钠
- D、严密观察病情变化
- B、补充钾

52. 使用人工呼吸机时为促进排痰应按时给患者( )

- B. 吸痰
- C. 拍背
- D. 按摩
- A. 气道湿化

53. 患者住院期间，病案的首页为( )

- A. 体温单
- B. 住院病案首页
- C. 入院记录单
- D. 病程记录单

54. 取用无菌溶液时，正确的方法是( )

- A. 打开瓶盖后，应立即倒入无菌容器内
- B. 可直接从瓶中蘸取
- C. 可用敷料堵住瓶口，使溶液慢慢流出
- D. 已打开的溶液瓶可保存 24 小时

55. 下面哪种血尿应首先考虑上尿路结石( )。

- A. 无痛性血尿
- B. 终末血尿
- C. 活动性血尿
- D. 初期血尿

56. 行小量不保留灌肠时，灌肠筒液面距离肛门应在 C

- A. 20cm 以下
- B. 40cm 以下

C. 60cm 以下

D. 30cm 以下

57. 使用无菌包的正确方法是 D

A. 无菌包潮湿后应晾干再用

B. 解开系带，将系带卷放在包布内面

C. 无菌包内的治疗巾一次使用不完即不能再用

D. 打开以前应先查看名称和灭菌日期

58. 58. 临床上最常见的心肌梗死类型是(B )

A、急性前壁心肌梗死

B、急性下壁心肌梗死

C、急性心尖心肌梗死

D、急性前间壁心肌梗死

59. 下列哪项是输液反应中急性肺水肿的特征性症状(A )

B、咳嗽、气促、呼吸困难

C、发绀、躁动不安

D、胸闷、心悸、气促

A、咳嗽、咳粉红色泡沫痰、气促、胸闷

60. 医嘱每日补充 10% 氯化钾溶液 30ml，在配好的溶液中，氯化钾浓度不可大于 A

B. 0.3%

C. 0.5%

D. 1%

A. 0.3%

61. 心脏正常的起搏点是(C )

A. 房室结

B. 房室束

D. 右束支

C. 窦房结

62. 大量不保留灌肠的目的包括(B )。

A. 治疗肠道炎症

B. 刺激肠蠕动，促进排便，排出积气

C. 肠道术前准备

D. 高热病人降温

63. CO 中毒时，常最先受损的脏器是 A

A. 脑

B. 肝

C. 肾

D. 肺

64. 医嘱的种类不包括：(D )

A、临时医嘱

B、长期医嘱

C、备用医嘱

D、即刻医嘱

65. 心肺复苏指南中胸外按压的部位为 A

A. 两乳头连线中点（胸骨中下 1/3 处）或剑突上 2 横指处

B. 心尖部

C. 胸骨中段

D. 胸骨左缘第五肋间

66. 关于骨关节结核的叙述中下列哪项不对 A

B. 脊柱结核中，腰椎发病占首位

C. 脊椎结核好发于椎体

D. 皮质骨结核常见于四肢短管状骨

A. 滑膜结核最多见于腕关节

67. 对机体能量代谢影响最为显著的因素是 (C)

- A. 寒冷
- B. 进食
- D. 精神活动
- C. 肌肉运动

68. 高血压病并发脑出血的常见部位是 (D)。

- A. 大脑皮质
- B. 桥脑
- C. 小脑
- D. 内囊及基底节区

69. 观察发绀最明显的部位是 (E)

- A. 鼻尖
- B. 口唇
- C. 舌
- D. 颊部
- E. 甲床

70. 临床上最常用的镇静催眠药为下列哪类药物 A

- A. 苯二氮类
- B. 巴比妥类

C. 水合氯醛

D. 甲丙氨酯

71. 食管的第三个狭窄 (B)

A. 是异物滞留的好发部位

B. 在通过膈的食管裂孔处

C. 距中切牙 40cm

D. 相当于第 8 胸椎水平

72. 方女士, 36 岁, 孕足月分娩, 会阴侧切娩出一男婴, 产后第二天, 会阴伤口有水肿, 查伤口无分泌物, 压痛(-), 此产妇会阴护理不妥的是 (C)

A. 保持外阴清洁, 干燥

B. 每日用苯扎溴铵棉球擦洗会阴 3 次

C. 50%硫酸镁溶液湿敷会阴

D. 坐浴每天 2 次

73. 肾损伤的一般临床表现不包括 B

A. 休克

B. 贫血

C. 血尿

D. 疼痛



74. 终止室颤最有效的方法是 D

- A. 吸氧
- B. 胸外按压
- C. 人工呼吸
- D. 电除颤

75. 慢性阻塞性肺疾病（COPD）的氧疗最常用的是： B

- A. 有创机械通气
- C. 间断高浓度吸氧
- D. 持续高频呼吸机通气
- B. 持续低流量吸氧

76. 依据规定，医师为门诊患者开具普通处方用量一般不得超过 B

- A. 10 日
- B. 7 日
- C. 5 日
- D. 3 日

77. 做生化检验的血标本，宜在何时采血(B )

- A. 餐后
- B. 清晨空腹时

C. 夜间患者休息后

D. 随时皆可

78. 心衰伴快速房颤者首选：(B)

A. 西地兰

B. 美托洛尔

C. 呋塞米

D. 螺内酯

79. 神经根型颈椎病患者牵引时一般应该采用 B

A. 上肢放松体位

B. 颈前屈体位

C. 颈后伸体位

D. 颈垂直体位

80. 隔离的对象包括哪些？(D)

A、密切接触者

B、疑似病人

C、确诊患者

D、以上皆是

81. 下列哪一项要求不属于医师在执业活动中应当履行的义务。

(D)

- A. 把握经济俭省原则，为患者减轻医药费用负担
- B. 树立敬业精神，遵守职业道德，履行医师职责，尽职尽责为患者服务
- C. 关心、爱护、尊重患者，保护患者的隐私
- D. 努力钻研业务，更新知识，提高专业技术水平

82. 在医务人员的诊治活动中，下列行为符合不伤害原则的是 C

- A. 实施的诊治手段是无益的，但病人也无明显痛苦
- B. 实施的诊治手段是不必要的，但可避免医患纠纷
- C. 实施的诊治手段有一些不适，但符合适应证
- D. 实施的诊治手段对病人有益，但是在强迫下进行的

83. 影响和制约医疗水平的因素不包括(B)

- B. 医务人员的道德水平
- C. 病人的合作程度
- D. 卫生政策和制度的合理性
- A. 医务人员的技术水平

84. 医疗事故分为()级,其中造成患者死亡、重度残疾的属()级。

B

A. 四级;四级

B. 四级;一级

C. 三级;一级

D. 三级;四级

85. PDCA 中,A 是指(D)。

A. 策划

B. 实施

C. 评价

D. 改进

86. 护士自发组织救援团队属于( )

87. 过敏反应的临床表现中,下列最严重的是(B)

A. 循环系统损害

B. 过敏性休克

C. 呼吸系统损害

D. 皮肤损害

88. 下列护理内容属于直接护理项目的是 D

- A. 处理医嘱
- B. 输液前准备
- C. 交接班
- D. 晨间护理

89. 下列哪项属医疗事故：(D)。

- A: 在紧急情况下为抢救患者生命而采取紧急医学措施造成不良后果的
- B: 在医疗活动中由于患者特殊体质而发生的医疗意外
- C: 无过错输血感染造成的不良后果
- D: 因医疗过失造成患者人身损害

90. 患者的基本权利不包括 C

- A. 基本医疗权
- B. 疾病认知权
- D. 自主决定权
- C. 社会免责权

91. 不归属护士义务的是(D)。

- A. 负担预防保健工作
- B. 宣传防病、治病知识
- C. 开展健康教育，提供卫生咨询

D. 依法履行职责的权利受法令保护

92. 为住院患者开具的麻醉药品和第一类精神药品处方应当逐日开具，每张处方为 (D)

A. 1 次用量

B. 1 次最大量

C. 1 次常用量

D. 1 日常用量

93. 护士孙某，因嫌弃医院的护理工作，离开医院，从事医药销售工作已有 2 年，有关卫生行政部门应对其采取的处理方法是

D

A. 处以罚款 5000 元

B. 令其在规定期限内回医院工作

C. 停薪留职

D. 注销注册，收回护士执业执照

94. 国家鼓励下列人员率先献血 C

A. 工人

B. 农民

C. 知识分子

D. 高等学校在校学生

95. 抢救结束后护士应在()小时内据实补记护理病历。B

A、2

B、6

C、12

D、24

96. 特别护理记录单一般不需用于

A. 危重患者

B. 大手术后患者

C. 行特殊治疗的患者

D. 骨折生活不能自理患者

97. 护士在执行医嘱时不能 A

A. 根据需要自行调整医嘱

B. 严格遵守医嘱执行制度

C. 有疑问时重新核对医嘱

D. 患者有不良反应时复核医嘱

98. 唯一可通过胎盘的 Ig 是(A )

A. IgG



B. IgM

C. IgA

D. IgD

99. 某破伤风患者频发全身肌肉抽搐，呼吸困难，发绀。此时，最重要的是护理措施是 (A)

A. 解除肌肉痉挛

B. 应用破伤风抗毒素

C. 及时处理伤口

D. 避免损伤

100. 幼儿甲状腺功能低下，会导致 A

A. 呆小症

B. 巨人症

C. 侏儒症

D. 黏液性水肿

101. 下列属于化学消毒法的是 (D)。

A. 机械消毒

B. 日晒消毒

C. 蒸汽消毒

D. 漂白粉消毒

102. 胃大部切除术后 24 小时内应注意观察( )

- A. 体温情况
- B. 出血情况
- C. 腹痛情况
- D. 切口情况

103. 吞服强酸性毒物后，不能使用的对抗剂是 A

- A. 5%醋酸
- B. 牛奶
- C. 蛋清
- D. 豆浆

104. 急性肺水肿时病人应采取的体位是 D

- A. 平卧位
- B. 俯卧位
- C. 右侧卧位
- D. 左侧卧位

105. 口腔护理的目的不包括 (B) 。

- A. 使口腔湿润
- B. 清除口腔一切细菌

C. 祛除口臭

D. 治疗口腔溃疡

106. 成人蛋白尿是指

B. 24 小时尿蛋白定量持续超过 100mg

C. 24 小时尿蛋白定量持续超过 150mg

D. 24 小时尿蛋白定量持续超过 200mg

A. 24 小时尿蛋白定量持续超过 300mg

107. 大部分血液生化检测要求受检者禁食多少小时后采血：(D)

A. 6 小时

B. 8 小时

C. 10 小时

D. 12 小时

108. 吸氧过程中需要调节氧流量时，正确的做法是 D

A. 先关总开关，再调氧流量

B. 先关流量表，再调氧流量

C. 先拔出吸氧管，再调氧流量

D. 先取下鼻导管，再调氧流量

109. 诊断急性腹膜炎的最重要的体征是 (D)。

- A. 腹部叩诊鼓音
- B. 肝浊音界消失
- C. 移动性浊音阳性
- D. 腹膜刺激征阳性

110. 肺回缩力来自(C)。

- A. 胸内负压
- B. 肺弹性纤维回缩力
- C. 肺泡内液-气界面表面张力
- D. 气道阻力
- E. 胸廓弹性阻力

111. 心肺复苏的药物治疗，首选给药途径为(C)

- A. 心内注射
- B. 气管内给药
- C. 静脉给药
- D. 肌肉注射

112. 下列哪项对高钾血症病人禁用 C

- A. 等渗盐水
- B. 10% 葡萄糖液
- C. 右旋糖酐

D. 林格液

113. 截瘫病人足底放置支架是为了预防 (A)

A. 下肢水肿

B. 足部瘀血

C. 关节僵硬

D. 肌肉萎缩

114. 在初次使用胰岛素治疗时，一般选用 (C)

A. 正规胰岛素从小剂量开始

B. 鱼精蛋白锌胰岛素从小剂量开始

C. 正规胰岛素从大剂量开始

D. 正规胰岛素与鱼精蛋白胰岛素联合应用

115. 关于白血病病人护理，下列错误的是 D

A. 进食高热量、高维生素、高蛋白质饮食

B. 注意病室消毒，预防感染

C. 化疗期间多卧床休息，避免外伤引起出血

D. 化疗期间避免呕吐，应禁食

116. 下列哪项不宜采用雾化吸入治疗 (C)

A. 痰粘咳不出来

B. 支气管哮喘

C. 纤维支气管镜检查术前麻醉

D. 气胸严重呼吸困难

117. 观察患者昏迷深浅度的最可靠指标是 C

A. 生命体征

B. 瞳孔反应

C. 对疼痛刺激的反应

D. 皮肤的温度

118. 踝关节扭伤，早期应选用\_\_\_\_\_A

A. 用冷水冲

B. 用热水敷

C. 用红外线照射

D. 局部按摩

119. 输血前后及两袋血之间应输入的溶液是(c )

A. 5%葡萄糖溶液

B. 5%葡萄糖盐水

C. 0.9%氯化钠

D. 复方氯化钠溶液

120. 属于长骨的是(D )

- A. 肋骨
- B. 胸骨
- C. 跟骨
- D. 趾骨

121. 最容易引起呼吸困难和窒息的骨折是 B

- A、髌突颈骨折
- B、额部粉碎性骨折
- C、上颌骨骨折
- D、下颌角骨折

122. 吸入性肺脓肿最常见的感染菌是(A )

- A、金黄色葡萄球菌
- B、克雷伯杆菌
- C、化脓性链球菌
- D、真菌

123. 护理接受化学治疗的白血病患者，最重要的措施是 A

- A. 防止和治疗感染
- B. 缓解疼痛
- C. 消除病人的忧虑
- D. 鼓励病人摄入蛋白质饮食



124. 长期鼻饲者更换胃管的方法正确的是 D

- A. 晨拔出，当晚鼻饲前从另一侧鼻孔插入新胃管
- B. 晨第一次鼻饲后拔出，第二次鼻饲前从另一侧鼻孔插入新胃管
- C. 晨第一次鼻饲后拔出，第二次鼻饲前从同一侧鼻孔插入新胃管
- D. 晚最后一次鼻饲后拔出，第二日晨从另一侧鼻孔插入新胃管

125. 关于铁剂服用错误的说法是\_\_\_\_\_。

- A: 应在饭后或餐中服用
- B: 应用吸管吸食，后漱口保护牙齿
- C: 可饮用茶水促吸收
- D: 可同服果汁促进吸收

二，多选题

126. 属于病人权利的是 CD

- A. 内心信念
- B. 医德境界
- C. 知情同意

D. 自主选择

127. 医患冲突的原因包括 ABCD

A. 服务态度问题

B. 医疗事故与医疗过失的原因

C. 满足病人需求方面的因素

D. 医疗体制与医院管理方面的因素

128. 导致发生医疗事故的直接原因是行为主体()

A. 在现有科技条件下无法预料

B. 违反医疗卫生管理法律、法规

C. 技术上缺乏经验

D. 临床诊疗中患者病情异常

129. 下列选项中属于《传染病防治法》规定的甲类传染病的是 (CD)。

A. 传染性非典型肺炎

B. 手足口病

C. 鼠疫

D. 霍乱

130. 下呼吸道感染的的常见因素为()

- A. 免疫机能受损
- B. 正常菌群失调
- C. 病原体的飞沫传播
- D. 空调系统污染
- E. 致病菌通过气道逆行感染

131. 左心衰竭可能的症状有 ()

- A. 夜间阵发性呼吸困难
- B. 心悸
- C. 劳累性呼吸困难
- D. 严重者可发生端坐呼吸
- E. 心前区疼痛

132. 孕妇腹壁上胎心音听诊最佳位置是

- A: 胎儿背侧
- B: 胎儿腹侧
- C: 胎儿头侧
- D: 胎儿臀侧
- E: 胎儿足侧

133. 肝性脑病的诱发因素，下列哪项（）。

- A. 大量排钾利尿

- B. 多次灌肠和导泻
- C. 上消化道出血
- D. 反复放腹水
- E. 高蛋白饮食

134. 急性肾衰竭死亡的最常见原因 BC

- A. 低血钾
- B. 高血钾
- C. 酸中毒
- D. 高血钠
- E. 低血钙

135. 妊娠合并心脏病，下列提示早期心衰的是()

- A. 心界扩大
- B. 休息时心率 $>100$  次/min
- C. 肺底部持续性湿啰音，咳嗽后不消失
- D. 心尖部闻及 II 级收缩期杂音

136. 儿科中应实施保护性隔离的对象是（）。

- A. 新生儿
- B. 腹泻患儿
- C. 接受化疗的患儿

- D. 肾病综合征患儿
- E. 上呼吸道感染患儿

137. 为预防压疮发生，下列护理措施哪项

- A. 经常给病人更换体位，至少 2h 翻身 1 次
- B. 在身体空隙处垫橡胶气圈
- C. 保持皮肤清洁干燥，避免潮湿等刺激
- D. 定期用 50% 的乙醇按摩骨隆突处
- E. 做到“五勤”

139. 超声雾化吸入的目的包括

- A. 稀化痰液
- B. 增加吸入氧浓度
- C. 解除支气管痉挛
- D. 减轻呼吸道的炎症
- E. 间歇吸入抗癌药物治疗肺癌

140. 肾脏功能包括()。

- A. 排出代谢产物
- B. 维持机体水、电解质平衡
- C. 维持机体酸碱平衡
- D. 分泌肾素、促红细胞生成素

E. 分解物质

141. 胸外心脏按压的有效指征是( )

- A. 意识清楚
- B. 触及周围大动脉搏动
- C. 瞳孔缩小, 角膜湿润
- D. 颜面、口唇及皮色转红润
- E. 挤压时自主呼吸恢复

142. 处理医嘱, 下列正确的是( )

- A. 长期备用医嘱写在长期医嘱栏内
- B. 长期医嘱抄至执行单后在医嘱前画红勾
- C. 护士执行医嘱后必须签全名
- D. 临时备用医嘱 24h 内有效
- E. 停止医嘱应在医嘱单上注明停止日期

143. 下列哪项不是常见的输液反应: ( )

- A. 发热反应
- B. 静脉炎
- C. 空气栓塞
- D. 针头阻塞

144. 不可测量口温的病人是()。

- A. 高热
- B. 儿童
- C. 老人
- D. 呼吸困难

145. 下列对肝硬化腹水患者采取的治疗措施，正确的有

- A. 限制水、钠摄入
- B. 小剂量、间歇使用利尿剂
- C. 腹腔穿刺放液，一次不宜超过 1000ml
- D. 输注白蛋白
- E. 补液以生理盐水为主

146. 上消化道出血，呕吐物呈咖啡渣样、棕褐色，其原因为()

- A. 血红蛋白与胃蛋白酶作用
- B. 血红蛋白与胃酸作用
- C. 血红蛋白与硫化物作用
- D. 血红蛋白以原物形式
- E. 血红蛋白与肠液作用

147. 乙型肝炎的主要传播途径是()。

- A. 飞沫传播



- B、母婴传播
- C、血液传播为主
- D、虫媒传播
- E、性传播

148. 属于上呼吸道的器官是()。

- A. 鼻
- B. 喉
- C. 口腔
- D. 咽

149. 阿托品化的指征包括

- A. 瞳孔缩小
- B. 口干
- C. 面红
- D. 双肺湿啰音消失
- E. 心率加快

150. 下列哪项是甲亢的临床表现(ABCE)。

- A. 甲状腺弥漫性肿大
- B. 心悸
- C. 消瘦、体重减轻

D. 精神萎靡、嗜睡

E. 两手颤抖

151. 急性白血病治疗原则包括（ABCDE）

A. 防止感染

B. 纠正贫血

C. 控制出血

D. 抗生素治疗

E. 骨髓移植

152. 肾脏的主要功能（ABC）

A. 排泄体内的代谢废物

B. 调节酸碱平衡

C. 调节机体内的水和渗透压

D. 调节电解质浓度

E. 调节血糖

153. 食管癌早期症状最常见的是

A. 胸骨后疼痛

B. 吞咽困难

C. 食物或黏液反流

D. 进粗食时有暂时性胸骨后停留或异物感

E. 消瘦

154. 深静脉穿刺最常用的血管是

A. 耳静脉

B. 后腔静脉

C. 前腔静脉

D. 桡外侧静脉

E. 尾静脉

155. 产后出血的主要原因 (ABCE)

A. 子宫收缩乏力

B. 凝血功能障碍

C. 软产道损伤

D. 内分泌改变

E. 胎盘滞留

三. 判断题

156. 口服铁剂治疗缺铁性贫血时, 应饭后服用, 以减少对胃的刺激。(A)

157. 心脏骤停首选的治疗措施是心肺复苏。

(A)

158. 可以采用脱敏注射的药物是青霉素。

(A)

159. 氧气压力表上指针降到 0.1MPa 时即不可再用。

(B)

160. 青霉素溶液开封后必须立即使用。

( )

161. 需要长期输液患者选血管应选远心端。

( )

162. 无菌容器拿出未用，可放回继续使用。

( )

163. 月经周期调节激素的周期性变化. FSH 在月经来潮前达到最低水平. ( )

164. 注射胰岛素最好吸收部位是腹部。

( )

164. PICC 插管时，穿刺点的位置在肘下 4 横指处。

( )

