

鄂尔多斯市第四医院 医学基础 A 卷（药剂） （真题+答案）

更多考务考情欢迎咨询



鄂尔多斯第四医院招聘考试 医疗 A 卷

一、单选题（共 80 题，每题 1 分，共 80 分）

1. 最好与铁剂同服的药物

- A、维生素 C
- B、维生素 B
- C、四环素
- D、抗酸药
- E、碳酸钙

2. 治疗焦虑症首选

- A、苯巴比妥
- B、异戊巴比妥
- C、酚妥拉明
- D、地西洋（安定）
- E、哌替啶

3. 主要用于厌氧菌感染的药物是

- A、青霉素
- B、庆大霉素
- C、多西环素
- D、环丙沙星
- E、甲硝唑

4. 长期应用血钾升高的药物

- A、氢氯噻嗪
- B、呋塞米
- C、螺内酯
- D、乙酰唑胺
- E、氯噻嗪

5. 重症肌无力应选择的治疗药物

- A. 山莨菪碱
- B. 氯解磷定
- C. 新斯的明
- D. 阿托品
- E. 毛果芸香碱

6. 血浆药物浓度下降一半所需的时间

- A. 生物利用度
- B. 血浆半衰期
- C. 稳态血浓度
- D. 治疗指数

E. 坪值

7. 患者男性，18岁，近一年来对家人变得冷淡，不去上学，不洗澡，不主动更换衣服，对与自己有关的各种事情表现的无动于衷，最可能

- A、人格障碍
- B、精神分裂症
- C、抑郁症
- D、恐惧症
- E、创伤后应激障碍

8. 精神分裂症最常见的幻觉

- A. 幻听
- B. 幻视
- C. 幻味
- D. 幻触
- E. 幻嗅

9. 阿茨海默症属于

- A. 精神活性物质所致精神障碍
- B. 精神分裂症
- C. 神经症
- D. 人格障碍
- E. 脑器质性精神病

10. 知情同意主要体现在

- A. 对医生技术水平
- B. 对自己健康维护
- C. 对医生诊治手段
- D. 对医院规章制度
- E. 对自己承担社会责任

11. 抗结核药联用的目的不包括

- A. 增强抗菌效果
- B. 延缓细菌耐药
- C. 减少不良反应
- D. 交叉消灭耐药菌株
- E. 扩大抗菌范围

12. 目前已知致泻毒素中最强烈的是

- A、金黄色葡萄球菌肠毒素
- B、肠产毒素大肠埃希菌的不耐热肠毒素
- C、肠产毒素大肠埃希菌的耐热肠毒素
- D、霍乱肠毒素
- E、志贺毒素

13. 血中氧气运输方式

- A. 形成碳酸氢盐
- B. 与血浆蛋白结合
- C. 与血红蛋白结合
- D. 物理溶解
- E. 形成氨基甲酸血红蛋白

14. HIV 的传播途径不包括

- A. 输血
- B. 性传播
- C. 器官移植
- D. 母婴传播
- E. 呼吸道传播

15. 正常人在下列情况下可以出现错觉，但应除外

- A. 光线不足
- B. 暗示
- C. 恐惧
- D. 心情不佳
- E. 期待状态

16. 抢救青霉素休克

- A. 肾上腺素
- B. 去甲肾上腺素
- C. 抗组胺药
- D. 头孢氨苄
- E. 多巴胺

17. 氨基糖苷类药不良反应

- A. 心脏毒性
- B. 耳毒性
- C. 变态反应
- D. 头痛头晕
- E. 肝毒性

18. 患者自诉心前区疼痛 10 分钟，心电图 II、III、aVF 导联 ST 段上抬 0.15mV，最可能的诊断是

- A. 急性心包炎
- B. 心肌炎
- C. 典型心绞痛发作
- D. 变异型心绞痛发作
- E. 正常变异

19. 陈旧性下壁心肌梗死的心电图表现为

- A. II、III、aVF 有病理性 Q 波
- B. V₃、V₄ 有病理性 Q 波
- C. V₁、V₂ 有病理性 Q 波
- D. V₇、V₈ 有病理性 Q 波
- E. I、aVL、II、III、aVF 有病理性 Q 波

20. 心肌梗死与心绞痛心电图鉴别最有意义的是

- A. ST 段抬高
- B. ST 段抬高，伴高耸 T 波
- C. 异常(病理)Q 波
- D. 冠状 T 波
- E. T 波高耸

21. 目前发现心肌缺血及诊断心绞痛最常用的无创性检查方法是

- A. 胸片
- B. 心电图
- C. 核磁
- D. 冠状动脉造影
- E. 彩色多普勒超声

22. 心肌梗死心电图特征表现

- A. ST 段水平型下降
- B. 病理性 Q 波
- C. T 波地平
- D. 冠状 T 波
- E. ST 段抬高呈弓背向上型

23. 二尖瓣关闭不全最可靠的检查方法

- A. 心电图
- B. 心音图
- C. X 线检查

- D. 超声心动图
- E. 同位素心肌灌注

24. 下列情况中，不能通过心电图做出判断的是

- A. 心律失常
- B. 心室肥大
- C. 心脏损害
- D. 心功能不全
- E. 束支传导阻滞

25. 房颤心电图典型表现是

- A. 大小形态及规律不一致的 f 波替代窦性 P 波，QRS 波形正常 R-R 间期不等
- B. QRS 波形与下波消失，呈现不规则波形曲状线
- C. QRS 波形与下波消失，呈现相对规律快速大幅波动
- D. 规律锯齿状 f 波消失 QRS 波形异常
- E. QRS 规律性出现下波与 QRS 波相交出现完全代偿性间歇

26. 对诊断肺气肿有决定性意义的检查是

- A. 肺功能检查
- B. X 线胸片
- C. 血气分析
- D. 心电图检查
- E. 胸 CT 检查

27. 维生素 D 缺乏可导致

- A. 夜盲症
- B. 骨质疏松症
- C. 坏血病
- D. 出血倾向
- E. 巨细胞性贫血

28. 对腹部实质性脏器病变，最简单易行的检查方法是

- A. X 线腹片
- B. CT 扫描
- C. 同位素扫描
- D. B 型超声波
- E. 纤维内窥镜检查

29. 对临床疑诊自发性气胸病人，应首选的检查方法是

- A. B 型超声波
- B. 胸部 CT
- C. 胸部 X 线
- D. 磁共振成像
- E. 纤维支气管镜

30. 确诊前置胎盘首选

- A、产后检查胎膜破口距胎盘边缘 5cm
- B、腹部正位片子子宫体部无胎盘影
- C、窥器检查宫颈未见病变
- D、B 型超声检查可见胎盘覆盖宫颈内口
- E、阴道穹窿扪诊可发现宫颈口周围有软组织

31. 以下哪一项检查对确诊心包积液最有帮助

- A、X 线
- B、心电图
- C、胸部透视
- D、超声心动图
- E、心脏放射性同位素扫描

32. B 型超声波腹部检查前准备是

- A. 空腹 8h
- B. 饱餐后
- C. 饮水憋尿
- D. 进脂肪餐
- E. 肠导泻后进食

33. 食管癌最可靠的诊断方法是

- A. X 线吞钡
- B. CT 扫描
- C. 超声
- D. 内镜
- E. 黏膜脱落细胞

34. 对高危人群开展普查，是为了提高小肝癌的检出率，其主要手段是：

- A. 以 AFP 和超声显像做监测
- B. 查体
- C. 肝动脉造影
- D. CT 检查
- E. 详细询问病史

35. 排除颅内占位病变，哪一项是准确的

- A. 无视乳头水肿
- B. 颅平片无颅内压增高表现
- C. 叩诊小儿头颅无破壶音
- D. 脑超声中线波无移位

E. CT扫描无异常改变

36. 留置胸膜腔闭式引流管的病人出现引流管脱出，首先要

A. 给病人吸氧

B. 立即报告医生

C. 急送手术室处理

D. 把脱出的引流管重新插入

E. 用无菌凡士林纱布、厚层纱布封闭引流口

37. 在手术前的道德要求中，不正确的是

A. 医生必须先判断手术对病人的治疗是最优选择

B. 必须做到知情同意

C. 必须认真做好术前各项准备

D. 在抢救的情况下，病人不能签字又没有家属在场的情况下医生可以暂时不做手术

E. 医生在术前应尽量把可能发生的术后并发症如实列在知情同意书上

38. 常用于手术器械灭菌的是

A. 紫外线照射

B. 高压蒸汽灭菌法

C. 巴氏消毒法

D. 干热灭菌

E. 滤过除菌

39. 一中年男性患者因急性阑尾炎住院治疗，手术后，主管医生为了使患者尽快恢复，给患者使用了一种比较贵的新型抗生素，但并没有同患者商量。患者恢复很快，几天后就可出院。出院时，患者发现自己需付上千元的药费，认为医生没有告诉自己而擅自做主，自己不应该负担这笔钱。在这个案例中，医生损害了患者的哪个权利

A. 知情同意权

B. 疾病的认知权

- C.平等的医疗权
- D.要求保护隐私权
- E.患者的参与权

40.我国引起急性胰腺炎的最常见原因是

- A.酗酒及暴饮暴食
- B.手术创伤
- C.高 Ca^{2+} 血症
- D.病发流行性腮腺炎
- E.胆道疾病

41.椎管内麻醉不适用于

- A.甲状腺手术
- B.下腹部手术
- C.盆腔术
- D.下技术
- E.肛门及会阴部术

42、成人缺铁性贫血最常见的原因是

- A.饮食中缺铁
- B.需铁量增加
- C.胃大部切除手术
- D.慢性失血
- E.慢性溶血

43、治疗颅内肿瘤首选的方法是

- A.免疫治疗
- B.放射治疗
- C.手术治疗
- D.化学治疗
- E.脱水治疗

44、肺炎链球菌可引起疾病？

- A.支气管炎
- B.肺脓肿
- C.大叶性肺炎
- D.支气管哮喘
- E.胸膜炎

45、患者男 60 岁，多年的吸烟史，刺激性干咳半年，查体，x 线右肺门处不规则分叶状巨大阴影，边界不清，可能是

- A.大叶性肺炎
- B.小叶性肺炎
- C.原发性肺结核

- D.慢性纤维空洞型肺结核
- E.原发性肺癌

46、早期肺癌，首选的治疗方法，是

- A.药物治疗
- B.放射疗法
- C.放疗加化疗
- D.手术切除病肺
- E.免疫疗法

47、肺癌中预后最差的是

- A. 鳞癌
- B. 小细胞肺癌
- C. 腺癌
- D. 大细胞癌
- E. 肺泡细胞癌

48、中央型肺癌最典型征象是

- A.粘液性嵌塞征
- B.局限性肺气肿
- C.段或叶的肺不张
- D.阻塞性肺炎
- E.细支气管肺癌

49、苯海拉明的作用

- A.过敏性休克
- B.支气管哮喘
- C.晕动病
- D.消化性溃疡
- E.反流性食管炎

50、结核的主要传染途径

- A.消化道
- B.呼吸道
- C.皮肤伤口
- D.输血
- E.针头污染

51、消化道溃疡常见的症状是

- A.恶心
- B.呕吐
- C.腹胀
- D.腹痛
- E.消化道出血

52、男，30，突发腹痛，右腹剧痛，并向腹股沟放射，伴腹胀，恶心，体检体温正常，腹平软无压痛，及包块，右肾巨疼痛，尿常规 RBC5-10/HP 条最可能

- A. 消化道溃疡穿孔
- B. 慢性肾炎急性发作
- C. 夹层动脉瘤
- D. 肾结石
- E. 膀胱肿瘤

53、48 男，持续性腹痛 2 天，脐周为主，呕吐多次，无排便及排气，体检 T37℃，腹膨隆可见肠型及蠕动，全腹触痛脐周可扪及边界不清包块听诊鼓音，听诊肠鸣音活跃，有气过水声可能

- A. 消化道溃疡穿孔
- B. 肝破裂
- C. 肠蛔虫流
- D. 自发性腹膜炎
- E. 急性肠梗阻

54、脑脊液检验的适应证应除外

- A. 有脑膜刺激征
- B. 疑有颅内出血
- C. 疑有颅内压显著增高
- D. 疑有脑膜白血病
- E. 有剧烈头痛、昏迷、抽搐或瘫痪等症状及体征而考虑为神经系统疾患时

55、急腹症不包括

- A. 消化道穿孔
- B. 胃窦炎
- C. 肠套叠
- D. 急肠炎
- E. 肠扭转

56、右上腹剧痛伴腹水、休克可能：

- A. 肝包膜下大出血
- B. 肝癌结节破裂入腹腔
- C. 消化性溃疡穿孔
- D. 急性化脓性胆囊炎
- E. 腹膜转移癌

57、普萘洛尔的药理作用

- A. 扩张冠状动脉
- B. 降低潜伏和
- C. 降低左心室壁张力
- D. 阻断 β 受体降低心率降低心肌收缩力

E.扩张外周血管

58、匙状甲多见于

A.缺铁性贫血

B.风湿热

C.失心病

D.支扩

E.呼吸不良综合症

59、测量血压的方法不正确的是

A.袖带置于肘横纹上 2~3cm

B.示压管汞柱应置于 0 点

C.先安静一会儿再测量

D.听诊器胸件应塞在袖带下方

E.右臂外展与心脏在同一水平

60、下列疾病除哪项外均可引起咯血

A.肺结核

B.肺炎

C.支气管扩张

D.支气管哮喘

E.风湿性心脏病二尖瓣狭窄

61、正确的胸外按压的方法

A.背部垫硬板

B.部位在锁骨中线第 5 肋间

C.60-80 次/分

D.胸骨下陷 1-2cm

E.每按 5 次后进行 2 此次人工呼吸

62、心脏复苏用药途径，首选

A.肌注

B.静脉

C.气管内

D.皮下

E.皮内

63、医疗用毒性药品系指

A.连续使用后易产生身体依赖性，能成瘾癖的药品

- B. 毒性剧烈、治疗剂量与中毒剂量相近，使用不当会致人中毒或死亡的药品
- C. 正常用法用量下出现与用药目的无关的或意外不良反应的药品
- D. 直接作用中枢神经系统，毒性剧烈的药品
- E. 毒性剧烈、连续使用后易产生较大毒副作用的药品

64、氟哌啶醇临床禁用

- A. 焦虑性神经官能症
- B. 药物引起呕吐
- C. 精神分裂
- D. 躁狂症
- E. 心功能不全患者的躁狂

65、急性胃肠穿孔具有的特征性体征是()

- A. 腹部压痛
- B. 肝浊音界消失代之以鼓音
- C. 发热
- D. 胃振水音
- E. 移动性浊音

66、在非感染性发热中，属变态反应性疾病的是

A. 血清病

B. 中暑

C. 重度安眠药中毒

D. 大面积烧伤

E. 急性心肌梗死

67. 肺内局限性的湿罗音提示

- A. 急性肺水肿
- B. 炎性病变
- C. 胸腔积液
- D. 黏稠分泌物
- E. 支气管痉挛

68. 肺内局限性的湿啰音提示

A. 急性肺水肿

B.炎性病变

C.胸腔积液

D.黏稠的分泌物

E.支气管痉挛

69. 原发性妄想主要见于下列哪种疾病

A.恐惧症

B.抑郁症

C.神经衰弱

D.精神分裂症

E.强迫症

70. 抑郁症的核心症状是

A.情绪低落

B.思维贫乏

C.情绪高涨

D.幻觉

E.入睡困难

71. 脑血栓形成的最常见的病因是

A.高血压

B.脑动脉炎

C.红细胞增多症

D.先天性动脉狭窄

E.脑动脉粥样硬化

72. 危害行为发生率最高的精神疾病是

- A. 精神分裂症
- B. 躁狂症
- C. 抑郁症
- D. 反应性精神病
- E. 偏执性精神病

73. 心理应激最常见的反应是

- A. 恐惧
- B. 焦虑
- C. 愤怒
- D. 抑郁
- E. 兴奋

74. 丙型肝炎主要的传播途径是

- A. 输血
- B. 性交
- C. 粪口途径
- D. 日常生活接触
- E. 母婴传播

75. 表现为强迫性思维的是

- A. 抑郁症
- B. 急性精神分裂症
- C. 慢性精神分裂症
- D. 强迫性神经症
- E. 癔症性精神病

76. 脑内突然涌现出大量异己的奇怪念头，病人对此也感莫名其妙，且不能控制。这种症状可能是

- A. 思维奔逸
- B. 思维散漫
- C. 病理性象征性思维
- D. 强迫性思维
- E. 强制性思维

77. 患者，男，30岁，腹痛2小时，伴发热、恶心，查体右下腹麦氏点有压痛、反跳痛。最可能的诊断是

- A. 急性胃炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 消化性溃疡
- D. 急性阑尾炎

E.急性肠炎

78.病人呆坐于一旁，对医生的任何提问均不作回答，医生让其开口喝水时，患者却双唇紧闭。扭头逃避面前的杯子，该患者的症状可能是

- A.缄默症
- B.主动违拗
- C.被动违拗
- D.木僵
- E.作态

79.病人表现为不言，不动，不食。面部表情固定，对外界刺激缺乏反应，肢体可随意挪动，诊断为何种症状

- A.情绪低落
- B.情感淡漠
- C.情感紧张
- D.木僵
- E.痴呆

80.病人感觉自己的上肢变得很长，鼻子也变长了，这是什么症状

- A.人格解体
- B.非真实感
- C.感觉减退
- D.感知综合障碍
- E.感觉过敏

二、多选题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1.甘露醇可用于

- A.预防急性肾功能衰竭
- B.利尿辅助药
- C.青光眼
- D.脑水肿
- E.心脏性水肿

2.诊断心肌梗死哪三项最为重要

- A.剧烈的胸部疼痛，硝酸甘油不易缓解
- B.实验室检查血清酶的变化
- C.特征性心电图变化
- D.B 超对心脏的观察
- E.典型的临床表现

3.甲亢症的表现是

- A.紧张、易怒、怕热多汗
- B.肝大
- C.心率减慢

- D.大便次数增多
- E.突眼，眼裂增宽

4.精神分裂症青春型的特点是

- A.思维奔逸、情绪高涨、动作增多
- B.思维破裂离奇，令人难以理解
- C.情绪不稳、喜怒无常、行为紊乱、动作愚蠢
- D.性格改变、智力减退
- E.定向障碍

5.输血适应证包括

- A.血友病
- B.慢性贫血
- C.严重感染
- D.严重脱水
- E.输大量库存血后引起出血倾向

6.肝硬化失代偿期门脉高压症的表现有

- A.脾肿大
- B.出血倾向、贫血
- C.腹水
- D.侧支循环建立和开放
- E.雌激素增多

7.迅速判断心跳骤停的依据是

- A.心音消失
- B.血压测不到
- C.神志突然消失
- D.呼吸突然停止
- E.大动脉搏动消失

8.严重缺氧时会出现

- A.休克
- B.昏迷
- C.三凹征
- D.末梢紫绀
- E.烦躁不安、鼻翼煽动

9.下列哪些症状属广泛性焦虑症

- A.过分的紧张、恐惧，心慌意乱，惶惶不可终日
- B.局促不安、来回走动、搓手顿足、坐卧不宁
- C.思维迟缓、反应迟钝、无进取心
- D.胸闷、气促、尿频、尿急、口干、出汗、面红耳赤、胡思乱想
- E.反复洗手、关门

10.肝肾综合征包括

- A.大量蛋白尿
- B.低蛋白血症
- C.严重水肿
- D.高血压
- E.高脂血症

答案

一、单选题

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

66-70

71-75

76-80

二、多选题

1 ACD

2 ABC

3 AE

4 BE

5 ABC

6 ACD

7 CE

8 BCDE

9 ABD

10 ABCE