

## 乌兰察布卫生人才招聘真题

### 一. 单选题

1. 医生在治疗中确诊一名肝癌患者，他妥当的做法应是  
A. 对患者绝对保密  
B. 同时向患者本人及家属宣布病情危重程度  
C. 征求家属意见，尊重患者意愿，向患者家属如实交代病情  
D. 将诊断书直接交给患者本人
2. 医疗机构对医务人员考核要作为应聘、提薪、晋级以及评选先进工作者的首要条件应是()  
A. 业务能力考核  
B. 服务水平考核  
C. 学历情况  
D. 医德考核结果
3. 医务社会工作者在参与处理医患关系纠纷时，扮演的角色是（）。  
A. 倡导者  
B. 调解者  
C. 服务者  
D. 支持者
4. 某人已被确诊为某病，而本人否认自己有病，此人角色行为的改变属于（）  
A. 角色行为冲突  
B. 角色行为减退  
C. 角色行为强化  
D. 角色行为缺如
5. 清水利尿的原因（）  
A. 血管紧张素 II 减少  
B. 肾小球滤过率增大  
C. 抗利尿激素分泌减少  
D. 近球小管渗透压增高
6. 关于系统性红斑狼疮的临床表现，下列叙述中错误的是（）。  
A. 有发热，面部蝶形红斑与四肢多形性红斑  
B. 可出现类风湿性关节炎表现，但极少导致畸形  
C. 可有心肌炎，心包炎，疣状心内膜炎  
D. 可有心肌炎，心包炎，疣状心内膜炎

C. 可出现癫痫样抽搐或精神分裂症

7. 急性肾小球肾炎最常见的临床表现为（）。

- A. 少尿、水肿
- B. 少尿、高血压
- C. 血尿、水肿、高血压
- D. 水肿、高血压

8. 《医疗事故处理条例》规定，造成患者轻度残疾，器官组织损伤导致一般功能障碍的，属于几级医疗事故

- A. 一级甲等
- B. 一级乙等
- C. 二级
- D. 四级

9. 脊柱结核发生率最高的部位是

- A. 腰椎
- C. 胸椎
- D. 骶椎
- B. 尾椎

10. 体内、外均有抗凝血作用的药物是

- A. 维生素 B12
- B. 肝素
- D. 维生素 K
- C. 阿司匹林

11. 药物的不良反应包括（）。

- A. 耐受性
- C. 过敏反应
- D. 首过效应
- B. 特异质反应

12. 胆固醇体内合成的原料（）

- A. 胆汁酸盐和磷脂酰胆碱
- B. 17-羟类固醇和 17-酮类固醇
- C. 胆汁酸和 VD 等

- D. 乙酰 coA 和 NADPH
- E. 胆汁酸

13. 肾的钠感受器是()。

- A. 入球小动脉
- B. 出球小动脉
- C. 近球细胞
- D. 间质细胞

14. 心尖搏动位于第 5 肋间，左锁骨中线内( )

- A. 0~0.5cm
- C. 1.0~1.5cm
- D. 2.0~2.5cm
- B. 2.5~3.0cm

15. 下列哪一疾病患者的机体对紫外线敏感( )

- A. 黏液水肿患者
- C. 营养不良患者
- D. 足感染患者
- B. 手感染患者

16. 胸腔积液时症状明显的液体量()。

- B. 500ml 以上
- C. 300-500ml
- D. 5,000-10,000ml
- A. 1000ml

17 下列肺癌中最多见的是()。

- B. 腺癌
- C. 未分化大细胞癌
- D. 未分化小细胞癌
- A. 鳞状上皮细胞癌

18. 浸润性病灶 X 线表现为()。

- A. 斑点、条索、结节状，边缘清楚，密度较高
- B. 云雾状，密度较淡，边缘模糊
- C. 密度较高，浓淡不一，片状影
- D. 有环形边界的透亮区

19. 患者男性，60 岁，有吸烟史 30 余年，2 月来低热，咳嗽，痰中带血，X 线胸片示右肺门圆形阴影，为确定诊断最好行()。

A. 痰涂片革兰染色镜检

B. 痰、血细菌培养

C. 纤维支气管镜检查

D. 血清抗体检测

20. 疏松结缔组织的主要细胞构成 ( )

A.

B.

C.

D. 纤维

21. 小肠壁的内表面有大量的环形皱襞, 皱襞上有许多绒毛状的突起, 叫小肠 (A)

A. 绒毛

B. 鞭毛

C. 假鞭毛

D. 荚毛

22. 常用的吸入麻醉药 (D)

A.

B.

C.

D. 乙醚

23. 苯丙氨酸是人体必需的氨基酸之一。正常人每日需要的摄入量约为 200~500 毫克, 其中 1/3 供合成蛋白, 2/3 则通过肝细胞中苯丙氨酸羟化酶 (PAH) 的转化为 ( )

A. 酪氨酸

B.

C.

D.

24. 高渗性缺水, 低渗性缺水的不同点 ( )

A.

B.

C. 口渴

D.

26. Killip 分级用于评估急性心肌梗死患者的心功能状态, 以下错误的是哪个 ( )

A. I 级: 无肺部啰音和第三心音。

B. II 级: 肺部有啰音, 但啰音的范围小于 1/2 肺野。

C. III 级: 肺部啰音的范围大于 1/2 肺野 (肺水肿)。

D. IV 级: 昏迷。

27. 产后出血的常见原因 ( )

A. 子宫颈裂伤 B. 凝血功能障碍 C. 软产道损伤 D. 子宫收缩乏力

28. 在 ( ) 作用下胃蛋白酶原转换为胃蛋白酶

A. 胃酸

B.

C.

D.

30. 糖酵解时丙酮酸还原为 ( ), 所需的 NADH+H<sup>+</sup> 来自甘油醛-3-磷酸脱氢酶催化脱氢

A. 果糖

B. 单糖

C. 乳糖

D. 乳酸

31. mRNA 就是 message RNA, 也就是信使 RNA。是 gene ( ) 出来进行翻译的 RNA。

A. 翻译

B 转录

C 复制

D

32. 与单纯扩散相比, 易化扩散的特点是 ( )。

A. 转运的为小分子物质

B. 不需要细胞膜耗能

C. 顺浓度差转运

D. 需膜上蛋白质的帮助

的恶性肿瘤

33. 肉瘤是由 ( C )

A. 神经组织来源的恶性肿瘤

B. 间叶组织来源的良性肿瘤

C. 间叶组织来源

D. 上皮组织来源的良性肿瘤

34. 喉最大的软骨是 ( )

A. 甲状软骨

B. 会厌软骨

C. 环状软骨

D. 勺状软骨

35. 肺表面具有活性物质, 可以保持肺泡表面张力, 保证肺泡结构稳定性, 主要由 (D) A. 肺间质细胞分泌 B. 巨噬细胞分泌 C. I 型肺泡细胞分泌 D. II 型肺泡细胞分泌
36. 反射活动的结构基础称为 ( ) A. 反射带 B. 条件反射 C. 反射弧 D. 以上均不对
37. 醉酒吃 ( ) 解酒 A. 维生素 A B. 维生素 B C. 维生素 C D. 维生素 D
38. 呼吸运动的原动力是 ( ) A. B. C. D.
39. 下列哪项不是儿童肾病综合征的典型临床表现 ( ) A. 明显水肿 B. 高胆固醇血症 C. 大量蛋白尿 D. 尿中大量细菌
40. 下列哪项不是无排卵功血的特点 E A. 基础体温呈单项型 B. 好发于青春期和更年期 C. 阴道涂片提示雌激素中、高影响 E. 子宫内膜病理提示分泌不良
41. 以下哪项不是高泌乳素血症的临床表现 ( ) A. B. C. D
42. 一人打架肱骨骨折。出现垂腕那么是伤及了 ( ) 神经 A. 尺神经 B. 桡神经 C. 正中神经
43. 胃炎、胃溃疡和十二指肠溃疡是由幽门螺旋杆菌引起的, 下列关于该菌的叙述正确的是 A. 细胞中没有线粒体、核糖体等复杂的细胞器 B. 细胞中具有拟核, 核内有染色体 C. 构成细胞壁的物质中不含纤维素, 但含有糖类和蛋白质结合而成的化合物 (肽聚糖) D. 细胞中无含有核酸的细胞器
44. 呼吸机的原动力 ( )
45. 下列哪项不符合一期愈合 ( ) A. 组织缺损少、创缘整齐 B. 愈合时间短 C. 形成明显瘢痕 D. 伤口缝合严密
46. 医院感染是指 ( ) A. 住院病人在医院内获得的感染 B. 在住院期间发生的感染和在医院内获得出院后发生的感染 C. 不包括入院前已开始或入院时已处于潜伏期的感染 D. 医院工作人员在医院内获得的感染
47. 补体旁路激活途径首先激活的那一部分是 A. C1

- B. C2
- C. C3
- D. C4

48. 女, 30 岁, 1 周前左手被铁钉刺伤, 未作清创处理。近日, 出现头痛、咬肌紧张酸胀, 诊断为破伤风, 其发病机制中错误的是

- A. 破伤风是一种毒血症
- B. 毒素也可影响交感神经
- C. 破伤风杆菌产生的内毒素引起症状
- D. 痉挛毒素是引起症状的主要毒素

49. 血液从左心室射入()。

- A. 前腔静脉
- B. 后腔静脉
- D. 主动脉
- C. 肺静脉

50. 有关阿托品药理作用的叙述错误的是

- A. 抑制腺体分泌
- B. 扩张血管改善微循环
- C. 中枢抑制作用
- D. 松弛内脏平滑肌

51. 革囊胃的病理类型()。

- A. 浸润性
- B. 溃疡性
- C.

52. 患者, 女, 25 岁。大咯血急诊入院, 既往有反复咳嗽、大量脓痰及咯血病史。胸片示左下肺肺纹理紊乱。诊断最可能的是()

- A. 肺结核
- B. 肺炎
- C. 肺癌
- D. 肺脓肿

53. 逆行肾盂造影显示肾小盏杯口呈虫蚀状改变, 杯口附近肾实质内有团块状造影剂与杯口相连是

- A. 肾结石
- B. 肾实质肿瘤
- C. 肾盂肿瘤
- D. 肾结核

54. 下列关于轮状病毒性肠炎临床特点的描述那一项不正确(C)

- A. 夏秋季多发
- B. 以发热, 上感样症状起病
- C. 呕吐先于腹泻
- D. 便次多、量多、水分多

55. 病人腹痛, 恶心、呕吐, 肠鸣音亢进, 排便、排气停止, 应考虑的诊断是

- A. 急性阑尾炎
- B. 急性胰腺炎
- C. 急性胆囊炎
- D. 急性肠梗阻

56. 体内分子量最大的免疫球蛋白

- A. IgG
- B. IgM
- C. IgA
- D. IgD

57. 内脏性疼痛的特点不包括

- A. 疼痛范围不明显
- B. 疼痛部位定位准确
- C. 痛觉迟钝
- D. 疼痛持续、缓慢

58. 强调医务人员尊重病人及其家属的独立而平等的人格与尊严的原则是 C

- A. 公正原则
- B. 不伤害原则
- C. 尊重原则
- D. 有利原则
- E. 平等原则

59. 血中还原血红蛋白至少达多少时，皮肤粘膜可出现紫绀

- A.  $>70\text{g/L}$
- B.  $>65\text{g/L}$
- C.  $>60\text{g/L}$
- D.  $>55\text{g/L}$

60. 阿米巴病人

- A. 大便为水样便
- B. 黏液脓血便
- D. 米泔水样便
- C. 果酱样大便

61. 成年人生长激素分泌过多会导致

- A. 呆小症
- B. 侏儒症
- C. 肢端肥大症
- D. 黏液性水肿

62. 由病毒刺激人和动物组织细胞产生的一类糖蛋白是

- A. 干扰素
- B. NK 细胞
- C. 巨噬细胞
- D. CTL 细胞

63. 老年男性尿潴留最常见的原因是

- A. 尿道狭窄
- B. 尿道结石
- C. 前列腺增生
- D. 肿瘤

64. 当妊娠危及胎儿母亲的生命时，可允许行人工流产或引产，这符合 B

- A. 行善原则
- B. 不伤害原则

- C. 公正原则
- D. 尊重原则

65. 长期吸入二氧化硅( $\text{SiO}_2$ )()。

- A. 多发性肺脓肿
- B. 过敏性肺炎
- C. 过敏性鼻炎
- D. 矽肺

66. 患者男性, 50 岁。突发呼吸出难, 满肺哮鸣音, 心率快, 听不清有无杂音, 既往史不详, 应首选何药

- A. 洋地黄
- B. 异丙肾上腺素
- C. 肾上腺素
- D. 氨茶碱

67. 男性, 60 岁, 左侧腹部隐痛 2 个月, 大便次数增多, 5~6 次/日, 有黏液及脓血。查体: 左腹部似可触及包块, 有轻压痛, 最有诊断意义的检查是

- A. 血 CEA(癌胚抗原)检查
- C. 乙状结肠镜检查
- D. 全消化道造影
- B. 血常规+便潜血

68. 患者, 男性, 严重创伤后, 血压降低, 脉搏细速, 面色苍白, 诊断为休克, 治疗时重点应注意

- A. 急性肾功能衰竭的发生
- B. 及时扩充血容量
- C. 及时应用激素治疗
- D. 避免使用血管收缩药

69. 尿频, 尿痛, 血尿和脓尿为

- A. 肾结核的主要临床表现
- B. 肾结石的主要临床表现
- C. 膀胱癌的主要临床表现
- D. 前列腺增生症的主要临床表现

70. 45 岁男性, 心前区持续性疼痛 1 周。查体: 重病容, 体温  $38.8^{\circ}\text{C}$ , 血压  $100/70\text{mmHg}$ , 颈静脉怒张, 心界向两侧扩大, 心率 120 次/分, 心音弱, 心律整,



无杂音，心电图 I、II、III、aVF、aVL、V1~V5 导联 ST 段弓背向下抬高，T 波倒置，最可能的诊断是

- A. 变异型心绞痛
- B. 急性下壁兼广泛前壁心肌梗死
- C. 中间综合征
- D. 急性肺动脉栓塞

71. 对侧肾良好，伤肾严重肾积水，可施行

- A. 肾切除术
- B. 血管修复术
- C. 选择性肾动脉栓塞术
- D. 部分肾切除术

72. 关于气性坏疽的叙述，下列哪项是正确的

- A. 深在性开放性创伤合并厌氧产气菌感染所致
- B. 湿性坏疽合并厌氧菌感染所致
- C. 表皮擦伤合并腐败菌感染所致
- D. 干性坏疽合并厌氧菌感染所致

73. “虎斑心”是指哪种病变的肉眼观？（ ）

- A. 心肌细胞水肿
- B. 心肌细胞脂肪变伴淤血
- C. 心肌间质黏液样变性
- D. 心肌间质淀粉样变

74. 心肌细胞一般不发生（ ）

- A. 脂肪变性
- B. 细胞水肿
- C. 凝固性坏死
- D. 增生玻变

75. 有横突孔的椎骨是

- A. 腰椎
- B. 胸椎
- C. 骶椎
- D. 颈椎

76. 休克指数是指（ ）

- A. (脉率+脉压)-111
- B. 脉率/舒脉压
- C. 脉率/收缩压
- D. 舒张压/脉率

77. 国家药品不良反应监测中心设在（ ）

- A. 中国药品生物制品检定所

- C. 国家食品药品监督管理局药品审评中心
- D. 国家药品监督管理局安全监管司
- B. 国家药品监督管理局

78. 药品不良反应监测专业机构的人员应由 ( )

- B. 医学、药学及有关专业的技术人员组成
- C. 医学技术人员组成
- D. 药学技术人员组成
- A. 有关专业技术人员组成

79. 下列传染病中属于乙类传染病的是

- A. 艾滋病
- B. 霍乱
- C. 鼠疫
- D. 流行性感冒
- E. 肺结核

80. 下列哪项不是生命体征 ( )

- A. 表情
- B. 呼吸
- C. 体温
- D. 瞳孔

## 二. 多选题

81. 支配心脏的神经包括 (AD)

- A. 交叉神经
- B. 心脏神经
- C. 膈神经
- D. 副交叉神经
- E. 胸腔神经

82. 高渗性脱水易出现 ( )

- A. 口渴
- B. 休克
- C. 尿少
- D. 脱水热
- E. 皮肤弹性低

83. 肾病综合征产生全身性水肿的主要机制有 ( )

- A. 血浆胶体渗透压下降
- B. 醛固酮分泌增多
- C. 肝脏合成清蛋白减少
- D. 抗利尿激素分泌增多
- E. 肾小球滤过率增加

84. 乙型病毒性肝炎传播的途径有 ( )

- A. 消化道传播
- B. 母婴传播
- C. 呼吸道传播
- D. 性接触传播
- E. 血性传播

85. 低蛋白膳食适用于 ( )

- A. 急性肾炎病人
- B. 尿毒症病人
- C. 心脏病病人
- D. 肝衰竭病人
- E. 中毒烧伤病人

86. 内脏痛觉的特点包括 ( )

- A. 定位准确      B. 有牵涉痛      C. 对烧伤敏感      D. 对炎症, 切割敏感  
E. 对缺血敏感

87. 上呼吸道包括 ( )

- A. 鼻      B. 咽      C. 喉      D. 气管      E. 支气管

88. DIC 病人发生出血的机制是 ( )

- A. 大量血小板被消耗      B. 纤溶系统被抑制  
C. 各种凝血因子大量消耗      D. 维生素 K 严重缺乏      E. 大量 FDP 产生, 它有抗凝作用

89. 病人的权利包括 ( )

- A. 基本医疗权      B. 保护隐私权      C. 要求赔偿权      D. 要求安乐死权      E. 知情同意权

90. 以下哪些疾病常有晕厥发生并可能猝死 ( )

- A. 预激综合征      B. 肥厚型心肌病      C. 室间隔缺损      D. 主动脉瓣狭窄      E. 心室颤动

91. 下列哪些因素可能与自身免疫疾病有关 ( )

- A. 微生物感染      B. 环境因素      C. 基因缺陷      D. 遗传因素      E. 激素水平异常

92. 恶性肿瘤全身转移的治疗包括 ( )

- A. 化学治疗      B. 手术治疗      C. 免疫治疗      D. 放射治疗      E. 中医药治疗

93. 急性颅内压增高常见于 ( )

- A. 急性颅内血肿      B. 慢性硬膜下血肿      C. 颅内肿瘤  
D. 蛛网膜下腔出血      E. 高血压脑出血

94. 小儿黄疸常用照射灯 ( )

- A. 红灯      B. 蓝灯      C. 绿灯      D. 黄灯      E. 红灯和黄灯

95. 致命性创伤是指 ( )

- A. 大出血      B. 窒息      C. 开放性或张力性气胸  
D. 多发性骨折      E. 颅脑损伤

### 三. 判断题

96. 菌血症系指血培养检出病原菌者。 ( )

97. 在特殊情况下，为了查清死者的病因，判断诊断治疗的谬误，有利于医学科学的发展，虽未征得死者生前同意或家属的首肯，经有关特定部门的批准，也可以进行尸体解剖。（）
98. 肺循环始至右心室，止于左心室。（）
99. 成人 24 小时尿量少于 400ml 或每小时尿量少于 17ml，称为少尿。（）
100. I 型呼吸衰竭病人既有动脉血氧分压降低，又伴有动脉血二氧化碳分压升高。（）
101. 子宫位于小骨盆中央，膀胱与直肠之间，子宫颈下端不低于坐骨棘水平。（）
102. ABO 血型不合而引起的血反应的发生机制属于 II 型变态反应。（）
103. LD<sub>50</sub> \ ED<sub>50</sub> 越大，药物毒性越大。（）
104. 吗啡中毒时用纳洛酮解救。（）
105. 肺水肿时，气体弥散距离增大，导致气体弥散障碍。（）