

合肥市卫生系统招聘护理专业工作人员

护理学专业知识参考解析

一、单选题

1、患者林某因破伤风入院，神志清楚，全身肌肉阵发性痉挛，抽搐，下列病室环境条件中，哪项不符合病情要求

- A、保持病室光线充足
- B、相对湿度 50%-60%
- C、室温 18 度-20 度
- D、门、椅脚订橡皮垫

答案：A

解析：破伤风患者应放置在避光、安静的房间。

2、热射病是一种致命性疾病，可发生于任何年龄的人，典型的临床表现为

- A、牙痛、反跳痛、肌紧张
- B、高热、无汗、意识障碍
- C、低血压、呼吸困难、心律失常
- D、头痛、恶心、呕吐

答案：B

解析：热射病是重症中暑的一种，高温环境下大量出汗不足以散热或体温调节功能障碍出汗减少，造成体内热蓄积以高热、无汗、意识障碍“三联征”为临床表现体温迅速升高，可达 40℃

3、口腔护理时、口腔白色念珠菌感染选用的漱口液是

- A、0-1%醋酸溶液
- B、1-3%过氧化氢溶液
- C、1-4%碳酸氢钠溶液
- D、2-3%硼酸液

答案：C

解析：口腔白色念珠菌感染是真菌感染，真菌喜欢在酸性环境下生存，所以给予 1-4%碳酸氢钠溶液碱性溶液。

4、夏某，男，1 岁，因上感入院，T39.7℃、P120 次/分，呼吸 27 次/分，青霉素皮试阴性后遵医嘱给予青霉素 40 万单位 im qid，为该患儿肌内注射应选择部位是

- A、臀大肌
- B、臀中小肌
- C、三角肌
- D、股外侧肌

答案：B

解析：成人肌肉注射的部位是臀大肌，小儿注射部位首选臀中肌和臀小肌。

5、胎盘的组成包括

- A、羊膜、包蜕膜、底蜕膜
- B、羊膜、底蜕膜、真蜕膜
- C、包蜕膜、底蜕膜、真蜕膜
- D、羊膜、叶状绒毛膜、底蜕膜

答案：D

解析：胎盘的组成包括羊膜、叶状绒毛膜、底蜕膜。

6、在护理肝硬化严重腹水的患者时、其饮食应注意给予

- A、无盐低钠饮食
- B、低脂饮食
- C、低蛋白饮食
- D、高蛋白饮食

答案：A

解析：肝硬化严重腹水的患者应控制钠盐的摄入

7、左心衰最早出现的症状是

- A、端坐呼吸
- B、夜间阵发性呼吸困难
- C、刺激性干咳
- D、劳力性呼吸困难

答案：D

解析：劳力性呼吸困难是左心衰最早出现的症状

8、新生儿硬肿症重度低体温是指体温低于

- A、30℃
- B、31℃
- C、32℃
- D、33℃

答案：A

解析：早期哺乳差，哭声低，反应低下，病情加重后体温<35℃，严重者<30℃，腋温—肛温差由正值变为负值，感染或夏季发病者不出现低体温。

9、静脉输液的目的不包括

- A、纠正体内水电解质及电解质平衡
- B、输入药物、治疗疾病
- C、补充营养、维持能量
- D、增加血红蛋白、纠正贫血

答案：D

解析：静脉输液的目的：1.输入液体和药物以达解毒、治疗和控制感染的目的。2.补充营养及水分，维持和调节体内水、电解质及酸碱平衡。3.补充体液，纠正血容量不足，改善微循环，回升血压。4.输入脱水剂，降低颅内压，减轻或消除腹水及组织水肿。

10、林某，男，35岁，CT示颅内肿物，近日神志恍惚，语无伦次，躁动不安，答非所问，此情况为

- A、精神错误
- B、意识模糊
- C、谵妄
- D、浅昏迷

答案：C

解析：谵妄是指一组综合征，表现为意识障碍、行为无章、没有目的、注意力无法集中、躁动不安。通常起病急，病情波动明显。患者的认知功能下降，觉醒度改变、感知觉异常、日夜颠倒。

11、青霉素过敏引起的血清病型反应的表现是

- A、胸闷气促
- B、面色苍白血压下降
- C、头晕眼花、四肢麻木
- D、发热淋巴结肿

答案：D

解析：青霉素过敏反应的临床表现有过敏性休克、血清病型反应与各器官或组织的过敏反应三种。血清病型反应一般在用药后7~12天内发生，临床表现与血清病相似，属III型变态反应，可见发热，荨麻疹，关节肿痛，淋巴结肿大，腹痛，皮肤发痒等。

12、输血反应中最严重的是

- A、发热反应
- B、过敏反应
- C、急性肺水肿
- D、溶血反应

答案：D

解析：输血反应包括发热反应、过敏反应、急性肺水肿、溶血反应等，其中以溶血反应最严重。

13、对昏迷患者、婴幼儿等难以表达自己主观意识的患者，适用的护患关系模式为

- A、主动-被动型
- B、指导-合作型
- C、平等-互动型
- D、共同-参与型

答案：A

解析：这种模式是反映患者置于被动地位，而医护人员处于主动的主导地位的一种模式，常用于手术、麻醉、抗感染治疗等技术。对休克、昏迷、某些精神疾病、智力严重低下等病，这种模式是适合的。在这种模式之下，医护人员为患者做某事，患者就好像是不能自助的婴幼儿，医护人员则形同他们的父母。

14、对心跳骤停的成人患者施行首次单相波电除颤，一般除颤电能为

- A、<200j
- B、200j

C、300j

D、360j

答案：D

解析：自动体外除颤仪(AEDs)包括单相波和双相波两类除颤波形。不同的波形对能量的需求有所不同,单相波形电除颤:临床上首次即除颤能量选择为 360J。

15、临床患者的最早心理反应期是

A、接受期

B、协议期

C、否认期

D、愤怒期

答案：C

解析：临床患者的心理反应期：否认期、愤怒期、磋商期、忧郁期、沮丧期和接受期。

16、王某、女、35岁、患胃炎多年、现胃痛难忍、10:00am 医生开医嘱“克洛曲、1#、sos”其医嘱有效期为

A、6小时

B、12小时

C、24小时

D、48小时

答案：B

解析：sos：临时备用医嘱：临时备用医嘱必要时用，仅在12小时内有效，过期尚未执行即失效。

17、急性肾小球肾炎最常见的临床表现为

A、少尿、水肿

B、少尿、高血压

C、血尿、水肿、高血压

D、血尿、水肿、高血压、肾功能衰竭

答案：C

解析：急性肾小球肾炎是以急性肾炎综合征为主要临床表现的一组原发性肾小球肾炎。其特点为急性起病，血尿、蛋白尿、水肿和高血压，可伴一过性氮质血症，具有自愈倾向。

18、血浆蛋白浓度下降时，引起水肿的原因是由于

A、血浆胶体渗透压下降

B、血浆晶体渗透压下降

C、毛细血管的通透性增加

D、淋巴回流量减少

答案：A

解析：血浆蛋白浓度下降时，引起水肿的原因是由于血浆胶体渗透压下降。

19.肺炎球菌肺炎患者的痰液特点为

A. 大量浓痰

B.红棕色胶冻性痰

C.红色泡沫样痰

D.铁锈色痰

答案：D

解析：多见于肺炎链球菌红色肝变期，此时肿大肺叶充血，肺泡内红细胞被巨噬细胞吞噬、崩解后，形成含铁血黄素随痰液咯出，致铁锈色痰。

20.静脉使用下列哪种药物时，应注意避光

A. 硝酸甘油

B. 青霉素

C. 苄胺唑啉

D. 硝普钠

答案：D

解析：硝普钠为鲜红色透明粉末状结晶，易溶于水，液体呈褐色性质不稳定，需要注意避光

21.原发性血小板减少性紫癜急性型慢性型或急性发作期首选应用的治疗是

A. 肾上腺素皮质激素

B.脾切除

C.免疫抑制剂

D.输血小板

答案：A

解析：原发性血小板减少性紫癜首选肾上腺糖皮质激素

22. SLE 最具有典型性的皮肤损害是

A.环形红斑

B.瘀点、瘀斑

C.面部蝶形红斑

D.荨麻疹

答案：C

解析：皮肤和黏膜表现多种多样，大体可分为特异性和非特异性两类。特异性皮损：有蝶形红斑、亚急性皮肤红斑狼疮、盘状红斑。

23.伤寒玫瑰疹常出现在病程的

A. 1~6 天

B. 7~13 天

C. 14~20 天

D. 21~28 天

答案：B

解析：伤寒玫瑰疹常出现在病程的第 7~13 天

24.张某，男，58 岁，原有高血压、糖尿病、高脂血症，有一侧上下肢麻木及活动无力，昨夜睡眠好，但今晨起床突然跌倒，家人扶起后发现患者口眼歪斜，右侧上下肢瘫痪，但意识清楚，应考虑为

A.脑血栓形成

B.脑梗死

C.蛛网膜下腔出血

D.短暂性脑缺血

答案：A

解析：中年男性，既往有高血压、糖尿病、高血脂病史，是脑血管疾病的危险因素。起病缓慢，病程已有数日，有右侧肢体麻木及活动无力的前驱症状，今日睡醒后发病，无意识障碍，以右侧偏瘫和面瘫为主要症状，考虑脑血栓形成可能性大。

25.烧伤休克补液治疗，第1个8小时输入24小时液体总量的

A.1/4

B.1/3

C.1/2

D.2/3

答案：C

解析：烧伤休克补液治疗，第1个8小时输入24小时液体总量的1/2，余下的1/2在接下来的16小时内输完。

26.腹水患者行腹腔穿刺放液，初次放液量应控制在多少毫升以下

A.500 ml

B.1000 ml

C.1500 ml

D.2000ml

答案：B

解析：腹腔穿刺放液首次放液不超过1000ml，以后腹腔穿刺抽液每次不超过3000—4000ml，肝硬化患者每次不超过3000ml。

27.关于急性胆囊炎的临床表现，下列哪项是错误的

A.右上腹持续性疼痛，阵发性加剧

B.可向右肩部放射

C.右上腹压痛

D.多数有轻度黄疸

答案：D

解析：主要症状为右上腹痛、恶心、呕吐与发热。患者常首先出现右上腹痛，向右肩背部放射，疼痛呈持续性，阵发性加剧，可伴有恶心、呕吐，后期表现发热，多为低热，寒战、高热不常见，早期多无黄疸，当胆管并发炎症或炎症导致肝门淋巴结肿大时，可出现黄疸。

28.低渗性脱水早期的临床特征是

A.表情淡漠

B.尿量减少

C.周围循环功能障碍

D.弹性减弱

答案：C

解析：低渗性脱水早期的临床特征是周围循环功能障碍，早期可不伴有尿量减少症状。

29.关于完全胃肠外营养护理，下列哪项是错误的

- A.营养液在无菌条件下配置
- B.配制的营养液 24 小时内用完
- C.导管定期消毒
- D.暂时不输的营养液常温防置

答案：D

解析：配置好的营养液应该在 24 小时内用完，如暂时不用可以放置在 4℃冷藏库中。

30.言某，男，68 岁，胃癌，胃切除术后第 7 天，因咳嗽而自觉腹部有崩裂声，自觉有水流
出，检查发现切口裂开有约 0.5m 小肠脱出，首先应采取的措施是

- A.立即将脱出肠管送回腹腔
- B.立即通知医生，并协助医生消毒肠管后送回腹腔
- C.安慰患者，立即用无菌盐水纱布覆盖，加腹带包扎，送手术室处理
- D.立即用无菌盐水纱布覆盖，送换药室处理

答案：C

解析：此患者首先要保护好伤口，立即用无菌盐水纱布覆盖，加腹带包扎，送手术室紧急手术。

31.李先生，38 岁，被开水烫伤右手和右下肢，右侧腹部也有 3 个手掌大小的烫伤创面，创
面水肿明显，剧烈疼痛，局部与大小不等的水泡，其烧伤面积和深度是

- A、23% 浅Ⅱ度
- B、25.5% 深Ⅱ度
- C、26% 浅Ⅱ度
- D、31% 浅Ⅱ度

答案：C

解析：右手是 2.5%，右下肢是 20.5%，3 个手掌大小是 3.75%，总共是 26.75%，局部有水泡
水肿明显，剧烈疼痛，应该是浅Ⅱ度。

32.某男，55 岁，创伤至硬脑膜外血肿，该患者意识障碍的典型表现是

- A.短昏迷
- B.中间清醒期
- C.持续昏迷
- D.昏迷程度时重时轻

答案：B

解析：由于伴发的脑损伤较，伤后原发性昏迷时间较短，出现中间清醒期或中间好转期较多，伤后持续昏
迷者少。

33.下述哪项是早期宫颈癌的临床症状

- A.更年期周期短的阴道流血
- B.生育年龄月经前后的点滴出血
- C.接触性出血
- D.绝经后的出血

答案：C

解析：早期宫颈癌的临床症状是出血，年轻患者常表现为接触性出血，发生在性生活后或妇
科检查后。

34.某妇女，28岁，平素月经规律，26~28天一次，每次持续4天，其月经第一天是10月1日，今天是10月3日，其子宫内膜处于

- A.月经期
- B.增生期
- C.分泌期
- D.月经前期

答案：A

解析：月经周期分3期：月经期；增生期；分泌期，月经期1-4天，增生期5-14天，分泌期15-28天

35.孕38周，初产妇，骨盆外测量正常，胎头双顶径9.3cm，规律宫缩4小时，宫口开1cm，未破膜头先露，此时合理的处理是

- A.抬高床尾
- B.做肛门检查1次/3小时
- C.静滴催产素
- D.灌肠刺激宫缩

答案：D

解析：题干上骨盆和双顶径均正常，规律宫缩4小时，产程进展慢，需要人为干预，给予灌肠刺激宫缩。

36.王女士51岁，自觉近年月经不规律，行经2-3天干净，量比以前较少，自感阵发性潮热、出汗、偶有心悸，眩晕。妇检子宫稍小，其余正常。护士应向其提供的知识是

- A.黄体功能不足
- B.排卵型出血
- C.更年期综合征
- D.神经衰弱

答案：C

解析：根据患者的年龄和经期特点应该是更年期综合征的症状。围绝经期综合征中最典型的症状是潮热、潮红。多发生于45~55岁，大多数妇女可出现轻重不等的症状，有人在绝经过渡期症状已开始出现，持续到绝经后2~3年，少数人可持续到绝经后5~10年症状才有所减轻或消失。人工绝经者往往在手术后2周即可出现围绝经期综合征，术后2个月达高峰，可持续2年之久。

37.新生儿窒息，首选

- A.吸氧
- B.清理呼吸道
- C.刺激呼吸
- D.纠正酸中毒

答案：B

解析：新生儿窒息首先应清理呼吸道，保持呼吸道的通畅。

38.胎儿通过胎盘可以从母体获得

- A. IgA
- B. IgM

C. IgG

D. IgE

答案：C

解析：IgG 是免疫球蛋白 G 的缩写，是血清主要的抗体成分，约占血清 Ig 的 75%。其中 40~50% 分布于血清中，其余分布在组织中。IgG 是唯一可以通过胎盘的免疫球蛋白。IgG 的功能作用主要在机体免疫中起保护作用，大多数抗菌、抗病毒；应对麻疹、甲型肝炎等，能有效地预防相应的感染性疾病。

39. 患儿男 7 岁，发热咳嗽咳痰 6 天，痰液粘稠，不易咳出，查体：体温 37.5℃，呼吸 24 次/分，肺部听诊少许湿罗音，此时最恰当的护理

A. 超声雾化吸入

B. 镇咳

C. 面罩吸氧

D. 对患儿和家长进行健康教育

答案：A

解析：患儿痰多粘稠不易咳出者，应协助其排痰促进痰液的排除，采用超声雾化吸入可以达到化痰止咳效果。

40. 无反应的气道梗阻成人患者，应采取的措施不包括

A. 启动 EMS 系统

B. 开放气道

C. 心电监护

D. 清除口腔内异物

答案：C

解析：无反应的气道梗阻者应迅速启动 EMS 系统、开放气道、清除口腔内异物，不包括心电监护。EMS：救援医疗服务，也称“急救”。

41. 颈外静脉的穿刺点是

A. 下颌角与锁骨上缘中点连线的上 1/3 处

B. 下颌角与锁骨上缘中点连线的上 1/2 处

C. 下颌角与锁骨上缘中点连线的下 1/3 处

D. 下颌角与锁骨下缘中点连线的上 1/3 处

答案：A

解析：颈外静脉输液穿刺点是下颌角和锁骨上缘中点连线之上 1/3 处，颈外静脉外缘进针。

42. 水痘的传染期是

A. 潜伏期至结痂

B. 前驱期至出疹

C. 发热至痂脱落

D. 出疹前一天至皮疹全结痂为止

答案：D

解析：水痘多发生在冬末、初春季节。9 通过直接接触、飞沫、空气传播。水痘结痂后病毒消失，故传染期自出疹前 24 小时至病损结痂，约 7~8 天。

43. 急性心肌梗死患者 50%-80% 有前兆表现，最常见的表现是

- A.新发心绞痛，原心绞痛加重
- B.自发心绞痛
- C.稳定型心绞痛
- D.变异型心绞痛

答案：A

解析：急性心肌梗死还可伴有乏力胸部不适，活动时心悸，气急，烦躁，心绞痛等前驱症状，其中以新发生心绞痛和原有心绞痛加重最为突出，心绞痛发作较以前频繁，硝酸甘油疗效差，应警惕心梗的可能。

44.急性肺水肿的护理，不正确的是

- A.西地兰
- B.坐位，腿下垂
- C.持续低流量吸氧
- D.吗啡皮下注射

答案：C

解析：体位：取坐位或半卧位，两腿下垂，以减少静脉回流。吸氧：高流量 6-8L/分

45.同时抽取几种血标本，注入容器的顺序是

- A.血培养瓶——抗凝管——干燥管
- B.干燥管——抗凝管——血培养瓶
- C.血培养瓶——干燥管——抗凝管
- D.干燥管——血培养瓶——抗凝管

答案：A

解析：同时抽取不同种类的血标本时，一般注入容器的顺序：血培养瓶——抗凝管——干燥试管

46.陈先生 45 岁，多次腹泻，粪便果酱样，入院初诊“阿米巴痢疾”，医嘱灭滴灵灌肠，护理措施正确的是

- A.灌肠前臀部抬高 20cm
- B.灌肠液面与肛门距离 40-60cm
- C.灌肠取右侧卧位
- D.灌入药液量小于 500ml

答案：C

解析：阿米巴痢疾病变多在回盲部，采取右侧卧位，以提高治疗效果。臀部抬高 10cm。液面与肛门的距离<30cm，灌入液量<200ml

47.静脉输血发生溶血反应，首先应

- A.报告医生
- B.抽血查血型，重作交叉配血
- C.静注异丙嗪 25mg
- D.立即停止输血

答案：D

解析：静脉输血发生溶血反应，首先应立即停止输血，保留余血；采集患者血标本重做血型鉴定和交叉配血试验；安慰患者；③口服或静脉滴注碳酸氢钠，以碱化尿液，防止或减少血

红蛋白结晶阻塞肾小管；双侧腰部封闭或用热水袋敷双侧肾区，防止肾血管痉挛，保护肾脏；

48.无菌持物钳的正确使用方法是

- A.可夹取任何无菌物品
- B.取放无菌持物钳，钳端应闭合
- C.门诊换药室，无菌持物钳每周消毒一次
- D.远处取物，速去速回

答案：B

解析：无菌持物钳（镊）不可用于夹取油纱条，门诊换药室，无菌持物钳每天消毒，远处取物应将无菌容器一起搬过去。

49.早产儿容易发生出血的原因之一是缺乏

- A.维生素 A
- B.维生素 D
- C.维生素 K
- D.维生素 E

答案：C

解析：新生儿出血症即新生儿维生素 K 缺乏性出血症，是新生儿较常见的出血性疾病。以往也称为新生儿自然出血，其发病是由于体内维生素 K 缺乏。

50.灰黄、泡沫白带，量多，稀薄，可能为

- A.滴虫性阴道炎
- B.霉菌性阴道炎
- C.慢性宫颈炎
- D.老年阴道炎

答案：A

解析：滴虫性阴道炎多数病例无症状，妇女有不适的感觉可能持续 1 周或几个月，然后会因月经或怀孕而明显好转，阴道黏膜发炎，呈鲜红色，上覆斑片状假膜，常伴泡沫样分泌物，自觉不同程度瘙痒，少数有灼热感。白带增多变黄绿色。

51.人工呼吸机的工作原理是借助机械建立

- A.肺泡与气道通口压力差
- B.肺泡与肺静脉入口压力差
- C.肺泡与肺动脉入口压力差
- D.肺动脉与肺静脉压力差

答案：A

解析：人工呼吸机的工作原理是借助机械建立肺泡与气道通口压力差,分为正压呼吸和负压呼吸。

52.吸气性呼吸困难多见于

- A.喉头水肿
- B.代谢性酸中毒
- C.支气管哮喘
- D.呼吸中枢衰竭

答案：A

解析：吸气性呼吸困难见于各种原因引起的喉、气管、大支气管的狭窄与梗阻：①喉部疾患，如急性喉炎、喉水肿、喉痉挛、白喉、喉癌等；②气管疾病，如支气管肿瘤、气管异物或气管受压(甲状腺肿大、淋巴结肿大或主动脉瘤压迫)等。其特点是吸气显著困难，高度狭窄时呼吸肌极度紧张，胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙在吸气时明显下陷(称为三凹征)，常伴有频繁干咳及高调的吸气性喘鸣音。

53.以下需要按人类需要层次理论排列护理计划的优先顺序，正确的是

- A.水电平衡、感官刺激、发挥自我潜能、受到赞扬、友情
- B.氧和循环、免受伤害、正常的体温、营养、娱乐、友谊、受尊重
- C.尊重、活动和锻炼、营养、感官刺激、友谊、与家人关系和睦
- D.氧和循环、活动与锻炼、免受伤害、良好的护患关系、有尊严

答案：D

解析：人类需求像阶梯一样从低到高按层次分为五种，分别是：生理需求、安全需求、爱与归属的需要、自尊的需求和自我实现需求。

54.全麻前给予抗胆碱药的作用是

- A.镇痛
- B.减少呼吸道分泌物
- C.对抗局麻药毒性
- D.抑制脚杆神经兴奋

答案：B

解析：阻滞M胆碱受体的药物，可呈现抑制腺体分泌、散大瞳孔、加速心率、松弛支气管平滑肌和胃肠道平滑肌等作用，临床上用作散瞳药、制止分泌药和解痉止痛药等。

55.属于二级医疗事故的是

- A.造成患者死亡、残疾
- B.患者中度残疾、器官组织严重功能障碍
- C.患者轻度残疾、器官组织一般功能障碍
- D.造成患者明显人身损害的其他后果的

答案：B

解析：根据对患者人身造成的损害程度，医疗事故分为四级：

一级医疗事故：造成患者死亡、重度残疾的；

二级医疗事故：造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍的；

三级医疗事故：造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的；

四级医疗事故：造成患者明显人身损害的其他后果的。

56.引导交谈，哪一种属于开放式提问

- A.您父母有高血压病史吗？
- B.您对手术有顾虑吗？
- C.您每天几次排便？
- D.您今天感觉怎样？

答案：D

解析：开放式提问——是指提出比较概括、广泛、范围较大的问题，对回答的内容限制不严

格，给对方以充分自由发挥的余地。这样的提问比较宽松，不唐突，也常得体。特点：常用于访谈的开头，可缩短双方心理、感情距离，但由于松散和自由，难以深挖。

57. 王女士，27岁，怀孕9个月，阴道无诱因流水样液2小时，急诊入院，诊断为胎膜早破，此患者取卧位

- A. 头高脚低位
- B. 去枕平卧位
- C. 头低脚高位
- D. 膝胸卧位

答案：C

解析：胎膜早破者，胎头未衔接时，采取头低脚高位预防脐带脱垂。

58. 患者的满意度是临床护理工作的

- A. 要素质量评价
- B. 终末质量评价
- C. 护理人员素质评价
- D. 环节质量评价

答案：B

解析：患者满意度是指人们基于在健康、疾病、生命质量等诸方面的要求而对医疗保健服务产生某种期望，对所经历的医疗保健服务情况进行的一种评价。是临床护理工作的终末质量评价。

59. 某男，31岁，因腹痛腹泻2天，急诊入院诊断为急性肠炎，护理体检，精神萎靡，体温39.5℃，粪便水样。护士收集资料，属于主观资料的是

- A. 体温39.5℃
- B. 呕吐物为酸臭味约300ml
- C. 腹脐周阵发隐痛3小时
- D. 粪便稀黄，少量脓血

答案：C

解析：ABD都是客观指标，只有C是主观表现，患者主诉的症状。

60. 急性胰腺炎患者禁食脂肪的目的是

- A. 防止呕吐
- B. 减轻腹痛
- C. 减轻腹胀
- D. 减少胰液分泌

答案：D

解析：急性胰腺炎患者禁食脂肪的目的是为了减少胰液分泌，减轻胰腺的负担。

二、多项选择题

61. 下列哪些可列为高危新生儿（）

- A. 高危孕妇分娩的新生儿
- B. 孕妇第4胎分娩的新生儿
- C. 有妊娠疾病史分娩的新生儿

- D.曾有死胎死产史孕妇分娩的新生儿
- E.出生时 Apgar 评分低于 7 分的新生儿

答案：ACDE

解析：有以下情况可列为高危新生儿：① 母亲有糖尿病史，孕期阴道流血史、感染史，孕期吸烟、吸毒、酗酒史，母亲为 Rh 阴性血型，过去有死胎、死产史；② 异常分娩史，包括母亲有妊娠期高血压、先兆子、羊膜早破、羊水胎粪污染、各种难产、手术产；③ 出生时异常，如 Apgar 评分

62.流行性乙型脑炎发生惊厥抽搐的原因是（）

- A.脑实质炎症
- B.脑疝
- C.脑水肿
- D.高热
- E.脑缺氧

答案：ABCDE

解析：流行性乙型脑炎发生惊厥抽搐的原因包括脑实质炎症、脑疝、脑水肿、高热、脑缺氧等。

63. 关于女性正常骨盆，下列说法正确的是（）

- A. 骨盆是由骶骨、尾骨和左右两块髋骨组成
- B. 骨盆以耻骨联合上缘，两侧髂耻线及 骶岬上缘为界分为真假骨盆
- C. 骨盆的三个假象平面中，中骨盆平面为骨盆最小平面
- D. 妇女直立时，骨盆轴上段向后，中段向下，下段向下向前
- E. 骨盆底由多层肌肉和筋膜组成，起到承载和支持盆腔脏器的作用

答案：ABCDE

解析：骨盆由骶骨、尾骨和左右两块髋骨及其韧带连接而成，骨盆有两对重要的韧带，包括骶骨、尾骨与坐骨结节间的骶结节韧带和骶骨、尾骨与坐骨棘之间的骶棘韧带。骶棘韧带宽度即坐骨切迹宽度，是判断中骨盆后矢状径是否狭窄的重要指标。以耻骨联合上缘、髂耻线及骶岬上缘的连线为界，将骨盆分为上下两部分。大骨盆位于界线以上，又称假骨盆，小骨盆位于界线以下，又称真骨盆，

64.禁止使用冷疗法的部位是（）

- A.枕后、耳廓
- B.心前区、腹部
- C.腋窝
- D.腹股沟、颈外
- E.足底、阴囊

答案：ABE

解析：禁忌部位:枕后、耳廓、阴囊等处禁忌用冷,以防冻伤;心前区、腹部、足心禁忌用冷疗。

65.以下患者，可有丝脉的是（）

- A.大出血
- B.休克
- C.心功能不全

D.心包积液

E.主动脉瓣狭窄

答案：ABCE

解析：细脉又名丝脉。细脉为临床上的重要体征，出现细脉常提示病情重笃，多由于左心血液搏出量减少，脉压减低、血流减慢和周围阻力增高、充盈度较差所致。见于各种原因所致的休克、心脏填塞、心力衰竭、二尖瓣狭窄等。心包积液为奇脉。

三、名词解释

1.压疮：是由于局部组织长期受压，血液循环障碍，局部组织持续缺血、缺氧、营养缺乏，致使皮肤失去正常功能而引起的组织破损和坏死。

2.黑加征：妊娠 6-8 周时，阴道粘膜及子宫颈充血，呈紫蓝色，阴道检查子宫峡部极软，宫颈与宫体之间似不相连称为黑加征。

3.嗜睡：是最轻度的意识障碍，患者处于持续睡眠状态，但能被言语或轻度刺激唤醒，醒后能正确、简单而缓慢的回答问题，但反应迟钝，刺激去除后又很快入睡。

四、填空题

1.外科换药的顺序为先换清洁伤口，再换污染伤口，最后换感染伤口。

2.正常瞳孔的直径为2~5mm。

3.消化道出血时大便隐血试验阳性提示每小时出血量大于5~10ml。

4.急性心肌梗死心电图特征性改变是ST段抬高 病理性Q波 T波倒置。

五、简答题

1.高热患者的护理措施包括哪些？

- 降低体温：物理降温和药物降温。体温超过 39℃，选用局部用冷，冷毛巾、冰袋冷敷等，超过 39.5℃，选用全身用冷。温水擦浴，酒精擦浴，达到降温目的。
- 加强病情观察。观察生命体征，一般 4 次/日，高热时次/4h；观察是否出现寒颤，治疗效果等
- 补充营养和水分，高营养易消化的流质或半流质，多喝水，每日 3000ml 为宜
- 促进患者舒适，注意休息、及时进行口护、皮肤护理，保持皮肤清洁干燥
- 心理护理

2.简述急性肾炎患儿休息的原则？

一般起病 2 周内应卧床休息，待水肿消退、血压降至正常、肉眼血尿消失后，可下床轻微活动或户外散步；

- 1~2 个月内活动量宜加限制，3 个月内避免剧烈活动；
- 尿内红细胞减少、血沉正常可上学，但需避免体育活动；
- 艾迪计数正常后恢复正常生活

六、案例分析题

患者，王某，男，56 岁，既往有溃疡病史，近期有胃痛，午餐后突发右上腹剧烈腹痛，并且迅速蔓延至全腹，发病后呕吐两次，为胃内容物，体格检查：T 38℃，P108 次/分，P30 次/分，血压 80/60mmhg。急性面容，平卧屈膝被动体位，心肺正常，腹平，腹式呼吸消失，腹肌紧张，有明显压痛及反跳痛，移动性浊音（+）肝浊音界缩小，X 线检查膈下可见游离气体。请问：

(1) 最可能的医疗诊断是什么？

(2) 治疗原则是什么？

(3) 术前和术后的护理措施分别包含什么？

(1) 胃溃疡并发穿孔

(2) 非手术治疗为术前准备，手术治疗为主。

(3) 术前护理：禁食、胃肠减压；静脉输液：预防和控制感染，遵医嘱使用抗生素；病情观察。

术后护理：病情观察；体位：局麻术后去枕平卧 6-8h；

引流管护理：观察引流液的量、颜色和性状；

饮食护理：早期禁食、胃肠减压，待胃管拔出，停止胃肠减压后，再慢慢进食流质逐渐过渡到普食

输液护理：按需补充晶体和胶体溶液，遵循补液原则，先晶后胶，先盐后糖，先快后慢
鼓励早期活动；预防并发症的发生，及时观察防止术后胃出血、十二指肠残端破裂、吻合口瘘、术后梗阻等并发症的发生。