

# 2018 年上半年事业单位联考 E 类综合应用能力测试试卷-真 题

## 第一部分医学基础知识

一、单项选择题：共 40 题，每题 1.2 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意。

1. 下列有关细胞自噬的表述，错误的是

- A. 自噬体的形成依赖于 III 型磷脂酰肌醇三磷酸激酶（Class III PI3K）的作用
- B. 细胞自噬过程包括底物诱导自噬前体形成、自噬体形成、自噬体与溶菌酶体融合和自噬体被降解 4 个阶段。
- C. 细胞自噬指细胞在一定的生理或病理条件下，按特定的程序发生死亡的过程
- D. 自噬可以帮助细胞抵抗衰老、饥饿等外界压力，但过度的自噬会导致细胞发生 II 型凋亡

2. 某建筑工人在施工过程中被钢筋刺入右侧锁骨中线第 4 肋间隙，出现呼吸困难、发绀等症状，该工人被钢筋依次穿过的胸壁层次是

- A. 皮肤、浅筋膜、前锯肌、肋间肌、胸内筋膜、胸膜
- B. 皮肤、浅筋膜、锁骨下肌、肋间肌、胸内筋膜、胸膜
- C. 皮肤、浅筋膜、胸大肌、胸小肌、肋间肌、胸内筋膜、胸膜
- D. 皮肤、浅筋膜、腹外斜肌、前锯肌、肋间肌、胸内筋膜、胸膜

3. 下列关于肾位置的说法，错误的是

- A. 为腹膜外位器官
- B. 右肾比左肾高半个椎体
- C. 位于脊椎两侧
- D. 肾门约平对第 1 腰椎椎体平面

4.关于血-脑屏障，下列说法错误的是

- A.由毛细血管内皮细胞、基膜和神经胶质膜构成
- B.可阻止血液中某些物质进入脑和脊髓的神经组织
- C.脑和脊髓的毛细血管内皮细胞间紧密连接封闭
- D.可阻止营养物质和代谢产物的通过

5.当肌肉活动时，葡萄糖转运体能将胞外的葡萄糖转运到细胞内，这种转运方式是

- A.易化扩散
- B.简单扩散
- C.主动转运
- D.胞吞作用

6.患者剧烈呕吐，腹泻后，心电图检查发现 ST 段压低，T 波低，平 U 波增高以及 Q-T 间期延长，导致该患者出现心电图改变的原因是

- A.高钾血症
- B.低钾血症
- C.高钠血症
- D.低钠血症

7.关于基因诊断的叙述，下列说法错误的是

- A.基因诊断可用于临床指导用药
- B.针对特定基因，特异性强，灵敏性高
- C.传染病病原体检测是基因诊断的主要应用领域
- D.可在源头上识别基因正常与否，属于“病因诊断”

8.人乳头瘤病毒 (HPV)疫苗可预防发生的肿瘤是

- A.乳腺癌
- B.肝癌
- C.宫颈癌
- D.卵巢癌

9.下列不属于先天性糖代谢缺陷病的是

- A.半乳糖血症
- B.糖原贮积症
- C.黏多糖贮积病
- D.枫糖尿症

10.患者，女，26岁，5天前突发寒战、高热，出汗后体温恢复正常，隔日症状再次发作，经病原学检测确诊为疟疾。患者症状周期性发作的原因是

- A.红细胞内期裂体增殖
- B.疟原虫侵入人体到发病有潜伏期
- C.子孢子在肝细胞内先休眠再复苏
- D.雌、雄配子体需进入蚊胃里发育

11.癫痫患儿服用苯巴比妥治疗时，必须补充的维生素是

- A.维生素 B
- B.维生素 C
- C.维生素 D
- D.维生素 E

12.下列抗高血压药物中属于 ACE 抑制剂的是

- A.氢氯噻嗪
- B.氨氯地平
- C.普萘洛尔

D.卡托普利

13.73 岁宫颈癌患者，近期出现血尿、尿急、尿频及尿痛等刺激症状，查体发现肿瘤组织已侵及膀胱，宫颈癌这种扩散方式为

- A.直接蔓延
- B.血道转移
- C.种植性转移
- D.淋巴道转移

14.患者，男，35 岁，外伤 2 小时入院，查体发现外耳道有清亮液体流出，应考虑的诊断是

- A.脑疝
- B.急性中耳炎
- C.颅底骨折
- D.外耳道炎

15.患者，男，30 岁，高处坠落致颅脑损伤，呈深昏迷状态，对该患者体格检查的描述，正确的：

- A.角膜反射减弱
- B.瞳孔对光反射消失
- C.吞噬反应存在
- D.对疼痛刺激出现痛苦表情

16.患者，男，60 岁，近 2 周以来饭后一小时左右胸骨后烧灼感，自觉有胃内容物涌入咽部，弯腰时更明显，该患者最可能的诊断是

- A.胃癌
- B.十二指肠溃疡
- C.出血性胃炎

D.胃食管反流症

17.患者，女，24岁，因腹部不适伴呕吐两天就医，其呕吐特点为就餐后出现剧烈呕吐，呕吐常发生在夜间，且呕吐物为隔夜宿食，根据其症状，可能的诊断是

A.幽门梗阻

B.低位小肠梗阻

C.贲门梗阻

D.乙状结肠扭转

18.患儿，男，7岁，低热，右肩和左膝关节疼痛9天，心悸1天就诊，2周前曾有上感病史，体检：咽红，无脓性渗出物，心尖区闻及II期收缩期杂音，无关节红肿，胸部X片示心影轻度扩大，查血清抗链球菌溶血素O(+)，其最可能的诊断是

A.风湿热

B.败血症

C.幼年特发关节炎

D.川崎病

19.患儿，2岁，因“呕吐、腹泻六天”代主诉入院，家长诉近两日尿量偏少。查体：体温正常，呼吸40次/分，心率130次/分，体重11kg，神态清，精神反应可，测血压偏低，皮肤弹性稍差，粘膜较干燥，哭时少泪，腹部及神经系统查体正常。查电解质，血钾3.7mmol/l，血钠127mmol/l，该患儿最可能的诊断是

A.急性腹泻病伴轻度低渗性脱水

B.急性腹泻病伴中度低渗性脱水

C.急性腹泻病伴中度等渗性脱水

D.急性腹泻病伴重度等渗性脱水



20. 妊娠早期最常见的自然流产因素是

- A. 母体孕激素过低
- B. 母体宫颈功能不全
- C. 母体免疫功能异常
- D. 胎儿或胎儿染色体异常

21. “重阴必阳，重阳必阴”这句话体现出阴阳之间的关系是

- A. 阴阳相互对立
- B. 阴阳相互依存
- C. 阴阳相互消长
- D. 阴阳相互转化

22. 艾滋病是获得性免疫缺陷综合症(AIDS)的简称,是由人免疫缺陷病毒(HIV)引起的慢性传染病, HIV 感染诊断的金标准是

- A. CD4+T 淋巴细胞计数
- B. HIVp24 抗原检测
- C. 病毒载量测定
- D. HIV-1/HIV-2 抗体检测

23. 斑贴试验是临床常用的变应原检测方法。下列关于斑贴试验的描述, 错误的是

- A. 适应症包括化妆品皮炎
- B. 受试物应分别置于铝制小室斑试器内
- C. 常用部位为前胸或前臂伸侧健康皮肤
- D. 每次试验时应设对照

24. 患者, 女, 32 岁, 感冒后出现“真空性头痛”, 晨起开始, 逐渐加重, 午后缓解, 次日复现。鼻窦镜检查可见中鼻道脓性分泌物, 其最可能的诊断是

- A.偏头痛
- B.急性额窦炎
- C.急性上颌窦炎
- D.三叉神经痛

25.根据世界卫生组织的要求，诊断沙眼的标准不包括

- A.典型的睑结膜瘢痕
- B.睑结膜 3 个以上滤泡
- C.角膜缘滤泡或 Herbert 小凹
- D.广泛的角膜血管翳

26.韧带和肌肉损伤的最佳检查方法是：

- A.CT 平扫
- B.CT 增强平扫
- C.MRI 平扫
- D.MRI 增强平扫

27.患者，男，50 岁，既往有十二指肠溃疡病史，突然呕血，量约 600ml，体检：烦躁，面色苍白，手足湿冷，BP110/96mmHg，P96 次/分，尚有力，该患者所处的状态是

- A.无休克
- B.轻度休克
- C.中度休克
- D.重度休克

28.当出现传染病疫情时，可以依法采取停工、停业、停课等紧急措施。下列关于紧急措施的说法，错误的是

- A.采取紧急措施的直接目的是切断传播途径

- B.需要解除紧急措施的，由原决定机关决定并宣布
- C.采取紧急措施的前提条件是“当传染病暴发、流行时”
- D.县级以上地方人民政府应当及时、独立地决定并采取紧急措施

29.按人体一日需要热能 2400Kcal，其中蛋白质占一日总热能的 10%计算，应供给的蛋白质是

- A.50 克
- B.60 克
- C.65 克
- D.70 克

30.水消毒时，杀菌、氧化有机物以及某些氯化反应等所消耗的氯量是

- A.加氯量
- B.有效氯
- C.需氯量
- D.余氯

31.根据三级预防原则，在职业卫生工作中，不属于第一级预防的是：

- A.健康教育
- B.定期健康检查
- C.职业禁忌症的筛选
- D.减少生产环境中职业性有害因素

32.关于问卷的信度与效度，下列叙述正确的是

- A.信度不高，效度有可能高
- B.信度高，效度一定也高
- C.效度不高，信度也低
- D.效度高，信度一定也高



33.“火中取栗”现象体现的动机冲突类型是

- A.趋避冲突
- B.双避冲突
- C.双趋冲突
- D.双重趋避冲突

34.患者，男，40岁，律师，有高血压病史，长期服药，能够正常工作、生活。

对该患者适用的医患关系模式是

- A.主动—被动型
- B.指导—合作型
- C.共同参与型
- D.生理—心理—社会模式

35.关于记忆，下列说法错误的是

- A.识记是保持的前提，保持是识记的进一步巩固
- B.艾宾浩斯认为，形象的材料遗忘快于抽象的材料
- C.艾宾浩斯认为，遗忘的速度是先快后慢
- D.再认和回忆都是对长时记忆所储存的信息提取的过程

36.韩某被派往俄罗斯工作，因语言不通、风俗习惯不同而紧张不安，于是开始学习俄语，并向当地民众请教学习。引起这种应激反应的应激源称为

- A.心理性应激源
- B.躯体性应激源
- C.社会性应激源
- D.文化性应激源

37.在分析食物中毒暴发的可能原因时，最常用的指标是

- A.罹患率
- B.患病率
- C.发病率
- D.死亡率

38.传染病在人群中发生流行必须具备的基本条件不包括

- A.传染源
- B.人口密度
- C.易感人群
- D.传播途径

39.根据《母婴保健法》的规定，下列说法错误的是

- A.母婴保健医学技术鉴定结果不具备法律效力
- B.有新生儿出生缺陷情况应向卫生行政部门报告
- C.县级以上地方政府可设立母婴保健医学技术鉴定组织
- D.对违反法律规定进行胎儿性别鉴定的相关人员依法给予行政处分

40.根据我国艾滋病防治的相关法规，下列表述错误的是

- A.艾滋病属于乙类传染病
- B.国家实行艾滋病自愿咨询制度
- C.国家实行艾滋病自愿检测制度
- D.医疗卫生机构应为自愿接受艾滋病检测者免费提供初筛检测

**二、多项选择题：共 20 题，每题 2.1 分。每题的备选项中，至少有 2 个是符合题意的。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。**

41.患者，男，16 岁，下坡时不慎踩空，扭伤右踝部，当即因肿痛不能行走。送医检查后发现：右踝后外侧部明显肿胀，压痛，X 线检查未见骨折。与该患者扭伤发生相关的因素有：

- A.足跖屈时踝关节处于相对不稳固状态
- B.内踝长、外踝短
- C.胫侧副韧带较强大
- D.腓侧副韧带三条，但均较薄弱

42.胎儿出生后，胎盘血液循环中断，肺开始呼吸，血液循环会发生一系列改变。

下列属于胎儿出生后血液循环改变的：

- A.脐静脉闭锁形成肝圆韧带，脐动脉闭锁形成脐侧韧带
- B.肝的静脉导管闭锁，形成静脉韧带
- C.动脉导管闭锁形成动脉韧带
- D.左心房压力增高而右心房压力降低，使卵圆孔关闭

43.人从温暖的房间突然到寒冷的室外，体内自主神经功能会发生改变，使人体能适应环境的剧烈变化。对此，下列描述正确的有

- A.心肌收缩力增强，支气管收缩
- B.皮肤黏膜血管收缩
- C.肝糖原合成增加，血糖下降
- D.肾上腺素分泌增加

44.下列关于真菌的说法，正确的有

- A.真菌没有完整的细胞器
- B.最适宜生长的酸碱度为 PH4.0-6.0
- C.繁殖方式包括有性繁殖和无性繁殖
- D.深部真菌感染包括致病菌感染和机会性感染

45.我国流行的血吸虫病主要是日本血吸虫病，关于日本血吸虫，下列说法正确的有

- A.终宿主为人或其他多种哺乳动物，中间宿主为淡水螺类

- B.生活史包括卵、毛蚴、母胞蚴、子胞蚴、尾蚴、童虫和成虫  
C.成虫寄生于人的门脉-肠系膜静脉系统，雌虫在肠黏膜下层静脉末梢内产卵  
D.尾蚴、童虫、成虫和虫卵均可对宿主造成损害

46.下列属于抗贫血药的有

- A.铁剂  
B.叶酸  
C.维生素 B12  
D.促红细胞生成素

47.下列关于呕血的描述，正确的有

- A.可由消化性溃疡、肝硬化等病因引起  
B.出血前常伴有喉部痒感、胸闷等症状  
C.血液中常混有食物残渣、胃液  
D.PH 试纸测试血液为酸性

48.患者，女，32岁，有家族过敏史，反复干咳3个月。查体：肺部未闻及哮鸣音。确诊该患者为支气管哮喘，需选择的检查有

- A.支气管激发试验或运动试验  
B.支气管舒张试验  
C.昼夜 PEF 变异率测定  
D.过敏原试验

49.新生儿，日龄5天，患新生儿缺氧缺血性脑病，下列属于其诊断标准的有

- A.产前有宫内窘迫，羊水III度污染  
B.有窒息史，Apgar 评分1分钟 $\leq$ 3分，并延续至5分钟时仍 $\leq$ 5分  
C.出生后6小时出现了惊厥、昏迷表现  
D.头颅核磁共振检查提示缺氧缺血性改变

50. 产后抑郁症的诊断标准中必须具备的条件包括

- A. 精神运动兴奋或阻滞
- B. 体重显著下降或增加
- C. 情绪抑郁
- D. 对全部或多数活动明显缺乏兴趣或愉悦

51. 中医理论认为，气的固摄作用减退，临床可出现的症状有

- A. 出血
- B. 自汗
- C. 尿失禁
- D. 脱肛

52. 患者，女，40岁，右侧颈动脉三角区肿块，手术切除后病理诊断为神经鞘膜瘤，术后出现 Horner 征。患者可出现的临床表现有：

- A. 右侧眼球内陷
- B. 右侧眼睑下垂
- C. 右侧瞳孔缩小
- D. 右侧面瘫

53. 患者右下肢疼痛，拍 X 线片提示急性化脓性骨髓炎，常见 X 线表现有

- A. 骨膜新生骨
- B. 死骨形成
- C. 骨质破坏
- D. 骨膜增生

54. 下列可使用食品添加剂的情形有

- A. 便于食品的生产、加工、包装运输或贮藏



- B.保持婴幼儿食品本身的营养价值
- C.保持食品的质量和稳定性，改进其感官特性
- D.作为某些特殊膳食食用食品的必要配料或成分

55.一农民使用百草枯除草剂，发生中毒、下列处理措施正确的有

- A.考虑经口食时，给予催吐、同时加用吸附剂，继用硫酸镁导泻
- B.常规输液，使用利尿剂、争取在中毒后 24 小时内进行血液透析或血液灌流
- C.给 VitC、VitE 等自由基清除剂，防止肺纤维化
- D.保护肝、肾、心功能，防治肺水肿，积极抗感染

56.我国对食品质量进行卫生评定时，主要检验的微生物指标有

- A.菌落总数
- B.大肠菌群数
- C.致病菌数
- D.病毒数

57.下列属于卫生费用评价指标的有

- A.卫生费用占 GNP 百分比
- B.人均卫生费用
- C.门诊和住院费用构成
- D.医疗部门的人力费用

58.患者，女，32 岁，因急性梗阻性化脓性胆管炎入院，行胆管切开取石术后 3 天，血清  $K^+$ 2.4mmol/L。该患者可能出现的情况有

- A.肠鸣音亢进
- B.血  $HCO_3^-$ 增高
- C.跟腱反射消失
- D.ECG 示 T 波低平，出现 U 波

59. 下列各药，入汤剂用法正确的有

- A. 车前子布包入汤剂
- B. 钩藤入剂先煎
- C. 薄荷入汤剂后下
- D. 麝香入丸散服

60. 随着科技进步、市场经济发展以及病人医学知识水平的普遍提高，医患关系出现了新的发展趋势，现代医患关系的发展趋势包括

- A. 医患关系经济化
- B. 医患关系民主化
- C. 医患关系法制化
- D. 医患关系人文化

## 第二部分岗位专业知识应用能力

注意：请根据所报考的具体岗位类别作答相应的试题，作答其他岗位试题一律无效。

（本页试题仅限报考中医临床岗位的考生作答）

### 三、案例分析题（30分）

患者，男性，59岁。4年前因劳累出现心慌头晕，某医院诊为“冠心病，房性早搏”。口服普罗帕酮（心律平）等药后，曾一度好转，但停药后时有心慌、胸闷、头晕目眩，服用中药天王补心丹，血府逐瘀汤等，治疗效果不明显。刻诊：心慌阵作，活动后加重，面色不华，唇甲苍白，疲劳乏力，自汗，食欲欠佳，大便溏软。舌质淡，苔薄白，脉细弱，测血压：130/80mmHg，心率：56次/分，心律不齐。心电图示：窦性心动过缓（58次/分）频发房性早搏。

根据上述案例，回答下列问题

1. 请分析该患者服用天王补心丹，血府逐瘀汤治疗效果不佳的原因。

2. 请就患者本次发病的临床表现拟定治法处方，并说明用药依据。

#### 四、实务题（30分）

患者，女性，39岁。企业高管，工作压力大，性情较急，2年来自觉右侧肋部胀痛，或隐痛不适，反复发作，近2天因家庭琐事争吵后，右肋疼痛又作，连及后背。胸闷、善叹气，嗝气则缓，大便干结、小便黄。平时经行先后不定期，量多或少。此次发病适逢经期，两侧乳房胀满疼痛，月经量少，色暗，有血块，舌质红，苔薄，脉弦细。

根据上述材料提供的信息，回答下列问题

1. 请提出中医诊断、辨证并拟定治法方案
2. 结合患者病情，制定预防与调护措施

（本页试题仅限报考西医临床岗位的考生作答）

#### 三、案例分析题（30分）

患者，男性，63岁，半年前，因胸闷，活动后气急，诊断为冠状动脉硬化性心脏病，不稳定型心绞痛，型冠状动脉支架成形术，术后，患者胸闷症状活动后气急症状消失，3个月前患者出现胸痛，呈撕裂样痛，夜间明显，口服止痛片及消心痛后无效，经心脏科主任多次诊治，认为心脏支架安放正确，心功能良好，考虑为心源性非器质性胸痛，给予对症治疗，但胸痛症状仍然存在，近一年来胸痛加重，在当地医院行胸痛加重，在当地医院行胸部CT（平扫）示：胸部降主动脉增宽，余未见明显异常。既往有高血压病史15年，血压最高为170/110mmHg，不规则服用降压药治疗，近一月来血压波动在160~180/90~110mmHg

根据上述案例，回答下列问题：

1. 请指出患者胸痛首先应考虑的诊断，并分析临床上胸痛的常见原因；
2. 为明确诊断，请列出必要的实验室和器械检查

#### 四、实务题（30分）

无名氏，老年男性，警察送来急诊，既往病史不详，查体：老年貌，呼之不应，双侧瞳孔等大等圆，直径 2mm，对光反射迟钝，呼吸深快，呼出气可闻及烂苹果味，口唇指甲无明显紫绀，心率 110 次/分，律齐，各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音，双肺呼吸音粗，可闻及少许散在湿啰音，腹平软

根据上述材料提供的信息，回答下列问题：

- 1.请分析该患者昏迷最可能的原因
- 2.请写出该患者的诊疗方案

(本页试题仅限报考医学技术岗位的考生作答)

### 三、案例分析题 (30 分)

患者，男性，46 岁。体检发现癌胚抗原 (CEA)、神经特异性烯醇酶 (NSE) 明显增高，建议进一步胸部 CT 检查，排除肺肿瘤。患者认为自己虽然有 15 年的吸烟史，每天约 30 支，但体检时胸部 X 线摄片正常，且担心 CT 检查的辐射剂量大，会伤害身体，不愿意进行胸部 CT 检查

根据上述案例，回答下列问题

- 1.请分析该患者需进行胸部 CT 检查的原因
- 2.请就患者“担心 CT 检查的辐射剂量大会伤害身体”的顾虑进行沟通

### 四、实务题 (30 分)

患者，男性，38 岁。阵发性左侧腰部疼痛 1 小时，剧烈难忍，放射至左侧腹股沟，伴有血尿，无畏寒、发热、寒战等全身症状，查体：左侧肾区叩击痛。

根据上述材料提供的信息，回答下列问题

- 1.请写出该患者最可能的诊断和协助确诊的影像学检查方法
- 2.请列举可辅助诊断的实验室检查。

(本页试题仅限报考药剂岗位的考生作答)

实务题一：



患者，男性，78岁。诊断为原发性高血压，口服硝苯地平普通片剂治疗，由于该普通片剂释药速度较快，降压迅速，引起患者颜面潮红、头痛、晕眩及恶心等副作用。因此赵医师推荐患者改用硝苯地平渗透泵控释制剂，该制剂主要成分与含量如下：

药物层：硝苯地平（100g）、聚环氧乙烷（355g）、羟丙甲纤维素（25g）、氯化钾（10g）和硬脂酸镁（10g）；助推层：聚环氧乙烷（170g）、氯化钾（72.5g）和硬脂酸镁（95g）；包衣层：醋酸纤维素（95g）和聚乙二醇4000（5g）。

根据上述案例，回答下列问题

- 1.请分析选用硝苯地平渗透泵控释制剂的依据？
- 2.依据该渗透泵控释制剂的处方，分析硝苯地平缓慢恒速释放的机制？
- 3.请指出该药不可嚼碎或掰开服用的原因？

实务题二：

王药师按照如下处方制备复方硫磺洗剂（混悬剂）：

沉降硫磺 30g

硫酸锌 30g

樟脑醑 250ml

甘油 100ml

纯化水加至 1000ml

制备方法：取处方量的沉降硫磺至乳酸钵中，加甘油研磨至细腻糊状，搅拌下加入硫酸锌水溶液中，搅拌，在搅拌下以细流加入樟脑醑，加纯化水至全量，搅匀即得，单按此处方制得的混悬剂沉降速度非常快。为降低沉降速度，王药师在该处方中加入羧甲基纤维素钠溶液。

根据上述材料提供的信息，回答下列问题

- 1.请分析原处方沉降速度快的原因，以及加入羧甲基纤维素钠后减慢沉降速度的机制？
- 2.为进一步提高该制剂的稳定性和再分散性，可采取哪些措施，请说明理由？



(本页试题仅限报考护理岗位的考生作答)

### 三、案例分析题 (30 分)

患者，女性，28 岁。左下腹撕裂样疼痛，伴恶心、呕吐，伴肛门坠痛感 2 小时，1 小时前曾如厕晕倒，来急诊就诊，平素月经规律，现停经 6 周。查体：T：36.8°C、P：116 次/分，BP：86/50mmHg，神志清楚，精神萎靡，烦躁不安，面色苍白，口唇发绀，皮肤湿冷，腹部平坦，腹肌略紧张，下腹有压痛，轻度反跳痛。移动性浊音阳性，肠鸣音 5 次/分，阴道后穹窿穿刺抽出不凝血

根据上述案例，回答下列问题

1.请提出该患者的首优护理诊断，并列出具体的诊断依据

2.针对该患者目前的情况，急诊护士应如何处理

### 四、实务题 (30 分)

患者，男性，62 岁。1 月前因车祸发生颅脑外伤，收住脑外科，行手术治疗。术后患者神志清楚，右侧颞部颅骨缺损，夜半护士巡视病房时，发现患者眼球向上凝视，四肢抽搐，牙关紧闭，口吐白沫，呼之不应，家属正在用力按住患者上肢

根据上述材料提供的信息，回答下列问题

1.请列出夜班护士应采取的措施

2.请写出患者病情稳定后的健康指导方案

(本页试题仅限报考公共卫生管理岗位的考生作答)

### 三、案例分析题 (30 分)

张某为某村卫生室执业助理医师，2017 年 8 月 8 日上午，在李某家中，张医师为其诊疗，李某自述有些头晕、恶心、发热。测体温 38.1°C 张一事即用自带的左氧氟沙星，头孢噻肟钠（属限值使用级抗菌药物）地塞米松等配置了四瓶静脉注射液，静脉滴注开始后不久，张一事即离开，随后李某因头孢噻肟钠过敏出现休克，家人即将李某转至县医院抢救，并联系张医师，后李某经抢救无效于当日死亡

根据上述案例，回答下列问题

- 1.张医师的诊疗行为是否属于医疗事故，是否应承担医疗损害责任？请谈谈你的看法
- 2.李某家人要求赔偿，请指出承担赔偿责任的主体以及解决争议的法律途径

#### 四、实务题（30分）

2016年6月30日早晨5点左右，A市某医院接诊时发现6名表现为发热，呕吐，腹痛和腹泻的患者，经了解患者均为某建筑公司职工，6月29日晚上在工地食堂吃了凉拌海蜇，医院随机向A市卫生应急部门报告，经对剩余食物、患者呕吐物和其粪便检查，发现副溶血弧菌溶血毒素阳性。截至当日18:00共接诊类似患者62人，经积极治疗，患者好转出院，未发生死亡。

根据上述材料提供的信息，回答下列问题

- 1.A市卫生部门接到报告后，应采取哪些措施
- 2.当地政府是否应该启动突发公共卫生事件应急预案，请说明理由